



Material informativ pentru persoanele vaccinate cu vaccinul Vaxzevria* suspensie injectabilă referitor la posibilitatea de apariție a tulburărilor de coagulare a sângelui

* denumit anterior COVID-19 Vaccine AstraZeneca

- Vaccinul Vaxzevria este utilizat pentru a preveni COVID-19 cauzată de virusul SARS-CoV-2. Vaxzevria se administrează la adulți cu vârsta de 18 ani și peste;
- Vaccinul determină sistemul imun (sistemul natural de apărare a organismului) să producă anticorpi și globule sanguine albe specializate, care să acționeze împotriva virusului, asigurând astfel protecție împotriva COVID-19. Nicio componentă a acestui vaccin nu poate provoca boala COVID-19;
- Pe lângă efectele benefice ale vaccinării în prevenirea Covid-19, acest vaccin poate cauza și reacții adverse. Majoritatea persoanelor vaccinate nu dezvoltă reacții adverse, însă, ca la orice alt vaccin, nu poate fi exclusă posibilitatea de apariție a acestora;
- Cele mai frecvente reacții adverse la vaccinul Vaxzevria sunt, de obicei, ușoare sau moderate și se ameliorează în câteva zile după vaccinare. Informații suplimentare despre vaccinul Vaxzevria sunt disponibile în [Prospectul](#) acestuia.

Atenționări despre posibilitatea apariției tulburărilor de coagulare a sângelui

- Există posibilitatea apariției unor cazuri foarte rare de cheaguri de sânge, cu localizări neobișnuite, însoțite de un număr scăzut de trombocite (trombocitopenie), care pot apărea în decurs de 2 săptămâni de la vaccinare. Prospectul medicamentului va fi actualizat pentru a include această reacție adversă posibilă, cu frecvență foarte rară;
- Deși riscul ca acest lucru să se întâmple este foarte mic, se recomandă să fiți în continuare atenți la posibilitatea apariției simptomelor asociate, descrise mai jos, astfel încât să puteți primi tratament medical imediat, pentru a se veni în sprijinul recuperării și a fi evitate complicațiile.

Solicitați asistență medicală dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome după vaccinare:

- dificultăți de respirație
- durere în piept
- tumefiere a unui membru inferior (umflare a piciorului)
- durere în zona abdominală (durere de burtă) persistentă
- dureri de cap severe și persistente sau vedere încețoșată
- vânătăi sau mici pete roșii rotunde, în afara locului de administrare a vaccinului.

Adresați-vă medicului dvs. curant dacă aveți întrebări sau îngrijorări cu privire la starea dvs. de sănătate

Prospectul vaccinului Vaxzevria (în curs de actualizare) este disponibil prin accesarea următorului QR cod:



Reacțiile adverse pot fi raportate către ANMMDR prin accesarea website-ului (www.anm.ro) sau a următorului QR cod:

