

Nr crt	DCI	DC	Indicatie	Stadiu
1	RIOCIGUAT	ADEMPAS	Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv.	Finalizat
2	FEBUXOSTATUM	ADENURIC	Tratamentul Hiperuricemiei cronice in bolile in care depunerea de urati a avut deja loc (inclusiv toful gutos si/sau artrita gutuasa in antecedente sau in prezent). Adenuric este indicat pentru adulti.	Finalizat
3	AFLIBERCEPTUM	ZALTRAP 25 mg/ml	Zaltrap in asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic (CCRm), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de tratament pe baza de oxaliplatina.	Finalizat
4	BELIMUMABUM	BENLYSTA	Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacientii adulti cu lupus eritematos sistemis (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad inalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi si complement seric scazut) in ciuda terapiei standard.	Finalizat
5	ACLIDINIUM BROMIDUM	BRETARIS GENUAIR 322 micrograme	Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacientii adulti.	Finalizat
6	COMBINATII (CANDESARTANUM CILEXETIL+HCT)	CANZENO HCT 8mg/12,5mg	Tratamentul hipertensiunii esentiale insuficient controlata prin monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.	Finalizat

7	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA 200mg	Artrita psoriazica. Cimzia, in asociere cu MTX, este indicat in tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie in cazul intolerantei la metotrexat sau cand continuarea tratamentului cu metotrexat este inadecvata. Tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat.	Finalizat
8	COMBINATII (DUTASTERIDUM+TAMSULOSINUM)	DUODART 0,5mg/0,4mg	Tratamentul simptomelor moderate pana la severe ale hiperplaziei benigne de prostata (HBP). Reducerea riscului de retentie acuta de urina (RAU) si a necesitatii interventiilor chirurgicale la pacientii cu simptome moderate pana la severe de HBP.	Finalizat
9	RILPIVIRINUM	EDURANT	Edurant, in asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientei umane tip 1 (HIV-1) la pacientii adulti netratati anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o incarcatura virala ARN HIV-1 ≤ 100000 copii/ml.	Finalizat
10	DEGARELIX	FIRMAGON	Firmagon este un antagonist al hormonului eliberator de gonadotrofina (GnRH) indicat pentru tratamentul pacientilor adulti de sex masculin cu cancer de prostata hormono-dependent in stadiu avansat.	Finalizat
11	ULIPRISTALUM ACETATUM	ESMYA	Tratamentul preoperator al simptomelor moderate pana la severe ale fibroamelor uterine la femeile adulte aflate la varsta fertila.	Finalizat
12	ETIONAMIDUM	ETIONAMIDA ATB 250 mg	Medicament tuberculostatic de linia a II la pacientii cu rezistenta la medicatia antituberculoasa de linia I.	Finalizat

13	COMBINATII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)	EUCREAS	Eucreas este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat on tratamentul pacientilor adulti care nu pot obtine un control glicemic suficient la doza maxima tolerata de motformina administrata oral in monoterapie sau care sunt tratati deja cu o asociere de vildagliptin si metformina sub o forma de comprimate separate. - Eucreas este indicat in combinatie cu o sulfoniluree (si anume terapie in combinatie tripla) ca terapie adjuvanta la regimul alimentar si exercitiile fizice la pacientii adulti, controlati necorespunzator cu metformina si o sulfoniluree. - Eucreas este indicat in terapie in combinatie tripla cu insulina ca terapie adjuvanata la regimul alimentar si exercitiile fizice pentru a imbunatati controlul glicemic la pacienti adulti cand utilizarea insulinei in doza stabila si metformina administrata in monoterapie nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat
14	COMBINATII (AMLODIPINA+VALSARTAN+HCT)	EXFORGE HCT	Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale ca terapie de substitutie la pacientii adulti a caror tensiune arteriala este controlata adecvat prin combinatie cu amlodipina, valsartan si hidroclorotiazida (HCT), administrate fie ca trei formule cu un component, fie ca formule cu doua sau un component.	Finalizat
15	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40mg/ml	Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul degenerescentei maculare legata de varsta (DMLV) forma neovasculara (umeda).	Finalizat
16	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40mg/ml	Tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinate de edemul macular secundar ocluziei venei centrale a retinei (OVCR)	Finalizat
17	FERRI CARBOXYMALTOSUM	FERINJECT 50 mg fer/ml	Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei asociate cu insuficienta renala cronica pentru pacientii in predializa.	Finalizat
18	FERRI CARBOXYMALTOSUM	FERINJECT 50 mg fer/ml	Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei prin deficit de fier asociate bolilor inflamatorii intestinale.	Finalizat
19	DENOSUMAB	XGEVA 120mg	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.	Finalizat

20	DAPAGLIFLOZINUM	FORXIGA	Forxiga este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie daca dieta si exercitiile fizice nu asigura un control corespunzator al glicemiei la pacienti la care utilizarea metforminului nu este adecvata din cauza intolerantei sau tratament adjuvant asociat in asociere cu alte medicamente care scad concentratia plasmatica de glucoza, inclusiv insulina, atunci cand acestea, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control glicemic corespunzator.	Finalizat
21	DAPAGLIFLOZINUM	FORXIGA	Forxiga este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie daca dieta si exercitiile fizice nu asigura un control corespunzator al glicemiei la pacienti la care utilizarea metforminului nu este adecvata din cauza intolerantei.	Finalizat
22	COMBINATII (BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)	FOSTER	FOSTER este indicat in tratamentul de fond al astmului bronsic atunci cand utilizarea unei combinatii (glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune) este adecvata: ● pacienti care nu au raspuns corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata scurta de actiune administrat la nevoie sau ● pacienti care au raspuns deja corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune. A. Terapia de intretinere: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, care se poate asocia, la nevoie cu un bronhodilatator cu durata scurta de actiune. B. Terapia de intretinere si de ameliorare a simptomelor: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, si, la nevoie, pentru controlul simptomatologiei.	Finalizat
23	COMBINATII (BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)	FOSTER	Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la pacienti care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
24	LANTANUM	FOSRENOL	Fosrenol este indicat la pacienții adulți ca agent de fixare a fosfatului utilizat pentru controlul hiperfosfatemiei la pacienții cu insuficiență renală cronică supuși hemodializei sau dializei peritoneale continue ambulatorii (DPCA)	Finalizat

25	LANTANUM	FOSRENOL	Fosrenol este indicat, de asemenea, pacienților adulți cu boală renală cronică, nedializați, având nivelul concentrației plasmatice de fosfat $\geq 1,78$ mmol/L, la care exclusiv dieta săracă în fosfat este insuficientă pentru a controla nivelul fosfaților.	Finalizat
26	EVEROLIMUS	AFINITOR	Cancer mamar în stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenți, cu HER2/neu negativ, administrat în combinație cu exemestane, la femeile în postmenopauză, fără boala viscerală simptomatică, după recurența sau progresia bolii în urma administrării unui inhibitor de aromataza non-steroidal.	Finalizat
27	VILDAGLIPTINUM	GALVUS	Vildaglipton este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la adulți: În monoterapie - la pacienți cu control adecvat numai prin regim alimentar și exerciții și pentru care metformina nu este recomandată datorită contraindicațiilor sau intoleranței. Ca tratament oral dublu, în asociere cu - metformina, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerate de metformina în monoterapie, - o sulfoniluree, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerate de sulfoniluree și pentru care tratamentul cu metformina este recomandabil din cauza contraindicațiilor sau intoleranței, - o tiazolidindionă, la pacienții cu control glicemic insuficient și la care este indicată utilizarea unei tiazolidindione. Ca tratament oral triplu, în asociere cu - o sulfoniluree și o metformina când exercitiile fizice împreună cu tratamentul dual cu aceste medicamente nu asigură un control glicemic adecvat. Vildagliptin este, de asemenea, indicată pentru administrarea în asociere cu insulina (cu sau fără metformina) când regimul alimentar și exercitiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat

28	FINGOLIMODUM	GILENYA	Gilenya este indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroza multipla recidivanta-remitenta extrem de activa la urmatoarele grupe de pacienti adulti: - Pacienti cu activitate intensa a bolii in ciuda tratamentului cu cel putin un tratament de modificare a bolii (pentru exceptii in informatii privind perioadele de eliminare completa. Acesti pacienti pot fi definiti ca pacienti care nu au raspuns la un ciclu complet si adecvat (in mod normal, minim un an de tratament) cu cel putin un tratament de modificare a bolii. Pacientii trebuie sa fi avut minim 1 recidiva in anul anterior in timpul tratamentului sau sa aiba cel putin 9 leziuni T2-hiperintense la RMN-ul cranian sau minim 1 leziune ca captare de Gadolinium. Un astfel de pacient poate fi definit si ca pacient cu o rata nemodificata sau crescuta de recidiva sau cu recidive curente severe, comparativ cu anul anterior; sau, Pacienti cu scleroza multipla recidivanta-remitenta severa, cu evolutie rapida, definita de 2 sau mai multe recidive debilitante intr-un an si 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o crestere semnificativa a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	Finalizat
29	AFATINIBUM	GIOTRIF	Afatinib este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacientilor netratati anterior cu Receptorii ai Factorului de Crestere Epidermal (EGFR) TKI cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutatie(i) activatoare a(le) EGFR.	Finalizat
30	EVEROLIMUS	AFINITOR	Carcinom celular renal avansat, care au inregistrat progresie a bolii la sau in urma tratamentului cu terapie tintita asupra FCEV (factor de crestere endoteliala vasculara).	Finalizat
31	TELAPREVIRUM	INCIVO 375 mg	Incivo, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, este indicat in tratamentul hepatitei cronice cu virus C, genotipul 1, la pacientii adulti cu boala hepatica compensata (inclusiv ciroza): - netratati anterior; - care au fost tratati anterior cu interferon alfa (pefilat sau nepegilat) in monoterapie sau in asociere cu ribavirina, inclusiv pacientii cu recadere, pacientii cu raspuns terapeutic partial sau pacientii care nu au raspuns la tratament.	Finalizat

32	AXITINIBUM	INLYTA	Inlyta eate indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu carcinom renal in stadiu avansat (CCR) dupa esecul tratamentului anterior cu sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.	Finalizat
33	EPLERENONUM	INSPRA	In asociere cu tratamentul standard optim pentru scaderea riscului mortalitatii si morbiditatii cardiovasculare la pacienti adulti cu insuficienta cardiaca (cronica) clasa II NYHA si disfunctie ventriculara stanga (FEVS $\leq$ 30%).	Finalizat
34	PALIPERIDONUM	INVEGA	Invega este indicat in tratamentul schizofreniei la adulti si adolescenti cu varsta de 15 ani si peste. Invega este indicat pentru tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburarile schizoafective la adulti. Nu a fost demonstrat efectul asupra simptomelor depresive.	Finalizat
35	CANAGLIFLOZINUM	INVOKANA	Invokana este indicat la dulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic fiind administrat ca monoterapie (in cazul in care doar prin dieta si exercitii fizice nu se obtine un control glicemic adecvat la pacientii la care utilizarea de metformin este inadecvata datorita intolerantei sau contraindicatiilor) sau terapie adjuvanta (terapie adjuvanta la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci cand acestea, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control glicemic adecvat).	Finalizat
36	EVEROLIMUS	AFINITOR	Tumori neuroendocrine, nerezectabile sau metastatice, bine sau moderat diferentiate, de origine pancreatica, la adulti cu boala progresiva.	Finalizat
37	GEFITINIBUM	IRESSA	Iressa este indicata pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR TK (linia all-a).	Finalizat
38	GEFITINIBUM	IRESSA	Tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC -non small cell lung cancer), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR_TK.	Finalizat

39	COMBINATII (SITAGLIPTINUM+METFORMINUM)	JANUMET 50 mg/1000 mg	Pentru pacientii adulti cu diabet zaharat de tip 2, Janumet este indicat: ● ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin in monoterapie sau la cei care au fost deja tratati cu asocierea dintre sitagliptin si metformin. ● sub forma de terapie tripla in asociere cu o sulfoniluree ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacienti controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si o sulfoniluree. ● sub forma de terapie tripla, in asociere cu un agonist al receptorilor gama activati de proliferatorul peroxizomilor (PPAPy) (adica, o tiazolidindiona) ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacienti controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si un agonist PPARY. ● sub forma de terapie adaugata tratamentului cu insulina (terapie tripla), ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacienti la care doza stabilita de insulina si metformin in monoterapie nu realizeaza un control glicemic adecvat.	Finalizat
40	COMBINATII (LINAGLIPTINUM+METFORMINUM)	JENTADUETO	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 in combinatie cu o sulfoniluree (de exemplu tratament cu tripla combinatie) ca un adjuvant la dieta si exercitii fizice la pacientii adulti la care controlul glicemiei nu se realizeaza adecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina si sulfoniluree	Finalizat
41	COMBINATII (LINAGLIPTINUM+METFORMINUM)	JENTADUETO	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 ca un adjuvant al dietei si exercitiului fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti controlati inadecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina sau la pacientii carora deja li s-a administrat tratament combinat cu linagliptin si metformina	Finalizat
42	COMBINATII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM)	KOMBOGLYZE 2,5/1000mg	Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu terapie combinata tripla (cu ADO)). Ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima tolerata de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat

43	COMBINATII (SAXAGLIPTINUM + METFORMINUM)	KOMBOGLYZE 2,5/1000mg	Tratamentul adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2 inadecvat controlat cu doza maxima toleranta de metformin in monoterapie sau la cei care sunt deja tratati cu combinatia de saxagliptin si metformin sub forma de comprimate separate; de asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu insulina (de exemplu terapie combinata cu tripla), ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, cand insulina si metforminul nu asigura un control glicemic adecvat. De asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu terapie combinata tripla), ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima toleranta de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat
44	ALEMTUZUMABUM	LEMTRADA 12mg	Pacientii adulti cu scleroza multipla recurent-remisiva (SMRR), cu boala activa, definita prin caracteristici clinice sau imagistic.	Finalizat
45	MINOCYCLINUM	MINOZ MR 100 mg	Tratamentul acneei	Finalizat
46	LIXISENATIDUM	LYXUMIA	Lyxumia este indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 în asociere cu medicamente hipoglicemice, administrate pe cale orală, și/sau cu insulină bazală, în vederea obținerii controlului glicemic atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei	Finalizat
47	METOXI-POLIETILENGLICOL EPOETINA BETA	MIRCERA	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficientei renale cronice (IRC) la pacienti adulti.	Finalizat
48	FOTEMUSTINUM	MUSTOPHORAN®	Melanom malign diseminat cu metastaze cerebrale	Finalizat
49	ROTIGOTINUM	NEUPRO	Tratamentul simptomatic al sindromului picioarelor nelinistite idiopatic, moderat pana la sever	Finalizat
50	NEPAFENACUM	NEVANAC	Prevenirea si tratamentul durerilor si inflamatiilor postoperatorii asociate cu operatia de cataracta.	Finalizat
51	SIMEPREVIRUM	OLYSIO	Olysio, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.	Finalizat
52	INDACATEROLUM	ONBREZ BREEZHALER	Onbrez Breezhaler este indicat pentru tratamentul bronhodilatator de intretinere al obstructiei cailor respiratorii la pacienti adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC).	Finalizat

53	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA	Onglyza este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2, in scopul imbunatatirii controlului glicemic in terapia asociere cu alte medicamente antidiabetice orale (ADO), dubla in asociere cu metformin, atunci cand monoterapia cu metformin, impreuna cu dieta si exercitii fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei, o sulfoniluree, atunci cand monoterapia cu sulfoniluree, impreuna cu dieta si exercitii fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei la pacientii la care administrarea de metformin este considerata inadecvata, o tiazolidindiona, atunci cand monoterapia cu tiazolidindiona, impreuna cu dieta si exercitii fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei, la pacientii la care administrarea unei tiazolidindione este considerata adecvata, in terapia orala tripla in asociere cu metformin si o sulfoniluree, atunci cand doar acest tratament, impreuna cu dieta si exercitii fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
54	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA	Onglyza este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2, in scopul imbunatatirii controlului glicemic in terapia combinata, in asociere cu insulina (cu sau fara metformin), cand acest tratament, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
55	ABATACEPTUM	ORENCIA (1st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorala (TNF)-alfa.	Finalizat
56	ABATACEPTUM	ORENCIA (2st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorala (TNF)-alfa.	Finalizat
57	ABATACEPTUM	ORENCIA	Artrita idiopatica juvenila poliarticulara. Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul artritei idiopatice juvenile (AIJ) poliarticulare active, forma moderata pana la severa, la copii si adolescenti cu varsta de 6 ani si peste, care au raspuns insuficient la alte MAMB, inclusiv cel putin un inhibitor TNF.	Finalizat

58	TAPENTADOLUM	PALEXIA RETARD	Palexia retard este indicat la adulti pentru abordarea terapeutica a durerilor cronice severe care pot fi tratate adecvat numai cu analgezice opioide.	Finalizat
59	INGENOLI MEBUTAS	PICATO	Tratamentul cutanat al Keratozei actinice non-hipertrofie non-hipercheratozice la adulti la nivelul trunchiului si extremitatilor.	Finalizat
60	DABIGATRANUM ETEXILATUM	PRADAXA	Preventia primara a evenimentelor tromboembolice venoase la pacientii adulti care au suferit o interventie chirurgicala electiva de inlocuire completa de sold sau o interventie chirurgicala de inlocuire completa a genunchiului.	Finalizat
61	DABIGATRANUM ETEXILATUM	PRADAXA	Preventia accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacienti adulti cu fibrilatie atriala non-valvulare (FANV) ce prezinta unul sau mai multi dintre urmatoarii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral, atac ischemic tranzitoriu (AIT), varsta ≥ 75 ani, insuficienta cardiaca (NYHA $\geq$ II), diabet zaharat, hipertensiune arteriala.	Finalizat
62	COMBINATII (PERINDOPRILUM+AMLODIPINUM)	PRESTANCE	Hipertensiune arteriala	Finalizat
63	COMBINATII (PERINDOPRILUM+AMLODIPINUM)	PRESTANCE	Boala coronariana stabila	Finalizat
64	DENOSUMAB	PROLIA	Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.	Finalizat
65	COMBINATII (FLUTICASONUM+VILANTEROLUM)	RELVAR ELLIPTA	Relvar Ellipta este indicat in tratamentul regulat la astmul bronsic la adulti si adolescenti cu varsta de 12 ani si peste, la care este adecvata utilizarea unui medicament combinat (beta ₂ agonisti cu durata lunga de actiune si corticosteroizi cu administrare inhalatorie): Pacienti la care nu se obtine un control adecvat prin terapia cu corticosteroizi cu administrare inhalatorie si beta ₂ agonisti cu durata scurta de actiune cu administrare inhalatorie, utilizata la nevoie.	Finalizat
66	COMBINATII (FLUTICASONUM+VILANTEROLUM)	RELVAR ELLIPTA	Relvar Ellipta este indicat în tratamentul simptomatic al adulților cu BPOC cu VEMS <70% din valoarea predictibilă normală (post-bronhodilatator) și cu un istoric de exacerbări, în ciuda administrării regulate a unei terapii bronhodilatatoare.	Finalizat
67	AGALSIDASUM ALFA	REPLAGAL 1mg/ml	Replagal este indicat pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiență de α -galactosidază A).	Finalizat

68	EPOETINUM ZETA	RETACRIT	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficienței renale cronice (IRC) la pacienții adulți, adolescenți și copii: - Tratamentul anemiei asociate cu insuficiența renală cronică la pacienții adulți, copii și adolescenți supuși hemodializei și la pacienții adulți supuși dializei peritoneale. - Tratamentul anemiei simptomatice severe de etiologie renală la pacienții adulți cu insuficiența renală care nu sunt încă supuși dializei.	Finalizat
69	EPOETINUM ZETA	RETACRIT	Retacrit poate fi folosit pentru creșterea disponibilului de sânge autolog la pacienții încadrați într-un program de pre-donare. Decizia utilizării în această indicație trebuie cântărită și în funcție de riscul raportat de evenimente tromboembolice. Tratamentul trebuie administrat numai pacienților cu anemie moderată (fără deficit de fier) dacă procedurile de conservare a sangelui nu sunt disponibile sau sunt insuficiente atunci când intervențiile chirurgicale electivă majore planificate necesită volume mari de sânge (4 sau mai multe unități de sânge pentru femei sau 5 sau mai multe unități pentru bărbați).	Finalizat
70	EPOETINUM ZETA	RETACRIT	Tratamentul anemiei și reducerea nevoilor transfuzionale la pacienți adulți tratați prin chimioterapie pentru tumori solide, limfoame maligne sau mielome multiple, și care prezintă risc la primirea transfuziei, după cum indică starea generală a pacientului (de exemplu: statusul cardiovascular, anemia preexistentă la începutul tratamentului prin chimioterapie).	Finalizat
71	EPOETINUM ZETA	RETACRIT	Retacrit poate fi folosit pentru reducerea expunerii la transfuzii de sânge alogen la pacienții adulți fără deficit de fier, înaintea intervențiilor chirurgicale ortopedice electivă majore, care au un risc potențial crescut de a prezenta complicații ale transfuziei. Utilizarea trebuie limitată la pacienții cu anemie moderată (de exemplu Hb 10-13 g/dl) care nu sunt încadrați într-un program de pre-donare de sânge autolog și la care se așteaptă pierderi de sânge moderate (900-1 800 ml).	Finalizat
72	ELTROMBOPAG	REVOLADE	Revolade este indicat pentru tratamentul adulților cu infecție cu virusul hepatic C (VHC) pentru tratamentul trombocitopeniei, în situațiile în care gradul de trombocitopenie este factorul principal care împiedică inițierea sau limitează posibilitatea menținerii unei terapii optime pe baza de interferon.	Finalizat

73	ELTROMBOPAG	REVOLADE	Revolade este indicat pentru tratamentul adulților cu purpura trombocitopenică imună (idiopatică) (PTI) cronică splenectomizati care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline). Revolade poate fi luat în considerare în tratamentul de linia a doua a adulților nesplenectomizati pentru care tratamentul chirurgical este contraindicat.	Finalizat
74	BENDAMUSTINUM	RIBOVACT 2,5 mg/ml	Tratament de prima linie în Leucemia Limfatică Cronică(LLC), Binet stadiul B sau C, la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabina.	Finalizat
75	BENDAMUSTINUM	RIBOVACT 2,5 mg/ml	Tratament de prima linie în mielomul multiplu(MM), Durie-Salmon stadiul II cu progresie sau stadiul III, în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomida sau bortezomib.	Finalizat
76	BENDAMUSTINUM	RIBOVACT 2,5 mg/ml	Ca monoterapie în limfomul non-Hodgkin indolent la pacienții cu progresia bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă terapeutică ce conține rituximab.	Finalizat
77	TOCILIZUMABUM	ROACTEMRA	Tratamentul pacienților adulți cu poliartrita reumatoidă activă, moderată până la severă și pacienților cu vârsta de 2 ani și peste, cu artrita idiopatică juvenilă, formă sistemică activă și cu poliartrita idiopatică juvenilă.	Finalizat
78	CONESTAT ALFA	RUCONEST	Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adulții cu angioedem ereditar (AEE) cauzat de deficitul de inhibitor al C1-esterazei.	Finalizat
79	TAFLUPROSTUM	SAFLUTAN 15 micrograme/ml	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții adulți cu vârsta $\geq$ 18 ani cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: • care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți • care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie • care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante.	Finalizat
80	GLICOPIRONIUM BROMIDUM	SEEBRI BREEZHALER	Tratament bronhodilatator de întreținere, pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)	Finalizat

81	NALMEFENUM	SELINCRO 18mg	Reducerea consumului de alcool la pacientii adulti cu dependenta de alcool si care au un risc crescut de consum de alcool, fara simptome somatice de sevraj si care nu necesita in mod imediat tratament detoxifiant	Finalizat
82	COMBINATII(OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA)	SEVIKAR 20mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
83	COMBINATII(OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA)	SEVIKAR 40mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
84	COMBINATII(OLMESARTAN MEDOXOMIL+AMLODIPINA)	SEVIKAR 40mg/10mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
85	GOLIMUMAB	SIMPONI 50 mg	Colita ulcerativă (CU) activa aflată în stadii moderate până la severe, la pacienții adulți care au prezentat un răspuns inadecvat la terapia convențională, incluzând corticosteroizi, 6-mercaptopurina (6-MP) sau azatioprina (AZA), ori care prezintă intorelanță sau contradicații pentru un astfel de tratament.	Finalizat
86	GOLIMUMAB	SIMPONI 50 mg	Tratamentul spondilitei anchilozate (SA) active, aflata in stadii severe, la adulti care au avut un raspuns inadecvat la terapia conventionala.	Finalizat
87	GOLIMUMAB	SIMPONI 50 mg	Golimumab, in asociere cu metotrexat (MTX), este recomandat in: ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii moderate pana la severe, la adulti la care raspunsul la tratamentul cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, a fost inadecvat. ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii severe, la adultii care nu au fost tratati anterior cu MTX. S-a demonstrat faptul ca Golimumab, in combinatie c u MTX, reduce rata de progresie a leziunilor distructive de la nivel articular, conform determinarilor radiologice si ca amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat

88	GOLIMUMAB	SIMPONI 50 mg	Golimumab administrat singur sau in asociere cu MTX, este recomandat in tratamentul artritei psoriazice active si progresive, la adultii la care raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare bolii (MARMB) a fost inadecvat. S-a demonstrat ca Simponi determina scaderea progresiei afectarii articulatiilor extremitatilor, masurata prin metode radiologice, la pacienti cu subtipurile poliarticulare simetrice ale afectiunii si amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat
89	BEDAQUILINUM	SIRTURO 100 mg	Sirturo este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.	Finalizat
90	USTEKINUMAB	STELARA	Stelara, in monoterapie sau in asociere cu MTX este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu artrita psoriazica activa care au avut un raspuns infuficient la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice non-biologice modificatoare ale evolutiei bolii (MARMB).	Finalizat
91	USTEKINUMAB	STELARA	Stelara este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu psoriazis in placi, forme moderate pana la severe, care au prezentat fie rezistenta, fie contraindicatii, fie intoleranta la alte terapii sistemice incluzand ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen si ultraviolete A).	Finalizat
92	LAPATINIBUM	TYVERB	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu un inhibitor de aromatază la femeile cu boală metastatică cu receptori hormonal prezenți, aflate în postmenopauză, pentru care chimioterapia nu este indicată în prezent.	Finalizat
93	LAPATINIBUM	TYVERB	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm mamar, ale caror tumori exprima HER2 (ErbB2) in exces in asociere cu trastuzumab, la pacientii cu boala metastatica cu receptori hormonal absentii, progresiva in urma unor terapii anterioare ce trastuzumab in combinatie cu chimioterapie.	Finalizat
94	REGORAFENIBUM	STIVARGA	Stivarga este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu tumori stromale gastro-intestinale (GIST- Gastrointestinal stromal tumor) nerezectabil sau metastatice care au progresat sau care nu au tolerat tratamentul anterior cu imatinib si sunitinib.	Finalizat

95	DABRAFENIBUM	TAFINLAR	Dabrafenib este indicat ca monoterapie in tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
96	COMBINATII (OXICODONUM+NALOXONUM)	TARGIN	Dureri severe, care pot fi tratate in mod adecvat numai cu analgezice opioide. Naloxona, antagonist opioid este adaugata pentru a contracara constipatia indusa de opioide prin antagonizarea actiunii oxicodeinei la nivelul receptorilor opioizi locali, in intestin.	Finalizat
97	IMUNOGLOBULINA ANTI-LIMFOCITE (DE IEPURE)	THYMOGLOBULINE 5 mg/ml	Tratamentul anemiei aplastice	Finalizat
98	DOLUTEGRAVIRUM	TIVICAY	Tivicay este indicat in asociere cu alte medicamente anti-retrovirale destinate tratamentului infectiei cu Virusul Imunodeficientei Umane (Human Immunodeficiency Virus-HIV) la adulti si adolescenti cu varsta peste 12 ani.	Finalizat
99	FESOTERODINUM	TOVIAZ	Tratamentul simptomelor (polakiurie si/sau mictiuni imperioase si/sau incontinenta imperioasa) care pot surveni la pacientii adulti cu sindrom de vezica hiperactiva.	Finalizat
100	ATOSIBANUM	TRACTOCILE	Tractocile este indicat pentru intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte cu: • contractii uterine regulate, cu durata de cel putin 30 secunde, cu o frecventa de ≥ 4 si 30 minute; • dilatație cervicala de 1 pana la 3 cm (0-3 cm la nulipare) si stergere a colului uterin de $\geq 50\%$; • varsta ≥ 18 ani; • varsta sarcinii cuprinsa intre 24 si 33 de saptamani complete; • frecventa normala a batailor cardiace fetale. Intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte.	Finalizat
101	LINAGLIPTINUM	TRAJENTA 5 mg	Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatatii controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
102	LINAGLIPTINUM	TRAJENTA 5 mg	Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatatii controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu o sulfoniluree si metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic impreuna cu terapia asociata/duala a acestor doua medicamente nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat

103	COMBINATII (TELMISARTANUM+AMLODIPINUM)	TWYNSTA	Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale la adulti. Terapie de asociere. Indicata la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu amlodipina. Terapie de substitutie. Pacientilor adulti la care tensiunea arteriala esentiala este controlata adecvat si carora li se administreaza telmisartan si amlodipina sub forma de monoterapie li se pot administra in schimb comprimate de Twynsta care contin in compozitie aceleasi doze	Finalizat
104	PANITUMUMABUM	VECTIBIX 20mg/ml	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
105	PANITUMUMABUM	VECTIBIX 20mg/ml	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
106	REGORAFENIBUM	STIVARGA	Tratamentul adultilor cu neoplasm colorectal (NCR) metastatic carora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerati candidati pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe baza de fluoropirimidina, un tratament anti-VEGF si un tratament anti EGFR	Finalizat
107	AGOMELATINUM	VALDOXAN	Tratamentul episoadelor depresive majore la adulti	Finalizat
108	SILODOSINUM	UROREC 4mg/8mg	Tratamentul semnelor si simptomelor hiperplaziei prostatice benigne (HPB) pentru grupurile speciale de pacienti, cu insuficienta renala si hepatica.	Finalizat
109	CILOSTAZOLUM	VELYN	Claudicatie intermitenta fara semne de necroza a tesutului periferic (boala arteriala periferica stadiul II Fontaine)	Finalizat
110	BOCEPREVIRUM	VICTRELIS	Victrelis este indicat in tratamentul hepatitei cronice virale tip C (HCC), genotipul 1, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, la pacientii adulti cu insuficienta hepatica compensata, la care nu s-a administrat tratament sau care nu au raspuns la tratamentele anterioare.	Finalizat
111	COMBINATII (NAPROXEN + ESOMEPRAZOL)	VIMOVO	Tratamentul simptomatic al osteoartritei, poliartritei reumatoide si spondilitei anchilozate la pacientii cu risc de aparitie a ulcerului gastric si/sau duodenal ca urmare a administrarii medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) si atunci cand tratamentul cu doze mai mici de naproxen sau alte AINS este considerat insuficient.	Finalizat

112	LACOSAMIDUM	VIMPAT	Vimpat este indicat ca terapie adjuvanta in tratamentul crizelor convulsive partiale, cu sau fara generalizare secundara, la pacientii adulti si adolescenti (16-18 ani) cu epilepsie.	Finalizat
113	TENOFOVIRUM DISOPROXIL	VIREAD 245mg	Viread 245 mg comprimate filmate este indicat in tratamentul hepatitei B cronice la adulti cu: ● boala hepatica compensata, cu dovezi de replicare virala activa, concentratie serica a alaninaminotransferazei (ALT/TGP) persistent crescuta si dovada histologica a inflamatiei active si/sau fibrozei. ● dovezi privind prezenta virusului hepatic B rezistent la lamivudina. ● boala hepatica decompensata.	Finalizat
114	PAZOPANIB	VOTRIENT	Votrient este indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul cu celule renale (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala in stadiu avansat.	Finalizat
115	PAZOPANIB	VOTRIENT	Votrient este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu subtipuri selectate de sarcom de tesuturi moi (STM) aflat in stadiu avansat carora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatica sau la care boala a progresat in decurs de 12 luni dupa terapia (neo) adjuvanta. Eficacitatea si siguranta au fost stabilite doar pentru anumite subtipuri histologice tumorale de STM.	Finalizat
116	CRIZOTINIBUM	XALKORI	Xalkori este indicat pentru tratamentul adultilor cu neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv).	Finalizat
117	RIVAROXABANUM	XARELTO	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si a emboliei pulmonare (EP), si prevenirea recurentei TVP si a EP la adulti.	Finalizat
118	RIVAROXABANUM	XARELTO	Prevenirea accidentului vascular cerebral si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara cu unul sau mai multi factori de risc, cum sunt insuficienta cardiaca congestiva, hipertensiunea arteriala, varsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu in antecedente.	Finalizat
119	RIVAROXABANUM	XARELTO	Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacientii adulti care sunt supusi unei interventii chirurgicale de electie pentru substitutia soldului sau genunchiului (proteza totala a soldului sau genunchiului).	Finalizat

120	PALIPERIDONUM	XEPLION	XEPLION este indicat in tratamentul de intretinere al schizofreniei la apacientii adulti stabilizati cu paliperidona sau risperidona. La pacientii adulti selectati cu schizofrenie si care au raspuns anterior la administrarea orala a paliperidonei sau risperidonei, se poate administra XEPLION fara stabilizare anterioara cu un tratament pe cale orala daca simptomele psihotice sunt usoare pana la moderate si este necesar un tratament injectabil cu eliberare prelungita.	Finalizat
121	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	Trastuzumabum (Herceptin) in asociere cu capecitabina sau 5-fluorouracil si cisplatina este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu adenocarcinom gastric metastatic HER2 pozitiv sau a jonctiunii gastroesofagiene, carora nu li s-a administrat anterior tratament impotriva cancerului pentru boala lor metastatica.	Finalizat
122	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	Xtandi este indicat la barbatii adulti pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, a caror boala a evoluat in timpul, sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat
123	IPILIMUMABUM	YERVOY	Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezecabil sau metastatic) la pacientii adulti.	Finalizat
124	VISMODEGIB	ERIVEDGE	Erivedge este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu: carcinom bazocelular metastatic simptomatic sau carcinom bazocelular avansat local, inadecvat pentru interventie chirurgicala sau radioterapie.	Finalizat
125	VEMURAFENIBUM	ZELBORAF	Vemurafenibum este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
126	ABIRATERONUM	ZYTIGA	Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbatii adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei scheme chimioterapeutice pe baza de docetaxel.	Finalizat
127	ABIRATERONUM	ZYTIGA	Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbatii adulti care sunt asimptomatici sau usor simptomatici dupa esecul terapiei de privare de androgeni si la care chimioterapia nu este inca indicata din punct de vedere clinic.	Finalizat
128	APIXABANUM	ELIQUIS	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului sau genunchiului.	Finalizat

129	APIXABANUM	ELIQUIS	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA≥II).	Finalizat
130	FLUTICASONUM FUROATUM	AVAMYS	Avamys este indicat pentru tratamentul simptomelor rinitei alergice. Avamys este indicat la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 6 ani peste).	Finalizat
131	APREPITANTUM	EMEND	Prevenirea senzației de greață și a varsăturilor acute și tardive asociate: ● chimioterapiei anticanceroase pe baza de cisplatina, cu potențial emetogen mare, la adulți. ● chimioterapiei anticanceroase cu potențial emetogen moderat, la adulți.	Finalizat
132	COMBINATII (BRINZOLAMIDUM + TIMOLOLUM)	AZARGA	Scaderea presiunii intraoculare (PIO) la pacienti adulti cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune intraoculara la care monoterapia determina reducerea insuficienta a PIO.	Finalizat
133	BOSUTINIBUM	BOSULIF	Bosulif este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu leucemie mieloida cronica cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) in faza cronica (FC), faza accelerata (FA) sau faza blastica (FB), tratati anterior cu unul sau mai multi inhibitori de tirozininkinaza si la care administrarea de imatinib, nilotinib si dasatinib nu este considerata o optiune terapeutica adecvata.	Finalizat
134	COMBINATII (CANDESARTANUM CILEXETIL+HCT)	CANZENO HCT 16mg/12.5mg	Tratamentul hipertensiunii esentiale insuficient controlata prin monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.	Finalizat
135	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Spondilartrita axiala. Cimzia este indicat in tratamentul pacientilor adulti cu spondilartrita axiala activa severa, incluzand: -Spondilita anchilozata (SA). Adulti cu spondilita anchilozata activa severa care au un raspuns inadecvat sau intoleranta la antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). -Spondilartrita axiala fara dovada radiografica de SA. Adulti cu spondilartrita axiala activa severa fara dovada radiografica de SA, dar cu semne obiective de inflamatie manifestate prin proteina C reactiva (PCR) crescuta si/sau rezonanta magnetica nucleara (RMN), care au avut un raspuns inadecvat sau intoleranta la AINS.	Finalizat

136	APO MORFINUM	DACEPTON	Tratamentul pentru inhibarea fluctuațiilor motorii la pacienții cu boala Parkinson, fluctuații care persista chiar în condițiile administrării unui tratament titrat individual cu Levodopa și/sau alți agonisti ai dopaminei	Finalizat
137	TOXINA BOTULINICA DE TIP A	DYSPO RT	Ca medicație adjuvantă fizioterapiei, pentru reducerea spasticității membrului superior, apărută ca urmare a unui accident vascular cerebral -prezentând astfel un beneficiu semnificativ pentru pacientul adult.	Finalizat
138	DALTEPARINUM	FRAGMIN	Tratamentul de durată al tromboemboliei venoase simptomatice (TEV) pentru prevenirea recurenței TEV la pacienții cu cancer	Finalizat
139	BEVACIZUMABUM	AVASTIN	Neoplasm ovarian epitelial, neoplasm de trompe uterine și neoplasm peritoneal primar.	Finalizat
140	COMBINATII (PERINDOPRILUM+AMLODIPINUM)	AMLESSA	Hipertensiunea arterială esențială și/sau boala coronariană stabilă.	Finalizat
141	NATRII PHENYL BUTYRATE	AMMONAPS	Ammonaps este indicat ca adjuvant în tratamentul cronic al tulburărilor de ciclu ureic, incluzând deficiența de carbamil-fosfat-sintetaza, ornitin-transcarbamilaza sau argininosuccinat-sintetaza.	Finalizat
142	OFATUMUMAB	ARZERRA	Arzerra, în asociere cu clorambucil sau bendamustina, este indicat în tratamentul pacienților cu LLC care nu au primit tratament anterior și care nu sunt eligibili pentru tratamentul pe bază de fludarabina.	Finalizat
143	TERIFLUNOMIDUM	AUBAGIO	Este indicat la adulți, pentru tratamentul pacienților cu scleroză multiplă recurent-remisivă.	Finalizat
144	CABAZITAXELUM	JEVTANA	Jevtana este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostată metastazat hormonorezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel.	Finalizat
145	BILASTINUM	BORENAR	Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice (sezoniere și perene).	Finalizat
146	BILASTINUM	BORENAR	Tratamentul simptomatic al urticăriei.	Finalizat
147	TICAGRELOR	BRILIQUE	Ticagrelor, administrat în asociere cu acid acetilsalicilic, este indicat pentru prevenția evenimentelor aterosclerotice la pacienții adulți cu sindrom coronarian acut (SCA) (angină instabilă, infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST) atât pacienții tratați medical cât și cei tratați prin intervenție coronariană percutanată (PCI) sau by-pass coronarian (CABG).	Finalizat

148	COMBINATII (CANDESARTANUM CILEXETIL+AMLODIPINUM)	CARAMLO	Terapie de substituție la pacienții adulți cu hipertensiune arterială esențială a căror tensiune arterială este controlată adecvat cu amlodipină și candesartan administrate concomitent în aceleași doze	Finalizat
149	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Artrita reumatoida. Cimzia, în asociere cu metotrexatul (MTX), este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide actice, moderată până la severă, la pacienții adulți, atunci răspunsul la medicamentele antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, este inadecvat. Cimzia poate fi administrat în monoterapie în caz de intoleranță la metotrexat sau atunci când tratamentul continuu cu metotrexat este inadecvat. S-a demonstrat că Cimzia reduce rata progresiei distrucției articulare evidențiată radiologic și ameliorează funcționalitatea articulare, atunci când este administrat în asociere cu metotrexat.	Finalizat
150	COMBINATII (BISOPROLOLUM+AMLODIPINUM)	CONCOR AM	Concor AM este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale ca terapie de substituție pentru pacienții la care s-au administrat separat medicamentele individuale în același regim de dozaj ca și în combinație.	Finalizat
151	IVABRADINUM	CORLENTOR	Tratamentul insuficienței cardiace cronice. Ivabradina este indicată în insuficiența cardiacă cronică clasa II-IV NYHA cu disfuncție sistolică, la pacienți în ritm sinus și a căror frecvență cardiacă este ≥ 75 bpm, în asociere cu terapia standard incluzând beta-blocante sau atunci când tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat.	Finalizat
152	Toxina botulinică	Dysport	Torticolis spastic/distonie cervicală (adulți)	Finalizat
153	TOXINA BOTULINICĂ DE TIP A	DYSPORT	Paralizii spastice la copii cu vârstă de doi ani sau peste, cu infirmitate motorie cerebrală cum este deformarea dinamică, datorată spasticității - picior equin	Finalizat
154	PRASUGREL	EFIENT	Prevenirea evenimentelor atero-trombotice la pacienți cu sindrom coronarian acut (adică, angină instabilă, infarct miocardic fără supra-denivelare de segment ST [UA/NSTEMI], infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST [STEMI]) ce suferă o intervenție coronariană per-cutanată (PTCA) primară sau amânată.	Finalizat
155	ACLIDINIUM BROMIDUM	EKLIRA GENUAIR 322 micrograme	Tratament bronhodilatator de menținere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacienții adulți.	Finalizat

156	LAPATINIBUM	TYVERB	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces: în asociere cu trastuzumab, la pacienții cu boală metastatică cu receptori hormonali absenți, progresivă în urma unor terapii anterioare cu trastuzumab în combinație cu chimioterapie	Finalizat
157	METHOTREXATUM	METHOTREXAT EBEWE	Forme severe de psoriazis, în special psoriazisul tip placă, care nu pot fi tratate eficient cu terapie convențională cum ar fi fototerapia, PUVA și retinoizii și psoriazis sever care afectează articulațiile (artrita psoriazică)	Finalizat
158	SILIBINUM	SILIMARINA BIOFARM	Hepatoprotector utilizat ca adjuvant în diferite afecțiuni hepatice cronice incluzând hepatita etanolică	Finalizat
159	INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM	ULTIBRO BREEZHALER 85 micrograme/43 micrograme	Ultibro Breezhaler este indicat în tratamentul bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
160	Perindopril Arginina + Indapamida + Amlodipina	TRIPLIXAM	Hipertensiunea arterială esențială la pacienți a căror afecțiune este deja controlată cu combinația în doză fixă perindopril/indapamida și amlodipina administrate concomitent, în aceleași doze.	Finalizat
161	OFLOXACINUM	UNIFLOX	Infecții bacteriene	Finalizat
162	BRIMONIDINUM	BRIMONAL	Glaucom	Finalizat
163	AGOMELATINUM	VALDOXAN	Tratamentul episoadelor depresive majore	Finalizat
164	DENOSUMAB	PROLIA	Tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză și bărbații cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale și de sold.	Finalizat
165	PANITUMUMAB	VECTIBIX	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezintă gena RAS de tip salvatic (non mutanta) în cadrul tratamentului de primă linie.	Finalizat
166	DENOSUMAB	XGEVA	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologică, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau intervenție chirurgicală la nivel osos) la adulți cu metastaze osoase de tip osteolitice.	Finalizat
167	ADALIMUMABUM	HUMIRA	Artrita juvenilă idiopatică. Poliartrita reumatoidă juvenilă idiopatică.	Finalizat
168	DACLATASVIR	DAKLINZA	Daklinza este indicat, în asociere cu alte medicamente, pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatic C (VHC) la adulți.	Finalizat
169	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom Hodgkin (LH) CD30 +recidivat sau refractar: 1. după transplant de celule stem autologe (TCSA) sau 2. după cel puțin două tratamente anterioare, când TCSA sau chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezintă o opțiune de tratament.	Finalizat
170	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs), recidivat sau refractar.	Finalizat

171	DASABUVIR	EXVIERA 250 mg	Exviera este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
172	OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRUM	VIEKIRAX 12,5mg/ 75mg/ 50mg	Viekirax este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
173	SORAFENIBUM	NEXAVAR 200mg	SORAFENIBUM/nexavar este indicat pentru tratamentul pacientilor cu carcinom tiroidian diferentiat (papilar/folicular/cu celule Hurthle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod radioactiv.	Finalizat
174	RIOCIGUAT	ADEMPAS 0,5mg/ 1mg/ 105mg, 2mg, 205mg	Hipertensiune pulmonara cronica (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu boala a tractului respirativ inferior.	Finalizat
175	SOFOSBUVIR	SOVALDI 400mg	SOVALDI este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul Hepatitei Cronice C (HCC) la adulti. Nu se recomanda administrarea de Sovaldi in monoterapie.	Finalizat
176	SIMEPREVIRUM	OLYSIO	OLYSIO, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.	Finalizat
177	ETHIONAMIDUM	ETIONAMIDA Atb 250mg	Medicament tuberculostatic de linia a II a la pacientii cu rezistenta la medicamentele de linia I.	Finalizat
178	TELBIVUDINA	SEBIVO 600mg	Sebivo este indicat pentru tratamentul hepatitei cronice B la pacientii adulti cu boala hepatica compensata si semne de replicare virala, valoare plasmatica crescuta in mod repetat a alanin aminotransferazei (ALT) si cu semne histologice de inflamatie activa si/sau fibroza.	Finalizat
179	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40mg/ml sol.inj	Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinata de edemul macular diabetic (EMD).	Finalizat
180	MACITENTANUM	OPSUMIT	Opsumit, administrat in monoterapie sau in asociere, este indicat pentru tratamentul pe termen lung al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacientii adulti aflati in clasa functionala II sau III OMS.	Finalizat
181	BEDAQUILINUM	SIRTURO	SIRTURO este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.	Finalizat
182	LEDIPASVIR/ SOFOSBUVIR	HARVONI 90mg/400mg	Tratamentul hepatitei C cronice la adulti	Finalizat

183	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu sindroame mielodisplazice (SMD) cu risc intermediar-2 și mare, conform Sistemului Internațional de Punctaj referitor la Prognostic (SIPP)	Finalizat
184	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) cu 10-29 % blaști medulari, fără boală mieloproliferativă	Finalizat
185	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30 % blaști și linii multiple de diferențiere a displaziei, conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)	Finalizat
186	LENALIDOMIDUM	REVLIMID	Revlimid este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
187	COMBINATII (ROSUVASTATINUM+ EZETINIBUM)	LIPOCOMB 10mg/10mg si 20mg/20mg	Lipocomb este indicat ca adjuvant al regimului alimentar în tratamentul hipercolesterolemiei (exceptând hipercolesterolemia heterozigotă familială) la pacienții adulți • care nu sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină în monoterapie; sau • ca terapie de substituție la pacienții controlați în mod adecvat cu substanțele individuale administrare concomitent, la aceleași concentrații ca și în combinația în doză fixă, dar administrate	Finalizat
188	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Prevenirea evenimentelor trombotice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului	Finalizat

189	CANAGLIFLOZINUM	INVOKANA	Invokana este indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic fiind administrat ca: Monoterapie În cazul în care doar prin dietă și exerciții fizice nu se obține un control glicemic adecvat la pacienții la care utilizarea de metformin este inadecvată datorită intoleranței sau contraindicațiilor. Terapie adjuvantă Terapie adjuvantă la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control glicemic	Finalizat
190	BOSUTINIB	BOSULIF	Bosutinib este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) în faza cronică (FC), faza accelerată (FA) sau faza blastică (FB), tratați anterior cu unul sau mai mulți inhibitori de tirozininkinază și la care administrarea de imatinib, nilotinib și dasatinib nu este considerată o opțiune	Finalizat
191	Bromura de Aclidinium + Fumarat de Formoterol	DUAKLIR GENUAIR	Boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
192	CABAZITAXELUM	JEVTANA	Jevtana este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schema de tratament continuând	Finalizat
193	AFLIBERCEPTUM	ZALTRAP	Zaltrap în asociere cu chimioterapie cu irinotecan și fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulți cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat după o schema de	Finalizat
194	OLAPARIBUM	LYNPARZA 50mg	Lynparza este indicat în monoterapie ca tratament de întreținere la paciențe adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivant cu mutație BRCA (germinală și/sau somatică), neoplazie de trompa uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe baza de platina, cu răspuns (complet sau parțial) la	Finalizat
195	GEFITINIBUM	IRESSA	Iressa este indicată pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozinikinazei receptorului factorului de creștere	Finalizat
196	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea trombozei venoase profunde și a emboliei pulmonare recurente la adulți.	Finalizat
197	RAMUCIRUMAB	CYRAMZA	Neoplasm gastric	Finalizat
198	METOPROLOL TARTRAT+ IVABRADINA	IMPLICOR	terapie de substituție pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienții adulți cu ritm sinusal normal, a căror afecțiune este deja controlată cu metoprolol și ivabradină	Finalizat
199	IPILIMUMAB	YERVOY	Yervoy este indicat în tratamentul melanomului în stadii avansate (nerezectabil sau metastatic) la pacienții adulți.	Finalizat

200	THALIDOMIDUM	THALIDOMIDE CELGENE	Thalidomide Celgene in asociere cu melfalan si prednison este indicat ca tratament de prima linie la pacientii cu mielom multiplu netratat, cu varsta ≥ 65 de ani sau care nu sunt eligibili pentru chimioterapie ce doze mari.	Finalizat
201	ABIRATERONUM	ZYTIGA	ZYTIGA este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în tratamentul neoplasmului de prostată metastatic rezistent la castrare, la bărbații adulți care sunt asimptomatici sau ușor simptomatici după eșecul terapiei de privare de androgeni și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic	Finalizat
202	IBRUTINIB	IMBRUVICA 140 mg	IMBRUVICA este indicat in tratamentul pacientilor adulti cu leucemie cronica (LLC) carora li s-a administrat cel putin o terapie anterioara sau ca terapie de prima linie în prezenta deletiei 17p sau mutatiei TP53 la pacientii care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.	Finalizat
203	IBRUTINIB	IMBRUVICA 140 mg	IMBRUVICA este indicat in tratamentul pacientilor cu limfom cu celule de manta (LCM) recidivant sau refractar.	Finalizat
204	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat in monoterapie pentru tratamentul melanomului în stadiu avansat (nerezectabil sau metastazat) la adulti.	Finalizat
205	BROMURA DE ACLIDINIUM + FUMARAT DE FORMOTEROL	BRIMICA GENUAIR	BRIMICA GENUAIR este utilizat ca tratament bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la adulții cu boală pulmonară cronică obstructivă (BPOC)	Finalizat
206	PAZOPANIBUM	VOTRIENT	Votrient este indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul cu celule renale (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a administrat anterior terapia cu citokine pentru boala in stadiu avansat.	Finalizat
207	PIRFENIDONE	ESBRIET 267 mg	Esbriet este indicat la adulti pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice (FPI) usoare pana la moderate.	Finalizat
208	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	Xtandi este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti cu simptomatologie absenta sau usoara, dupa esecul terapiei de deprivare androgenica, la care chimioterapia nu este usoara inca indicata din punct de vedere clinic.	Finalizat
209	DARUNAVIRUM + COBICISTATUM	REZOLSTA 80mg/150mg	REZOLSTA este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientiei umane (HIV-1) la adulti, incepand cu varsta de 18 ani.	Finalizat
210	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienți adulți.	Finalizat

211	OBINUTUZUMABUM	GAZYVARO	GAZYVARO administrat in asociere cu clorambucil este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu leucemie limfocitara cronica (LLC) netratata anterior si cu comorbiditati care nu permit administrarea unui tratament pe baza de fludarabina in doza completa.	Finalizat
212	VELAGLUCERAZĂ ALFA	VPRIV 400 unități pulbere pentru soluție perfuzabilă	VPRIV este indicat pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu tipul 1 de boală Gaucher.	Finalizat
213	TETRABENAZINUM	TETMODIS 25mg	Tratamentul tulburarilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington.	Finalizat
214	FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	ATIMOS 0,012mg	ATIMOS este indicat in tratamentul regulat al afectiunilor obstructive reversibile ale cailor respiratorii la pacienti cu bronhopneumonie cronica obscura, unde este necesara terapia cu bronhodilatator.	Finalizat
215	VEMURAFENIBUM	ZELBORAF 240mg	VEMURAFENIB este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
216	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	XTANDI este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat
217	AGALSIDASUM ALFA	REPLAGAL	Terapia de substitutie enzimatica pe termen lung la pacienti cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienta de α -galactosidaza A)	Finalizat
218	ATALUREN	TRANSLARNA	Tratamentul pacientilor ambulatorii cu varsta de 5 ani si peste cu distrofie musculara Duchenne determinata de o mutatie de tip nonsens la nivelul genei distofinei.	Finalizat
219	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbări repetate la pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
220	PASIREOTIDUM	SIGNIFOR	SIGNIFOR este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu acromegalie pentru care o interventie chirurgicala nu constituie o optiune sau care nu a avut rezultate curative si care nu sunt controlati corespunzator prin tratament cu alt analog al somatostatinei.	Finalizat
221	CARFILZOMIB	KYPROLIS	KYPROLIS administrat in combinatie ori cu lenalidomida si cu dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu la care s-a administrat cel putin o terapie anterioara.	Finalizat

222	NINTEDANIBUM	OFEV	OFEV este indicat la adulti pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatie	Finalizat
223	ELBASVIR/GRAZOPREVIR	ZEPATIER	ZEPATIER este indicat in tratamentul hepatitei C cronice la adulti.	Finalizat
224	SECUKINUMAB	COSENTYX	Cosentyx este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică.	Finalizat
225	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decat cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local avansat sau metastazat, dupa tratamentul anterior cu chimioterapie, la adulti. OPDIVO este indicat pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decat cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local avansat sau metastazat, dupa tratamentul anterior cu chimioterapie, la adulti.	Finalizat
226	PERTUZUMABUM	PERJETA	PERJETA este indicat pentru utilizarea in asociere cu trastuzumab si docetaxel la pacientii adulti cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatica.	Finalizat
227	ATAZANAVIR + COBICISTAT	EVOTAZ	EVOTAZ este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infectiei cu virusul de tip 1 al imunodeficientei umane dobandite (HIV-1) la adulti fara mutatii cunoscute asociate rezistentei la atazanavir .	Finalizat
228	INCATIBANT	FIRAZYR	Tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditat la adulti (cu deficit de inhibitor al C1-I esterazei).	Finalizat
229	PONATINIB	ICLUSIG	1. leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică, în fază accelerată sau în fază blastică, care prezintă rezistență la dasatinib sau nilotinib, care prezintă intoleranță la dasatinib sau nilotinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I 2. leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+) , care prezintă rezistență la dasatinib, care prezintă intoleranță la dasatinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I.	Finalizat

230	COMBINATII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)	EUCREAS 50mg/1000mg	Eucreas este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat în tratamentul pacienților adulți care nu pot obține un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt tratați deja cu o asociere de vildagliptin și metformină sub formă de comprimate separate. - Eucreas este indicat în combinație cu o sulfoniluree (și anume terapie în combinație triplă) ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice la pacienții adulți, controlați necorespunzător cu metformină și o sulfoniluree. - Eucreas este indicat în terapie în combinație triplă cu insulină ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice pentru a îmbunătăți controlul glicemic la pacienți adulți când utilizarea insulinei în doză stabilă și metformina administrată în monoterapie nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
231	TRAMETINIB	MEKINIST	Trametinib, administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib, este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, cu mutație BRAF V600	Finalizat
232	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbări repetate la pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
233	COMBINATII (TIOTROPIUM+OLODATEROLUM)	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 micrograme/2,5 micrograme	SPIOLTO RESPIMAT este indicat ca tratament bronhodilatator de întreținere, cu rol de ameliorare a simptomelor la pacienții adulți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
234	MECASERMIN	INCRELEX	Laron Syndrome	Finalizat
235	DAPAGLIFLOZIN	FORXIGA	Diabet zaharat tip 2	Finalizat
236	PANOBINOSTAT	FARYDAK	Farydak, administrat în combinație cu bortezomib și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și/sau refractar cărora li s-au administrat cel puțin două scheme anterioare de tratament incluzând bortezomib și o substanță imunomodulatoare.	Finalizat

237	TRASTUZUMAB EMTANSINE	KADCYLA	KADCYLA ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2- pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
238	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă , moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
239	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn , moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
240	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA 2,5 mg comprimate filmate	ONGLYZA este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulină (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
241	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA 2,5 mg comprimate filmate	ONGLYZA este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic: în terapia orală triplă în asociere cu: metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
242	ELVITEGRAVIR / COBICISTAT / EMTRICITABINE / TENOFOVIR ALAFENAMIDE	GENVOYA	GENVOYA este indicat pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir.	Finalizat

243	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)	DESCOVY 200 mg/10 mg comprimate filmate	DESCOVY este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
244	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)	DESCOVY 200 mg/25mg comprimate filmate	DESCOVY este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
245	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	Finalizat
246	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx este indicat în tratamentul spondilitei anchilozante active la adulții care au răspuns necorespunzător la terapia convențională.	Finalizat
247	FLUTIFORM	COMBINATII (FLUTICASONUM+FORMOTEROLUM)	Această combinație în doză fixă de propionat de fluticazonă și fumarat de formoterol (Flutiform) este indicată în tratamentul de întreținere al astmului bronșic în cazul în care este indicată utilizarea unui medicament combinat (un corticosteroid inhalator și un β2 agonist cu durată lungă de acțiune): La pacienții la care nu se obține control adecvat cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agoniști cu durată scurtă de acțiune, administrați la nevoie. Sau La pacienții la care s-a obținut deja control adecvat atât cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agoniști cu durată lungă de acțiune.	Finalizat
248	OSIMERTINIB MESYLATE	TAGRISSO	TAGRISSO este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat
249	DELAMANAID	DELTYBA 50 mg	Deltiba este indicat pentru utilizare în cadrul unui regim terapeutic asociat adecvat pentru tuberculoza pulmonară plurirezistentă la medicamente la pacienți adulți atunci când un regim terapeutic eficace nu poate fi altfel constituit din motive de rezistență sau tolerabilitate	Finalizat

250	APIXABAN	ELIQUIS	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II)	în curs de evaluare
251	NIVOLUMAB	OPDIVO	Monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal după terapie anterioară, la adulți.	Finalizat
252	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	Tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), local avansat sau metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament aprobat pentru aceste mutații înaintea administrării KEYTRUDA.	Finalizat
253	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al mielomului multiplu în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomidă sau bortezomib	Finalizat
254	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Ca monoterapie în limfomul non-Hodgkin latent, la pacienții cu progresie a bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă terapeutică care conține rituximab.	Finalizat
255	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al leucemiei limfatice cronice (stadiul B sau C Binet) la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabină.	Finalizat
256	COMBINATII (SAXAGLIPTIN+DAPAGLIFLOZINUM)	QTERN	Qtern, combinație în doză fixă de saxagliptin și dapagliflozin este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2: - pentru îmbunătățirea controlului glicemic atunci când metformin și/sau sulfoniluree (SU) și una din monocomponentele din Qtern nu asigură un control adecvat al glicemiei, - atunci când sunt deja tratați cu combinația liberă de dapagliflozin și saxagliptin	Finalizat

257	LANREOTIDUM	SOMATULINE AUTOGEL 120mg	Tratamentul tumorilor neuroendocrine gastroenteropancreatice (GEP-NETs) de gradul 1 și un subset al gradului 2 (indice Ki67 până la 10%) de origine mezenterică, pancreatică sau necunoscută (acolo unde a fost exclusă originea în hemicolonul stang și rect), la pacienții adulți cu boală local avansată nerezecabilă sau la cei cu boală metastatică	Finalizat
258	BLINATUMOMAB	BLINCYTO	Tratamentul adulților cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia negativ	Finalizat
259	IDEBENONUM	RAXONE	Tratamentul tulburărilor de vedere la pacienții adolescenți și adulți cu neuropatie optică ereditară Leber (LHON)	Finalizat
260	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.03% ung	Tratamentul recurențelor adulților și adolescenților (cu vârsta peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici. Copii (cu vârsta peste 2 ani) Tratamentul dermatitelor atopice moderate până la severe la copiii care nu au răspuns adecvat la terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici.	în curs de evaluare
261	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.1% ung	Tratamentul recurențelor adulților și adolescenților (cu vârsta peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici	în curs de evaluare
262	ALEMTUZUMAB	LEMTRADA	LEMTRADA este indicat la pacienți adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR), cu boală activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	
263	CABAZITAXELUM	JEVTANA	JEVTANA este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel	
264	ABACAVIR SULFATE / DOLUTEGRAVIR SODIUM / LAMIVUDINE	TRIUMEQ	TRIUMEQ este indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat

265	EMPAGLIFLOZIN	JARDIANCE	Jardiance este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulți, ca: Monoterapie Atunci când numai dieta și exercițiul fizic nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminei este considerată inadecvată din cauza intoleranței. Terapie asociată suplimentară În asociere cu alte medicamente hipoglicemiante, incluzând insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei (vezi pct. 4.4, 4.5 și 5.1 pentru datele disponibile cu privire la diferite asocieri)	
266	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg	tratamentul antiretroviral combinat în tratarea adulților infectați cu VIH-1; antiretroviral pentru utilizare sistemică; antiretrovirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații	Finalizat
267	PALIPERIDONUM	TREVICTA	TREVICTA, injecție cu o administrare la 3 luni, este indicată în tratamentul de întreținere al schizofreniei la pacienții adulți care sunt stabiliizați clinic cu palmitat de paliperidonă injectabil cu o administrare lunară	Finalizat
268	TOCILIZUMABUM	ROACTEMRA	RoActemra administrat în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat pentru: tratamentul pacienților adulți cu PR activă, moderată până la severă, care au avut fie un răspuns inadecvat, fie nu au tolerat tratamentul cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD) sau cu inhibitori ai factorului de necroză tumorală (TNF). La acești pacienți, RoActemra poate fi administrat ca monoterapie, în cazul intoleranței la MTX sau unde continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată. S-a demonstrat că RoActemra scade rata de progresie a leziunilor articulare, evaluată radiologic și îmbunătățește funcția fizică atunci când este administrat în asociere cu metotrexat.	
269	COMBINAȚII(BRINZOLAMIDUM+BRIMONIDINUM)	SIMBRINZA	Scăderea presiunii intraoculare (PIO) crescute, la pacienți adulți cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune oculară, la care monoterapia nu asigură o reducere suficientă a PIO	În curs de evaluare

270	COMBINATII (SACUBITRILUM+VALSARTANUM)	ENTRESTO 24 mg/26 mg ENTRESTO 49 mg/51 mg mg ENTRESTO 97 mg/103 mg	Entresto este indicat la pacienții adulți în tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejeție redusă	
271	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA	IMBRUVICA este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu macroglobulinemie Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau ca terapie de primă linie la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.	
272	TTRASTUZUMABUM EMTANSINUM	KADCYLA	Kadcyla, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
273	BELIMUMAB	BENLYSTA	Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacienții adulți cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard	
274	COMBINATII (AZELASTINUM+FLUTICASONUM)	DYMISTA 137 micrograme/50 micrograme/doza	Ameliorarea simptomelor de rinită alergică sezonieră și perenă moderate până la severe dacă monoterapia cu antihistaminice intranasale sau glucocorticoizi nu este considerată suficientă.	
275	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)	DUNOTRISIN	Dunotrisin este o combinație cu doză fixă de emtricitabină și succinat de tenofovir disoproxil. Este indicat în terapia antiretrovirală combinată pentru tratamentul adulților cu vârsta de 18 ani și peste, infectați cu HIV-1.	Finalizat
276	APIXABANUM	ELIQUIS	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului	În curs de evaluare
277	OSIMERTINIBUM	TAGRISSO 80 mg comprimate filmate	TAGRISSO este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat
278	COMBINATII (ELBASVIRUM+GRAZOPREVIRUM)	ZEPATIER	ZEPATIER este indicat în tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adulți.	Retras

279	COMBINATII (DARUNAVIRUM+COBICISTATUM)	REZOLSTA	REZOLSTA este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1) la adulți, începând cu vârsta de 18 ani.	Finalizat
280	IXEKIZUMAB	TALTZ 80 mg soluție injectabilă în seringă preumplută	Taltz este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.	Finalizat
281	RAMUCIRUMAB	CYRAMZA 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Cyramza în asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină Cyramza este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat	Finalizat
282	RILPIVIRINUM	EDURANT	EDURANT, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1 ≤ 100000 copii/ml.	Finalizat
283	SECUKINUMABUM	COSENTYX	Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	
284	COMBINATII (BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)	FOSTER100/6 mcg/doză	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS<50%din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu acțiune de lungă durată	

285	COMBINATII (BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM)	FOSTER NEXTHALER 200/6 mcg/doză	Tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu lungă durată de acțiune) este adecvată: - pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie - pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată lungă de acțiune	
286	PERTUZUMABUM	PERJETA 420mg	Perjeta este indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.	
287	LAPATINIB	TYVERB	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces: ☒ în asociere cu capecitabina, la pacienții cu neoplasm mamar avansat sau metastatic, progresiv în urma unor terapii anterioare, care trebuie să fi inclus antraciline și taxani și terapie cu trastuzumab, în context metastatic	Finalizat

288	BEVACIZUMABUM	AVASTIN	1. Bevacizumab administrat în asociere cu carboplatină și paclitaxel este indicat ca tratament de primă linie al pacienților adulte cu neoplasm ovarian epitelial (stadiile FIGO (Federația Internațională de Ginecologie și Obstetrică) IIIB, IIIC și IV), al trompelor uterine sau cu neoplasm peritoneal primar în stadii avansate. 2. Bevacizumab, administrat în asociere cu carboplatină și gemcitabină, este indicat pentru tratamentul pacienților adulte la care s-a diagnosticat prima recidivă de neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, sensibile la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-a administrat anterior tratament cu bevacizumab sau alți inhibitori ai factorului de creștere a endoteliului vascular (FCEV) sau terapie țintă asupra receptorului FCEV 3. Bevacizumab administrat în asociere cu paclitaxel, topotecan sau doxorubicină lipozomală polietilenglicată este indicat pentru tratamentul pacienților adulte cu neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, recurente, rezistente la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-au administrat mai mult de două scheme chimioterapice și care nu au fost tratate anterior cu bevacizumab sau cu alți inhibitori ai FCEV sau cu terapie țintă asupra receptorului FCEV	
289	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	Herceptin în asociere cu capecitabină sau 5-fluorouracil și cisplatină este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu adenocarcinom gastric metastazat HER2 pozitiv sau a joncțiunii gastroesofagiene, cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului pentru boala lor metastatică	Finalizat
290	PEMBROLIZUMABUM	KEYTRUDA 50mg	KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporțional (STP) $\geq 50\%$, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.	Finalizat
291	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINĂ/FU MARAT TENOFOVIR ALAFENAMIDA	GENVOYA	Tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazelor, emtricitabină sau tenofovir	Finalizat

292	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Artrită psoriazică Cimzia în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evoluției bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie în cazul intoleranței la MTX sau când continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată	
293	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Spondilartrită axială severă, incluzând: Spondilita anchilozantă (SA) - Adulți cu spondilită anchilozantă activă severă care au un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS Spondilartrită axială fără dovadă radiografică de SA- Adulți cu spondilartrită axială activă severă fără dovadă radiografică de SA, dar cu semne obiective de inflamație manifestate prin proteina C reactivă (PCR) crescută și/sau rezonanță magnetică nucleară (RMN), care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS	
294	DOLUTEGRAVIR+ABACA VIR+LAMIVUDINUM	TRIUMEQ	indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat
295	DARTUMUMAB	DARZALEX	1) în monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și refractar , care au fost tratați anterior cu un inhibitor de proteazom și un agent imunomodulator și care au înregistrat progresia bolii sub ultimul tratament.; 2) în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	în curs de evaluare
296	EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA	DESCOVY 250mg/25 mg	Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
297	EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDA	DESCOVY 200mg/10 mg	Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat

298	BARICITINIB	OLUMIANT	Tratamentul poliartritei reumatoide active moderat până la severă la pacienții adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală	Necesar confirmarea prețului de către MS
299	DULAGLUTIDUM	TRULICITY	Trulicity este indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de: Monoterapie Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. Terapie combinată În combinație cu alte medicamente hipoglicemiante, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	Necesar confirmarea prețului de către MS
300	COMBINATII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)	SULIQUA	Suliqua este indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală	
301	TAFLUPROSTUM	SAFLUTAN	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: - o care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți - o care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie - o care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante. SAFLUTAN este indicat la adulți cu vârsta ≥18 ani.	

302	ALIROCUMABUM	PRALUENT	Praluent este indicat la adulți cu hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă și non-familială) sau cu dislipidemie mixtă, ca adjuvant la dietă: - în asociere cu o statină sau cu o statină împreună cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți la care nu s-au putut atinge valori țintă ale LDL-colesterolului cu o statină administrată în doza maximă tolerată, sau - singur sau în asociere cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți cu intoleranță la statine sau la care este contraindicată administrarea de statine.	
303	CARFILZOMIBUM	KYPROLIS 60 mg	Kyprolis administrat în asociere cu lenalidomidă și cu dexametazonă sau numai cu dexametazonă este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară	
304	ELTROMBOPAG	REVOLADE	Revolade este indicat pentru tratamentul purperei trombocitopenice imune (idiopatice) (PTI) cronice la pacienții cu vârsta de 1 an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	
305	IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA, CU ADMINISTRARE EXTRAVASCULARA	GAMMANORM 165 mg/mL	Terapie de substitutie la adulti, adolescenti si copii (cu varsta intre 0 si 18 ani) cu sindroame de imunodeficienta primara cum sunt: -agamaglobulinemie si hipogamaglobulinemie congenitale; -imunodeficienta comuna variabila (IDCV); -imunodeficienta severa combinata; -deficite de subclasa IgG cu infectii recurente;	