

Tuss OFF MAX 600 mg pulbere pentru soluție orală în plic
Acetilcisteină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tuss OFF MAX 600 mg pulbere pentru soluție orală în plic
Acetilcisteină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

Fiecare plic cu 2,4 g pulbere conține acetilcisteină 600 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Pulbere pentru soluție orală în plic

6 plicuri a câte 2,4 g pulbere pentru soluție orală
10 plicuri a câte 2,4 g pulbere pentru soluție orală

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

**NU CONȚINE ZAHĂR
MIERE ȘI LĂMÂIE**

8. DATA DE EXPIRARE

Exp:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.
Soluția este stabilă timp de 3 ore după reconstituirea în apă fierbinte.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Slavia Pharm SRL
B-dul Theodor Pallady, nr. 44C,
Sectorul 3, cod poștal 032266, București,
România
{Logo Slavia Pharm SRL}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16387/2025/01-02

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Terapie mucolitică în afecțiuni respiratorii

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acetilcisteina este indicată ca terapie mucolitică în afecțiuni respiratorii (bronșită acută, bronșiectazii, bronșita cronică și acutizările acesteia, mucoviscidoză) caracterizate de hipersecreție densă și vâscoasă.

Dacă nu este altfel prescris de către medicul dumneavoastră, doza uzuală este:

Copii cu vârsta sub 2 ani

Datorită cantității mari de substanță activă **Tuss OFF MAX 600 mg** nu trebuie utilizat la copiii cu vârsta sub 2 ani.

Copii și adolescenți cu vârsta sub 14 ani

Datorită cantității mari de substanță activă **Tuss OFF MAX 600 mg** nu trebuie utilizat la copiii și adolescenții cu vârsta sub 14 ani. Se recomandă folosirea formelor farmaceutice adecvate vârstei.

Adulți și adolescenți cu vârsta peste 14 ani

1 plic o dată pe zi (echivalent cu 600 mg acetilcisteină).

MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DURATA TRATAMENTULUI:

Luați **Tuss OFF MAX 600 mg** după mese. Dizolvați pulberea într-o cană cu apă fierbinte (aprox. 200 mL) și beți întregul conținut al căni, cât de fierbinte puteți.

Se obține un lichid opalescent cu miros și gust aromat de lămâie și miere. Soluția este stabilă timp de 3 ore după reconstituire în apă fierbinte.

Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se ameliorează după 4-5 zile, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Tuss OFF MAX 600 mg

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Tuss OFF MAX 600 mg pulbere pentru soluție orală în plic
Acetilcisteină

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE
TERMOSUDATĂ**
Plic

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Tuss OFF MAX 600 mg pulbere pentru soluție orală în plic
Acetilcisteină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

{Logo Slavia Pharm SRL}

3. DATA DE EXPIRARE

Exp:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. ALTE INFORMAȚII

Terapia mucolitică în afecțiuni respiratorii
MIERE ȘI LĂMÂIE
NU conține zahăr

MODUL DE ADMINISTRARE:

Luați **Tuss OFF MAX 600 mg** după mese. Dizolvați pulberea într-o cană cu apă fierbinte (aprox. 200 mL) și beți întregul conținut al cunii, cât de fierbinte puteți. Se obține un lichid opalescent cu miros și gust aromat de lămâie și miere. Soluția este stabilă timp de 3 ore după reconstituire în apă fierbinte.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.