

STORINYL sirop

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STORINYL sirop

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

100 g sirop conțin:

<i>Dulcamara</i> 5 CH.....	0,01 g
<i>Ferrum phosphoricum</i> 9 CH.....	0,01 g
<i>Hydrastis canadensis</i> 9 CH.....	0,01 g
<i>Kalium bichromicum</i> 9 CH.....	0,01 g
<i>Nux vomica</i> 9 CH.....	0,01 g

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți cu efect cunoscut: sucroză lichidă, benzoat de sodiu (E211).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Sirop

Cutie cu un flacon de 200 ml sirop și o măsură dozatoare cu gradații pentru măsurarea volumelor de 5 și 15 ml.

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.
Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după mai mult de 1 an de la prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16434/2026/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MEDICAMENT HOMEOPATIC

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul simptomatic al răcelii (congestie nazală, secreții nazale, strănut, dureri ușoare în gât) și al tusei (uscată și productivă).

Adulți și copii peste 12 ani: o doză de 15 ml, folosind măsura dozatoare, de 3 până la 5 ori pe zi.

Copii între 2 și 12 ani: o doză de 5 ml, folosind măsura dozatoare, de 3 ori pe zi.

Copii mai mici de 2 ani: o doză de 5 ml, folosind măsura dozatoare, de 3 ori pe zi. Pentru a fi administrat, siropul trebuie diluat într-o cantitate mică de lichid.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească o săptămână.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

STORINYL

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

STORINYL sirop**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**

FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

STORINYL sirop

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(SUBSTANȚELOR) ACTIVE

100 g sirop conțin:

<i>Dulcamara</i> 5 CH.....	0,01 g
<i>Ferrum phosphoricum</i> 9 CH	0,01 g
<i>Hydrastis canadensis</i> 9 CH	0,01 g
<i>Kalium bichromicum</i> 9 CH.....	0,01 g
<i>Nux vomica</i> 9 CH	0,01 g

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți cu efect cunoscut: sucroză lichidă, benzoat de sodiu (E211).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**Sirop**

Cutie cu un flacon de 200 ml sirop și o măsură dozatoare cu gradații pentru măsurarea volumelor de 5 și 15 ml

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

A nu se utiliza după mai mult de 1 an de la prima deschidere a flaconului.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

BOIRON
2 avenue de l'Ouest Lyonnais
69510 Messimy
Franța

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16434/2026/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

LOT

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

MEDICAMENT HOMEOPATIC

Medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul simptomatic al răcelii (congestie nazală, secreții nazale, strănut, dureri ușoare în gât) și al tusei (uscată și productivă).

Adulți și copii peste 12 ani: o doză de 15 ml, folosind măsura dozatoare, de 3 până la 5 ori pe zi.

Copii între 2 și 12 ani: o doză de 5 ml, folosind măsura dozatoare, de 3 ori pe zi.

Copii mai mici de 2 ani: o doză de 5 ml, folosind măsura dozatoare, de 3 ori pe zi. Pentru a fi administrat, siropul trebuie diluat într-o cantitate mică de lichid.

Durata tratamentului nu trebuie să depășească o săptămână.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.