

**Advil Duo 500 mg/200 mg comprimate filmate**  
paracetamol/ibuprofen**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE DIN CARTON (pentru blistere)****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Advil Duo 500 mg/200 mg comprimate filmate

paracetamol/ibuprofen

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Fiecare comprimat filmat conține paracetamol 500 mg și ibuprofen 200 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR****4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

comprimat filmat

10 comprimate filmate

20 comprimate filmate

**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare orală.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

Conține paracetamol.

Dozele mai mari decât cele recomandate pot provoca leziuni hepatice grave. Nu utilizați Advil Duo dacă luați deja alte medicamente pentru durere care conțin paracetamol.

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE****10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL****11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Haleon România S.R.L.  
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One  
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București  
România

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

16535/2026/01 – ambalaj cu 10 comprimate filmate  
16535/2026/02 – ambalaj cu 20 comprimate filmate

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Medicament cu efect antipiretic, antiinflamator și analgezic.

Advil Duo este utilizat la adulți pentru tratamentul simptomatic de scurtă durată al durerii de intensitate ușoară până la moderată asociată cu migrenă, durere de cap, durere de spate, durere menstruală, durere dentară, durere reumatică și musculară, durere artritică non-gravă, simptome de răceală și gripă, durere în gât, febră.

Administrați 1 comprimat (sau, dacă este necesar, 2 comprimate pentru adulți cu o greutate corporală de 60 kg sau peste,) cu apă și alimente, de până la 3 ori pe zi. Lăsați cel puțin 6 ore între doze și nu luați mai mult de 6 comprimate într-un interval de 24 de ore.

A nu se administra pe o perioadă mai mare de 3 zile.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

advil duo

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**Advil Duo 500 mg/200 mg comprimate filmate**  
paracetamol/ibuprofen

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER**

**Blister**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Advil Duo 500 mg/200 mg comprimate filmate  
paracetamol/ibuprofen

**2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

{Haleon România}

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**5. ALTE INFORMAȚII**