

Panadol Junior 48 mg/ ml, suspensie orală
Paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ȘI PRIMAR
CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Panadol Junior 48 mg/ml, suspensie orală
Paracetamol

2. DECLARAREA SUBSTANȚELOR ACTIVE

Fiecare 1 ml de suspensie orală conține 48 mg paracetamol.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Conține maltitol (E 965), sorbitol (E 420), metil parahidroxibenzoat (E 218), propil parahidroxibenzoat (E 216) (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Suspensie orală
1 flacon a 100 ml suspensie orală,
măsură dozatoare (2 - 15 ml)

5. MODUL ȘI CALEA DE ADMINISTRARE

Orală
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

După prima deschidere a flaconului, medicamentul poate fi utilizat până la sfârșitul perioadei de valabilitate.

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Haleon România S.R.L.
Str. Costache Negri, Nr. 1-5, Opera Center One
Etaj 6 (Zona 2), Sector 5, București
România

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16546/2026/01

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Suspensia, cu aromă de căpșuni, este destinată administrării la copii cu vârste cuprinse între 4 și 12 ani.

Panadol Junior conține paracetamol care acționează ca analgezic (calmează durerile) și antipiretic (reduce febra).

CÂND SE FOLOSEȘTE?

Panadol Junior se folosește pentru tratamentul simptomatic al:

Durerilor din perioada erupției dentare

Durerilor dentare

Durerilor de urechi

Durerilor în gât

Răcelii și gripei

Febrei asociate bolilor infecțioase ale copilăriei, de exemplu pojar, tuse convulsivă, oreion și vărsat de vânt.

CUM SE ADMINISTREAZĂ?

Suspensie orală. A se agita flaconul înainte de utilizare.

Greutate	Vârstă	mL
16-19 kg	4-5 Ani	5 mL
20-25 kg	6-7 Ani	6 mL
26-31 kg	8-9 Ani	8 mL
32-42 kg	10-12 Ani	10 mL

Folosiți măsura dozatoare furnizată pentru a măsura cu exactitate.

Turnați doza corectă în măsura dozatoare, pe baza tabelului de dozare.

Calculați doza corectă în funcție de greutatea copilului. Dacă nu se cunoaște greutatea, folosiți vârsta copilului.

După utilizare, trebuie să curățați măsura dozatoare cu apă caldă și apoi să o uscați, nu este necesară sterilizarea acesteia.

După ce administrați medicamentul apăsați capacul flaconului în jos și rotiți-l pentru a-l închide bine apoi răsuciți înapoi capacul până auziți un clic.

Doza se poate repeta la intervale de 4 ore, dacă este necesar. Nu trebuie administrate mai mult de 4 doze în 24 de ore.

CEREȚI SFATUL MEDICULUI:

-dacă simptomatologia nu se ameliorează după 3 zile de tratament;

IMPORTANT

NU DEPĂȘIȚI DOZELE RECOMANDATE.

CONȚINE PARACETAMOL.

NU ADMINISTRAȚI CONCOMITENT CU ALTE MEDICAMENTE CONȚINÂND PARACETAMOL.

Acest medicament se administrează numai dacă este necesar.

Depășirea dozelor recomandate poate produce insuficiență hepatică.

SOLICITAȚI IMEDIAT CONSULT MEDICAL ÎN CAZUL SUPRADOZAJULUI, CHIAR DACĂ COPILUL SE SIMTE BINE.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Panadol Junior 48 mg/ml

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Panadol Junior 48 mg/ ml, suspensie orală
Paracetamol

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

ETICHETA PENTRU FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA (CAILE) DE ADMINISTRARE

Panadol Junior 48 mg/ ml, suspensie orală
Paracetamol
Administrare orală

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

100 ml

6. ALTE INFORMAȚII

HALEON ROMÂNIA S.R.L.