

Ibuprofen Dr.Max 50 mg/g gel

ibuprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ibuprofen Dr.Max 50 mg/g gel
ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare gram conține ibuprofen 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: levomentol, carbomer A, diizopropanolamină 90% (pentru ajustarea pH-ului), alcool izopropilic, glicerol (E 422), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel

50 g
100 g
150 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de prima deschidere: a nu se păstra la frigider sau congela.

După prima deschidere a tubului: a nu se utiliza după 3 luni. A se păstra la temperaturi sub 25 °C. A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ****Deținătorul autorizației de punere pe piață:**

Dr. Max Pharma s.r.o.

Na Florenci 2116/15

Nové Město

110 00 Praga 1

Republica Cehă

12. NUMĂRUL(E) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

APP nr.: 16556/2026/01 – ambalaj cu un tub a 50 g

APP nr.: 16556/2026/02 – ambalaj cu un tub a 100 g

APP nr.: 16556/2026/03 – ambalaj cu un tub a 150 g

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Tratamentul simptomatic local al durerilor musculare ocazionale, cauzate de mici vânătăi, lovituri sau întinderi, gât înțepenit sau alte contracturi, entorse ușoare și dureri de spate.

Adulți și adolescenți (cu vârsta peste 12 ani):

Aplicați 4 până la 10 cm de gel pe zona afectată și masați ușor, până se absoarbe. Repetați în funcție de necesitate, până la maximum de patru ori pe zi.

Spălați-vă pe mâini după fiecare aplicare, cu excepția cazului în care mâinile reprezintă zona care este tratată.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

ibuprofen dr.max 50 mg/g

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.

Ibuprofen Dr.Max 50 mg/g gel

ibuprofen

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR

Tub

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Ibuprofen Dr.Max 50 mg/g gel

ibuprofen

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Fiecare gram conține ibuprofen 50 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Excipienți: levomentol, carbomer A, diizopropanolamină 90% (pentru ajustarea pH-ului), alcool izopropilic, glicerol (E 422), apă purificată.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Gel

50 g

100 g

150 g

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare cutanată.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Înainte de prima deschidere: a nu se păstra la frigider sau congela.

După prima deschidere a tubului: a nu se utiliza după 3 luni. A se păstra la temperaturi sub 25°C. A nu se păstra la frigider sau congela.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Dr. Max Pharma s.r.o. (logo)

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16556/2026/01 – tub a 50 g

16556/2026/02 – tub a 100 g

16556/2026/03 – tub a 150 g

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Lot

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Ameliorarea durerilor musculare, cauzate de vânătăi, lovituri sau întinderi, gât înțepenit, entorse și dureri de spate la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani.

Aplicați 4 până la 10 cm de gel pe zona afectată și masați ușor până se absoarbe. Repetați în funcție de necesitate, până la maximum de patru ori pe zi.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL****18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**