

Acetilcisteină Pharmexon 600 mg comprimate

acetilcisteină

INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR

CUTIE

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Acetilcisteină Pharmexon 600 mg comprimate
acetilcisteină

2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE

Un comprimat conține acetilcisteină 600 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILOR

Crospovidonă (E1202), stearat de magneziu (E572), hidroxipropilceluloză (E463), celuloză microcristalină (E460) și dioxid de siliciu (E551)

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL

Comprimat

10 comprimate
20 comprimate
30 comprimate

5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

Administrare orală

6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP.

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

Nu există condiții speciale de păstrare.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Pharmexon Consulting s.r.o.
Pitterova 2855/7
Prague 130 00
Republica Cehă

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

16931/2026/01-cutie cu 10 comprimate
16931/2026/02-cutie cu 20 comprimate
16931/2026/03-cutie cu 30 comprimate

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Acetilcisteină Pharmexon se utilizează pentru tratamentul problemelor respiratorii atunci când se formează prea mult mucus.

Doză: Adulți: Luați un comprimat o dată pe zi.
Luați comprimatul cu un pahar cu apă.

A nu se utiliza mai mult de 5 zile fără a cere sfatul medicului.

A nu se utiliza în caz de:

- hipersensibilitate la acetilcisteină sau la oricare dintre excipienți
- copii cu vârsta sub 2 ani

Nu este adecvat pentru copii cu vârsta între 2 și 18 ani.

A se citi prospectul înainte de utilizare.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Acetilcisteină Pharmexon 600 mg comprimate

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

<Nu este cazul.>

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

<Nu este cazul.>

Acetilcisteină Pharmexon 600 mg comprimate

acetilcisteină

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE BLISTER SAU PE FOLIE TERMOSUDATĂ

BLISTER

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Acetilcisteină Pharmexon 600 mg comprimate
acetilcisteină

2. NUMELE DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

Pharmexon Consulting s.r.o.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP.

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ