ALERITYN 1 mg/ml sirop
Loratadină

INFORMAŢII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR ŞI AMBALAJUL PRIMAR

CUTIE ŞI ETICHETA DE FLACON

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

ALERITYN 1 mg/ml sirop
Loratadină

2. DECLARAREA SUBSTANŢEI(LOR) ACTIVE

1 ml sirop conţine loratadină 1 mg.

3. LISTA EXCIPIENŢILOR

Conține sucroză (zahăr), propilenglicol și benzoat de sodiu (vezi prospectul pentru informații suplimentare).

4. FORMA FARMACEUTICĂ ŞI CONŢINUTUL

Sirop
{Cutie}
Un flacon a 100 ml sirop
{Eticheta de flacon}
100 ml

5. MODUL ŞI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Administrare orală.
A se citi prospectul înainte de utilizare.

6. ATENŢIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ŞI ÎNDEMÂNA COPIILOR

A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENŢIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:
A se utiliza în maximum 28 de zile după prima deschidere a flaconului.

9. CONDIŢII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină.

10. PRECAUŢII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL

11. NUMELE ŞI ADRESA DEŢINĂTORULUI AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

{Cutie}
Biofarm S.A.
Str. Logofătul Tăutu nr. 99, sector 3, Bucureşti, România

{Eticheta de flacon}
{Sigla Biofarm }

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAŢIEI DE PUNERE PE PIAŢĂ

{Cutie}
17026/2026/01

13. SERIA DE FABRICAŢIE

Lot:

14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

{Cutie}
Ameliorează simptomele alergiilor
24 ore
OCHI- Usturime sau mâncărime
NAS- Strănut, secreție nazală abundentă
PIELE- Mâncărime și numărul erupțiilor

AROMĂ DE CAISE

Alerityn aparţine unei clase de medicamente cunoscute sub numele de antihistaminice.

Alerityn ameliorează simptomele asociate rinitelor alergice (de exemplu: febra fânului), cum ar fi strănutul, secreţia nazală abundentă sau mâncărimea nazală, usturimile sau mâncărime oculară.
De asemenea, poate fi utilizat pentru reducerea simptomelor de urticarie (mâncărimile, roşeaţa, precum şi numărul şi dimensiunile elementelor eruptive apărute pe piele).

Doze recomandate:
Adulţi şi copii cu vârsta de peste 10 ani: 10 ml sirop o dată pe zi, cu sau fără alimente.

16. INFORMAŢII ÎN BRAILLE

{Cutie}
{Alerityn 1 mg/ml sirop}

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu este cazul.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu este cazul.