

Prospect: Informații pentru utilizator

**Furazolidonă Arena 25 mg, comprimate
Furazolidonă Forte Arena 100 mg comprimate**

Furazolidonă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este Furazolidonă Arena și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Furazolidonă Arena
3. Cum să utilizați Furazolidonă Arena
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Furazolidonă Arena
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Furazolidonă Arena și pentru ce se utilizează

Furazolidonă Arena este un medicament antidiareic cu acțiune bactericidă (omoară bacteriile). Este utilizat pentru tratamentul infecțiilor intestinale determinate de unele bacterii (enterite, enterocolite infecțioase și toxoinfecții alimentare produse de germeni sensibili la furazolidonă, dizenterie bacilare, lambliază) și al holerei.

Furazolidonă este indicat doar pentru tratamentul adulților.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Furazolidonă Arena

Nu utilizați Furazolidonă Arena:

Nu luați Furazolidonă Arena dacă

- sunteți alergic (hipersensibil) la furazolidonă, la alți nitrofurani sau la oricare dintre celelalte componente ale Furazolidonă Arena ;
- aveți deficit de glucozo-6-fosfatdehidrogenază (o enzimă);
- aveți o afecțiune denumită feocromocitom;
- sunteți gravidă în ultimul trimestru;

- alăptați sugarul cu vârstă mai mică de 1 lună;
- aveți insuficiență renală severă.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați adresat-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale:

- Dacă aveți insuficiență hepatică sau renală;
- Dacă sunteți tratați pentru lambliază, simptomatologia poate persista câteva săptămâni sau chiar luni după tratament, datorită intoleranței la unele categorii de glucide (lactoză); în aceste cazuri, după oprirea tratamentului, trebuie să efectuați 3 examene coproparazitologice la intervale de 3-4 săptămâni, pentru a se putea evalua eficacitatea tratamentului. Dacă infecțiile sunt severe poate fi necesară asocierea unor alte terapii.

Furazolidona vă poate colora urina în galben-brun.

Furazolidonă Arena împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu utilizați Furazolidonă Arena concomitant cu:

- unele medicamente denumite inhibitori de monoaminoxidază (IMAO)
- simpatomimetice cu acțiune directă sau indirectă (cum sunt amfetamine, efedrină, fenilefrină)
- antidepresive triciclice sau neuroleptice
- săruri de bismut sau medicamente cu acțiune antihistaminică.

Furazolidonă Arena împreună cu alimente, băuturi și alcool

În timpul tratamentului și 4 zile după oprirea acestuia, nu trebuie să consumați băuturi alcoolice (pot să apară unele reacții denumite reacții de tip disulfiram care se manifestă prin înroșirea bruscă a feței, dificultăți în respirație, amețeli, senzație de conștiință la nivelul pieptului) și alimente care conțin o substanță numită tiramină (brânzeturile fermentate conțin cantități mari de tiramină) deoarece există risc crescut de hipertensiune arterială și alte manifestări toxice.

Cereți medicului dumneavoastră lista completă cu alimente care conțin tiramină.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Nu sunt disponibile studii controlate cu furazolidonă la gravide. De aceea, în timpul sarcinii nu se recomandă administrarea Furazolidonă Arena. Dacă sunteți gravidă în ultimul trimestru, nu utilizați Furazolidonă Arena din cauza riscului de apariție a anemiei hemolitice la făt.

Nu se cunoaște dacă furazolidona se excretă în laptele matern. De aceea, se recomandă să nu alăptați dacă utilizați Furazolidonă Arena. Nu trebuie să alăptați dacă sugarul are vîrstă sub o lună, deoarece, la sugarii cu vîrstă sub o lună, există risc de anemie hemolitică.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Furazolidonă Arena nu are nici o influență asupra capacitatei de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați Furazolidonă Arena

Utilizați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Furazolidonă Arena 25 mg comprimate este indicat tratamentului copiilor

astfel :

Pentru tratamentul holerei sau al altor infecții enterale: doza recomandată este de 1,25 mg furazolidonă/kg, administrată oral, de 4 ori pe zi, la intervale de 6 ore, timp de 5-7 zile.

În cazul infestării cu *Giardia lamblia* durata tratamentului poate fi prelungită până la 10 zile.

Se recomandă sfârșirea și diluarea cu puțin lichid a comprimatelor în vederea obținerii unei suspensii, comprimatele nefiind adecvate administrarii la copii mai mici de 6 ani.

Furazolidonă Forte Arena 100 mg comprimate este indicat doar pentru tratamentul adulților. Dacă medicul dumneavoastră nu v-a recomandat altfel, dozele uzuale sunt:

- Tratamentul infecțiilor intestinale (enterite, enterocolite infecțioase, toxinfecții alimentare, dizenterie bacilare) sau al holerei : doza recomandată este de un comprimat Furazolidonă Forte Arena 100 mg (100 mg furazolidonă), administrat de 4 ori pe zi, la intervale de 6 ore, timp de 5-7 zile.
- Tratamentul lambliazei: doza recomandată este de un comprimat Furazolidonă Forte Arena 100 mg 100 mg (100 mg furazolidonă), administrat de 4 ori pe zi, la intervale de 6 ore, timp de 7-10 zile.

Dacă utilizați mai mult Furazolidonă Arena decât trebuie

Dacă luați mai mult decât trebuie din Furazolidonă Arena puteți prezenta dureri de cap, greață, vărsături, febră, dureri la nivelul articulațiilor, bătăi rapide ale inimii, hipertensiune arterială, respirație accelerată.

Dacă luați mai mult decât trebuie din Furazolidonă Arena , vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau mergeți la cel mai apropiat spital.

Dacă uitați să utilizați Furazolidonă Arena

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Furazolidona este bine tolerată, iar reacțiile adverse posibile dispar la diminuarea dozei sau la întreruperea tratamentului. Rar pot să apară: dureri de cap, greață, vărsături (la doze mari), reacții alergice cum sunt eruptii trecătoare pe piele, febră, dureri la nivelul articulațiilor. Foarte rar au fost raportate cazuri de anemie hemolitică, leucopenie, agranulocitoză (la pacienții cu deficitul unei enzime denumite glucozo-6-fosfatdehidrogenază).

Furazolidona vă poate colora urina în galben-brun.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro>.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucureşti 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro.

Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Furazolidonă Arena

Nu lăsaţi acest medicament la vederea şi îndemâna copiilor.

Nu utilizaţi acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie după Exp.
Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

Nu aruncaţi niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebaţi farmacistul cum să aruncaţi medicamentele pe care nu le mai folosiţi. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conţine Furazolidonă Arena 25 mg

- Substanţa activă este furazolidonă. Un comprimat conţine 25 mg furazolidonă.
- Celealte componente sunt: celuloză microcristalină. Polividonă K 30, croscarmeloză sodică, talc, stearat de magneziu.

Ce conţine Furazolidonă Forte Arena 100 mg

- Substanţa activă este furazolidonă. Un comprimat conţine 100 mg furazolidonă.
- Celealte componente sunt: celuloză microcristalină. Polividonă K 30, croscarmeloză sodică, talc, stearat de magneziu.

Cum arată Furazolidonă Arena şi conţinutul ambalajului

Furazolidonă Arena 25 mg

Comprimate lenticulare, de culoare galbenă, cu aspect omogen, cu diametrul de 7 mm, cu gust slab amar
Medicamentul este disponibil în cutii cu un blister din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Furazolidonă Forte Arena 100 mg

Comprimate lenticulare, de culoare galbenă, cu aspect omogen, cu diametrul de 7 mm, cu gust slab amar.
Medicamentul este disponibil în cutii cu 2 blistere din PVC/Al a câte 10 comprimate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

ARENA GROUP SA

Str.Stefan Mihaileanu nr 31, cod 024022, sector 2, Bucuresti, România

Fabricantul

ARENA GROUP SA

B-dul Dunarii nr 54, cod 077190, Oras Voluntari, Judetil Ilfov, Romania

Acst prospect a fost revizuit în August 2021.