

**Prospect: Informații pentru pacient****Corneregel 50 mg/g gel oftalmic**  
Dexpantenol

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este Corneregel și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Corneregel
3. Cum să utilizați Corneregel
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Corneregel
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Corneregel și pentru ce se utilizează**

Corneregel este un gel oftalmic, absorbit rapid la nivelul ochiului. Substanța activă este dexpantenolul. Dexpantenolul este transformat rapid în acid pantotenic, care este o vitamină hidrosolubilă, care intervine în numeroase procese metabolice sub formă de coenzima A.

Acidul pantotenic are un efect trofic și stimulează proliferarea fibroblaștilor și regenerarea tegumentelor și mucoaselor lezate.

Corneregel este utilizat pentru:

- tratamentul afecțiunilor corneene neinflamatorii (keratopatii), de exemplu distrofie corneeană (tulburări de nutriție), degenerare corneeană (regresie), eroziuni corneene recidivante (descuamări) și leziuni corneene la purtătorii de lentile de contact;
- ca tratament adjuvant al leziunilor de la nivelul corneei și conjunctivei oculare, arsurilor termice și chimice;
- tratamentul infecțiilor corneene de natură bacteriană, virală sau micotică, ca medicament adjuvant pentru tratamentul specific al acestor afecțiuni corneene.

Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Corneregel****Nu utilizați Corneregel:**

- dacă sunteți alergic la dexpantenol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6).

**Atenționări și precauții**

Înainte să utilizați Corneregel, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Dacă purtați lentile de contact moi în timp ce aplicați o picătură de Corneregel, lentilele pot fi pătate și

pot să apară incompatibilități. Lentilele de contact trebuie îndepărtate și aplicate din nou numai după aproximativ 15 minute de la administrarea Corneregel.

### **Corneregel împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu sunt cunoscute interacțiuni cu alte medicamente. Dacă utilizați Corneregel concomitent cu altă soluție sau unguent oftalmic, acestea trebuie utilizate la intervale de 15 minute. Corneregel trebuie să fie aplicat ultimul.

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Corneregel nu trebuie utilizat de către gravide sau femei care alăptează decât dacă, după evaluarea atentă, medicul dumneavoastră constată că beneficiul utilizării Corneregel depășește riscurile potențiale.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Dacă este utilizat conform instrucțiunilor, acest medicament poate determina încețoșarea trecătoare a vederii și pacienții trebuie să aibă grijă când conduc vehicule și folosesc utilaje.

## **3. Cum să utilizați Corneregel**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată este o picătură gel oftalmic Corneregel aplicată în sacul conjunctival de 4 ori pe zi, precum și înainte de culcare, în funcție de severitatea și intensitatea manifestărilor.

Durata de administrare nu este limitată. Trebuie să utilizați Corneregel până când observați îmbunătățirea manifestărilor dumneavoastră.

Este bine să vă adresați unui medic oftalmolog în timpul utilizării Corneregel, având în vedere că tratamentul cu acest medicament este în mod normal de lungă durată.

Pentru a evita contaminarea vârfului picurător și a gelului oftalmic, când manipulați tubul, vă rugăm să nu atingeți vârful aplicator cu degetele și nu atingeți ochiul cu vârful aplicator. Puneți capacul de protecție după fiecare utilizare.

### **Instrucțiuni de utilizare**

Înclinați capul spre spate.

Trageți în jos pleoapa inferioară cu ajutorul degetului arătător de la o mână și țineți cu cealaltă mână tubul în poziție verticală deasupra ochiului (fără să atingeți ochiul).

Aplicați o picătură gel oftalmic în sacul conjunctival.

Țineți ochiul deschis în timp ce îl rotiți pentru a asigura răspândirea uniformă a gelului oftalmic.

Capacul de protecție permite păstrarea tubului în poziție verticală. Aceasta ușurează administrarea imediată și eficientă a Corneregel.

Dacă vi se pare că efectul medicamentului Corneregel este prea puternic sau prea slab, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Dacă utilizați mai mult Corneregel decât trebuie**

O supradoză din Corneregel nu implică vreun risc cunoscut. Aceasta nu îmbunătățește sau nu diminuează efectul terapeutic.

### **Dacă uitați să utilizați Corneregel**

Aplicați gelul oftalmic imediat ce vă amintiți, apoi reveniți la schema obișnuită de utilizare.

Nu aplicați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

#### **Dacă încetați să utilizați Corneregel**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

#### **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

În cazuri izolate pot să apară reacții alergice.

#### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

#### **5. Cum se păstrează Corneregel**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C.

A se utiliza în maxim 6 săptămâni după prima deschidere a tubului.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și tub după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

#### **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

##### **Ce conține Corneregel**

- Substanța activă este dexpanthenolul. Un gram de gel conține dexpanthenol 50 mg.
- Celelalte componente sunt: cetrimidă, edetat disodic, carbomer, hidroxid de sodiu, apă purificată.

##### **Cum arată Corneregel și conținutul ambalajului**

Corneregel se prezintă sub formă de gel incolor, apos și clar, fără particule vizibile.

Este ambalat în cutii cu un tub conținând 5 g, respectiv 10 g gel oftalmic.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

**Deținătorul autorizației de punere pe piață**

Dr. Gerhard Mann Chem. - pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, Germania

**Fabricantul**

Dr. Gerhard Mann Chem. - pharm. Fabrik GmbH  
Brunsbütteler Damm 165/173, 13581 Berlin, Germania

**Acest prospect a fost revizuit în Mai, 2024.**