

**Prospect: Informații pentru utilizator****STODALINE FĂRĂ ZAHĂR sirop**

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament, deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

Utilizați întotdeauna acest medicament conform indicațiilor din acest prospect sau indicațiilor medicului dumneavoastră sau farmacistului.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Întrebați farmacistul dacă aveți nevoie de mai multe informații sau recomandări.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.
- Dacă după 3 zile nu vă simțiți mai bine sau vă simțiți mai rău, trebuie să vă adresați unui medic.

**Ce găsiți în acest prospect:**

1. Ce este STODALINE FĂRĂ ZAHĂR și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați STODALINE FĂRĂ ZAHĂR
3. Cum să utilizați STODALINE FĂRĂ ZAHĂR
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează STODALINE FĂRĂ ZAHĂR
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. CE ESTE STODALINE FĂRĂ ZAHĂR ȘI PENTRU CE SE UTILIZEAZĂ**

STODALINE FĂRĂ ZAHĂR este un medicament homeopatic utilizat în mod tradițional în tratamentul tusei.

**2. CE TREBUIE SĂ ȘTIȚI ÎNAINTE SĂ UTILIZAȚI STODALINE FĂRĂ ZAHĂR****Nu utilizați STODALINE FĂRĂ ZAHĂR:**

- dacă sunteți alergic la substanțele active sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerare la punctul 6).

**Atenționări și precauții**

Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l întrebați înainte de a utiliza acest medicament.

Deoarece acest medicament conține maltitol lichid și sorbitol, poate avea un ușor efect laxativ.

Datorită prezenței propilenglicolului din cadrul de agenților aromatizanți, cereți sfatul medicului înainte de administrarea la copii.

Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per doză de 5 ml sau 15 ml, adică practic „nu conține sodiu”.

Acest medicament conține 12,3 mg de benzoat de sodiu per fiecare doză de 5 ml și 36,9 mg de benzoat de sodiu per fiecare doză de 15 ml, care este echivalent cu 2,46 mg / mL.

Benzoatul de sodiu poate crește riscul de producere a icterului (îngălbenire a pielii și a albului ochilor) la nou-născuți (cu vârsta până la 4 săptămâni).

Aport caloric: 2,3 kcal/g de maltitol lichid și 2,6 kcal/g de sorbitol, însemnând aproximativ 28,4 kcal pentru o doză de 15 mL și 9,5 kcal pentru o doză de 5 mL.

### **STODALINE FĂRĂ ZAHĂR împreună cu alte medicamente**

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

### **Sarcina, alăptarea și fertilitatea**

Din cauza riscului apariției efectului laxativ și a spasmelor, acest medicament nu este recomandat la gravide.

Acest medicament nu are impact asupra fertilității.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

STODALINE FĂRĂ ZAHĂR nu are nicio influență asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje.

**STODALINE FĂRĂ ZAHĂR conține maltitol lichid, sorbitol, benzoat de soiu și propilenglicol.**

## **3. CUM SĂ UTILIZAȚI STODALINE FĂRĂ ZAHĂR**

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

### **Doze și mod de administrare**

**Adulți:** o doză de 15 mL sirop, folosind măsura dozatoare, de 3 până la 5 ori pe zi.

**Copii:** o doză de 5 mL sirop, folosind măsura dozatoare, de 3 până la 5 ori pe zi.

Administrare orală.

### **Durata tratamentului**

Durata de administrare a tratamentului nu trebuie să depășească o săptămână. Dacă după 3 zile de tratament nu observați nicio îmbunătățire, trebuie să vă adresați unui medic.

### **Dacă utilizați mai mult STODALINE FĂRĂ ZAHĂR decât trebuie**

Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

### **Dacă uitați să utilizați STODALINE FĂRĂ ZAHĂR**

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

### **Dacă încetați să utilizați STODALINE FĂRĂ ZAHĂR**

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

## **4. REACȚII ADVERSE POSIBILE**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. CUM SE PĂSTREAZĂ STODALINE FĂRĂ ZAHĂR**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj, după "EXP:". Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

A nu se utiliza după mai mult de 1 an de la prima deschidere a flaconului.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. CONȚINUTUL AMBALAJULUI ȘI ALTE INFORMAȚII**

### **Ce conține STODALINE FĂRĂ ZAHĂR**

#### **Substanțele active sunt:**

Antimonium tartaricum 6 CH .....	2 g
Bryonia 3 CH .....	2 g
Coccus cacti 4 CH.....	2 g
Drosera 3 CH .....	2 g
Ipeca 3 CH .....	2 g
Rumex crispus 6 CH .....	2 g
Spongia tosta 4 CH .....	2 g
Sticta pulmonaria 3 CH.....	2 g

Pentru 100 g sirop.

**Celelalte componente sunt:**

Maltitol lichid, sorbitol (E420), benzoat de sodiu (E211), acid citric monohidrat (E330), aromă de mure\*, aromă de vanilie\*, apă purificată.

\*conține propilenglicol

Fără zahăr.

**Cum arată STODALINE FĂRĂ ZAHĂR și conținutul ambalajului**

Sirop incolor cu aromă de fructe de pădure și vanilie.

Cutie cu un flacon din sticlă brună prevăzut cu dop din PEID transparentă, închis cu capac cu filet și inel de siguranță din PEID de culoare albă și o măsură dozatoare din PP, cu gradații pentru măsurarea volumelor de 5 ml și 15 ml cu 200 ml sirop.

Cutie cu un flacon din sticlă brună prevăzut cu dispozitiv antipicurare din PEJD transparentă, închis cu capac cu filet și inel de siguranță din PEID de culoare albă și o măsură dozatoare din PP, cu gradații pentru măsurarea volumelor de 5 ml și 15 ml cu 200 ml sirop.

**Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

BOIRON

2 avenue de l'Ouest Lyonnais

69510 Messimy

Franța

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață.

**Acest prospect a fost revizuit în aprilie 2020.**