

Prospect: Informații pentru utilizator**Tadilecto 10 mg comprimate filmate**
tadalafil

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitați.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane.
Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală cu ale dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Tadilecto și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tadilecto
3. Cum să luați Tadilecto
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Tadilecto
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Tadilecto și pentru ce se utilizează

Tadilecto este folosit pentru:

- tratamentul **disfuncției erectile** la bărbații adulți. Aceasta este situația în care un bărbat nu poate să aibă sau să-și mențină penisul întărit, în erecție, aşa cum este necesar pentru activitatea sexuală. Tadalafilul a dovedit că îmbunătățește semnificativ capacitatea bărbaților de a obține erecția penisului pentru activitatea sexuală.

Tadilecto conține substanță activă tadalafil, care face parte din grupul de medicamente numite inhibitori de fosfodiesterază tip 5. În urma stimulării sexuale, Tadilecto acționează ajutând vasele de sânge din penis să se relaxeze și să permită pătrunderea unei cantități mai mari de sânge în penis. Rezultatul este îmbunătățirea funcției erectile. Tadilecto nu vă va fi de ajutor dacă nu aveți disfuncție erectilă.

Este important să rețineți că Tadilecto nu acționează dacă nu există stimulare sexuală. Trebuie să vă angajați în preludiu ca și cum nu ați lua nici un medicament pentru disfuncția erectoră.

2. Ce trebuie să știți înainte să luați Tadilecto**Nu luați Tadilecto:**

- dacă sunteți alergic la tadalafil sau la oricare dintre celealte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6).
- dacă luați orice formă de nitrat organic sau de donori de oxid nitric, cum este nitritul de amil. Acesta este un grup de medicamente („nitrați”) folosite în tratamentul anginei pectorale („dureri

în piept"). S-a demonstrat că tadalafilul crește efectele acestor medicamente. Dacă luați orice formă de nitrați sau nu sunteți sigur de aceasta, adresați-vă medicului dumneavoastră.

- dacă aveți o boală gravă de inimă sau ați avut recent un infarct miocardic în ultimele 90 zile.
- dacă ați avut recent accident vascular cerebral în ultimele 6 luni.
- dacă aveți tensiune arterială scăzută sau tensiune arterială crescută și necontrolată cu medicamente.
- dacă ați avut vreodată pierderea vederii la un ochi din cauza neuropatiei optice anterioare ischemice non-arteritice (NOAIN), afecțiune descrisă ca „accidentul vascular al ochiului”.
- dacă luați riociguat. Acest medicament este utilizat pentru tratarea hipertensiunii arteriale pulmonare (tensiune mare a săngelui la nivelul plămânilor) și a hipertensiunii pulmonare tromboembolice cronice (tensiune mare a săngelui la nivelul plămânilor secundar cheagurilor de sânge). Inhibitorii de PDE5, cum este Tadilecto, s-au dovedit a mări efectul de scădere a tensiunii arteriale al acestui medicament. Dacă luați riociguat sau dacă nu sunteți sigur de acest lucru, spuneți medicului dumneavoastră.

Atenționări și precauții.

Discutați cu medicul dumneavoastră înainte să luați Tadilecto.

Trebuie să știți că activitatea sexuală implică un posibil risc pentru pacienții cu boli de inimă, deoarece vă supune inima la un efort suplimentar. Dacă aveți o problemă cu inima, adresați-vă medicului dumneavoastră.

Înainte de a lua acest medicament, spuneți-i medicului dumneavoastră dacă aveți:

- siclemie (o afecțiune a globulelor roșii din sânge)
- mielom multiplu (cancer al măduvei osoase)
- leucemie (cancer al celulelor săngelui)
- orice deformare a penisului
- o problemă gravă la ficat
- o problemă gravă la rinichi.

Nu se cunoaște dacă Tadilecto este eficace la pacienții cărora le-au fost efectuate:

- intervenții chirurgicale pelvine.
- îndepărțarea întregii sau unei părți a prostatei, în care nervii prostatei sunt tăiați (prostatectomie radicală fără protecția inervației).

Dacă aveți brusc o scădere sau pierdere a vederii, sau vederea dumneavoastră este distorsionată, estompată în timp ce luați Tadilecto, opriți administrarea Tadilecto și luați imediat legătura cu medicul dumneavoastră.

Reducerea sau pierderea subită a auzului a fost observată la unii pacienți care luau tadalafil. Deși nu se știe dacă acest eveniment este legat direct de tadalafil, dacă observați reducerea sau pierderea subită a auzului, întrerupeți tratamentul cu Tadilecto și luați legătura imediat cu medicul dumneavoastră.

Tadilecto nu este destinat utilizării de către femei.

Copii și adolescenți

Tadilecto nu este indicat pentru utilizare de către copii și adolescenți cu vârstă sub 18 ani.

Tadilecto împreună cu alte medicamente

Vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră dacă luați sau ați luat recent orice alte medicamente. Nu luați Tadilecto dacă luați deja tratament cu nitrati.

Unele medicamente pot fi influențate de Tadilecto sau pot influența modul în care acționează Tadilecto.

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă deja luați:

- un blocant alfa-adrenergic (utilizat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale sau simptomelor urinare asociate cu hiperplazia benignă de prostată).

- alte medicamente pentru tratamentul hipertensiunii arteriale.
- riociguat (pentru tratamentul unor forme de hipertensiune pulmonară).
- un inhibitor de 5-alfa reductază (utilizat pentru tratamentul hiperplaziei benigne de prostată).
- medicamente cum sunt ketoconazolul comprimate (pentru tratamentul infecțiilor fungice) și inhibitori ai proteazei pentru tratamentul SIDA sau infecției cu HIV.
- fenobarbital, fenitoïnă sau carbamazepină (medicamente anticonvulsivante).
- rifampicină, eritromycină, claritromycină sau itraconazol.
- alte tratamente pentru disfuncție erectilă.

Tadilecto împreună cu alimente, băuturi sau alcool

Informațiile privind efectul consumului de alcool etilic sunt prezentate la pct. 3.

Sucul de grepfrut poate influența efectul Tadilecto și trebuie consumat cu precauție.

Discutați cu medicul dumneavoastră pentru informații suplimentare.

Fertilitatea

În tratamentul câinilor s-a observat o scădere a dezvoltării spermei la nivelul testiculelor. O reducere a spermei a fost observată și la unii bărbați. Aceste efecte sunt puțin probabil să ducă la o scădere a fertilității.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Unii bărbați care au luat tadalafil au raportat amețeli. Verificați cu atenție cum reacționați la tratament înainte de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Tadilecto conține lactoză și sodiu

Dacă medicul dumneavoastră v-a spus că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, adresați-vă medicului dumneavoastră înainte de a lua acest medicament.

Acest medicament conține mai puțin de 1 mmol de sodiu (23 mg) per comprimat, adică practic "nu conține sodiu".

3. Cum să luați Tadilecto

Luați întotdeauna acest medicament exact aşa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Tadilecto comprimate este indicat numai pentru utilizare la bărbați, pe cale orală. Înghițiți comprimatul întreg cu puțină apă. Comprimatele pot fi luate cu sau fără alimente.

Doza inițială recomandată este de 10 mg administrată înaintea activității sexuale. Dacă efectul dozei de 10 mg este prea slabă, este posibil ca medicul dumneavoastră să crească doza la 20 mg.

Puteți lua Tadilecto cu cel puțin 30 de minute înainte de activitatea sexuală.

Tadilecto poate fi încă eficient până la 36 de ore după ce ați luat comprimatul.

Nu luați Tadilecto mai mult de o dată pe zi.

Tadilecto 10 mg și 20 mg sunt destinate utilizării înaintea activității sexuale anticipate și **nu sunt recomandate pentru utilizare zilnică continuă**.

Este important să rețineți că Tadilecto nu acționează dacă nu există stimulare sexuală. Trebuie să vă angajați în preludiu, ca și când nu ați lua un medicament pentru disfuncție erectilă.

Consumul de alcool etilic vă poate afecta capacitatea de a obține o erecție și vă poate scădea temporar tensiunea arterială. Dacă ați luat sau planificăți să luați Tadilecto, evitați consumul excesiv de alcool etilic (alcoolemie de 0,08% sau mai mare), deoarece acesta poate crește riscul de apariție a amețelilor când vă ridicați în picioare.

Dacă luați mai mult Tadilecto decât trebuie

Adresați-vă medicului dumneavoastră. Este posibil să apară reacțiile adverse descrise la punctul 4.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. În mod normal, aceste reacții adverse sunt de natură ușoară până la moderată.

Dacă manifestați oricare dintre următoarele reacții adverse, încetați să mai luați medicamentul și mergeți imediat la medic:

- reacții alergice inclusiv erupții trecătoare pe piele (frecvență - mai puțin frecvente)
- durere în piept – nu luați nitrați și mergeți imediat la medic (frecvență - mai puțin frecventă)
- erecție prelungită și posibil dureroasă după utilizarea Tadilecto (frecvență - rară). Dacă aveți o astfel de erecție care durează fără întrerupere timp de mai mult de 4 ore, trebuie să mergeți imediat la medic.
- pierderea bruscă a vederii (frecvență - rară), vedere distorsionată, estompată, vedere centrală încețoșată sau diminuare bruscă a vederii (cu frecvență necunoscută).

Au fost raportate și alte reacții adverse:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)

- dureri de cap, dureri de spate, dureri musculare, dureri ale brațelor și picioarelor, înroșirea feței, congestie nazală și indigestie.

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)

- amețeli, durere de stomac, reflux gastro-esofagian, greață, vârsături, vedere încețoșată, dureri la nivelul ochilor, dificultate la respirație, prezența săngelui în urină, erecție prelungită, palpitații, bătăi rapide ale inimii, tensiune arterială mare, tensiune arterială mică, săngerări din nas, țuit în urechi, umflare a mâinilor, picioarelor sau a gleznelor (edeme periferice) și oboseală (fatigabilitate).

Rare (pot afecta până la 1 din 1 000 persoane)

- leșin, convulsii și pierderi trecătoare ale memoriei, umflare a pleoapelor, ochi roșii, scădere bruscă sau pierdere a auzului, urticarie (umflături de culoare roșie pe suprafața pielii, însotite de mâncărimi), transpirații în exces, săngerare la nivelul penisului și prezența săngelui în spermă.

Rareori, la bărbații care iau tadafil, s-au raportat infarct miocardic și accident vascular cerebral. Cei mai mulți dintre aceștia, au avut probleme cardiace cunoscute înainte de a lua acest medicament.

S-a raportat rar scăderea sau pierderea parțială, temporară sau permanentă a vederii la un ochi sau la ambii ochi.

La bărbații care iau tadafil **au fost raportate și alte reacții adverse rare** (pot afecta până la 1 din 1 000 persoane), care nu au fost observate în studiile clinice. Acestea includ:

- migrenă, umflare a feței, reacție alergică gravă care determină umflare a gâtului sau a feței, erupții grave pe piele, unele afecțiuni care modifică circulația săngelui la nivelul ochilor, bătăi neregulate ale inimii, angină pectorală și deces de origine cardiacă,
- vedere distorsionată, estompată, vedere centrală încețoșată sau diminuare bruscă a vederii (frecvență necunoscută).

Ametelile au fost raportate mai frecvent la bărbații de peste 75 de ani care iau tadafil. Diareea a fost

raportată mai frecvent la bărbații în vîrstă de peste 65 de ani care iau tadalafil.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478-RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Tadilecto

A nu se lăsa acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe ambalaj după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Tadilecto

- Substanța activă este tadalafil. Fiecare comprimat conține tadalafil 10 mg.
- Celealte componente sunt: hipromeloză ftalat, manitol, croscarmeloză sodică, laurilsulfat de sodiu, stearat de magneziu (E470b), lactoză monohidrat, hipromeloză, talc (E553b), dioxid de titan (E171), oxid galben de fier (E172) și triacetină (E1518). Vezi pct. 2, *Tadilecto conține lactoză și sodiu*.

Cum arată Tadilecto și conținutul ambalajului

Comprimate de culoare galbenă, ovale, biconvexe, inscripționate cu "10" pe una din fețe.

Dimensiuni: lungime = aproximativ 12 mm; lățime = 7,5 mm.

Tadilecto este disponibil în cutii cu blistere cu 2, 4, 8, 12, 14, 28, 56 și 84 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărurile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Numele statului membru	Denumirea comercială a produsului
Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Republica Cehă, Republica Slovacă, România, Slovenia, Ungaria	Tadilecto

Acest prospect a fost revizuit în mai 2025.