

Prospect: Informații pentru pacient

Everio Airmaster 50 micrograme/100 micrograme pulbere de inhalat unidoză
Everio Airmaster 50 micrograme/250 micrograme pulbere de inhalat unidoză
salmeterol/propionat de fluticazonă

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Everio Airmaster și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Everio Airmaster
3. Cum să utilizați Everio Airmaster
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Everio Airmaster
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Everio Airmaster și pentru ce se utilizează

Everio Airmaster conține două medicamente: salmeterol și propionat de fluticazonă.

- Salmeterolul este un bronhodilatator cu durată lungă de acțiune. Bronhodilatatoarele ajută la menținerea deschisă a căilor respiratorii din plămâni. Acest lucru ușurează pătrunderea și ieșirea aerului din plămâni. Efectul durează cel puțin 12 ore.
- Propionatul de fluticazonă este un corticosteroid care scade inflamația și iritația de la nivelul plămânilor.

Everio Airmaster este utilizat pentru tratamentul adulților și adolescenților cu vârsta de 12 ani și peste.

Medicul dumneavoastră v-a prescris acest medicament pentru a vă ajuta în prevenirea problemelor respiratorii, cum sunt:

- Astmul bronșic.

Trebuie să utilizați Everio Airmaster în fiecare zi, așa cum v-a recomandat medicul dumneavoastră. Astfel veți fi sigur că funcționează corespunzător în ceea ce privește controlul asupra bolii dumneavoastră (astm bronșic).

Everio Airmaster ajută la prevenirea apariției senzației de lipsă de aer sau a respirației șuierătoare. Cu toate acestea, Everio Airmaster nu trebuie utilizat pentru a trata o criză de senzație de lipsă de aer

sau respirație șuierătoare. În cazul în care aveți o criză subită de senzație de lipsă de aer sau respirație șuierătoare, trebuie să folosiți un medicament inhalator cu acțiune rapidă („de urgență”), cum este salbutamolul. Trebuie să aveți întotdeauna la dumneavoastră un medicament inhalator „de urgență” cu acțiune rapidă.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Everio Airmaster

Nu utilizați Everio Airmaster

Dacă sunteți alergic la salmeterol, propionat de fluticazonă sau la celălalt component, lactoză monohidrat.

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Everio Airmaster, spuneți medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă aveți:

- Boli de inimă, incluzând bătăi neregulate sau rapide ale inimii;
- Glandă tiroidă cu activitate crescută;
- Tensiune arterială crescută;
- Diabet zaharat (Everio Airmaster poate să vă crească cantitatea de zahăr din sânge);
- Valoare scăzută a potasiului sanguin;
- Tuberculoză pulmonară (TBC) în prezent sau ați avut-o în trecut sau aveți alte infecții la nivelul plămânilor.

Adresați-vă medicului dumneavoastră dacă aveți vedere încețoșată sau alte tulburări de vedere.

Copii

Acest medicament nu trebuie utilizat la copii cu vârsta sub 12 ani.

Everio Airmaster împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente. Aceasta, din cauză că utilizarea Everio Airmaster împreună cu anumite alte medicamente poate să nu fie adecvată.

Spuneți medicului dumneavoastră dacă utilizați unul dintre următoarele medicamente, înainte de a începe să utilizați Everio Airmaster:

- Beta-blocante (cum sunt atenololul, propranololul și sotalolul). Beta-blocantele sunt cel mai frecvent utilizate pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute sau al afecțiunilor inimii cum este angina.
- Medicamente utilizate pentru a trata infecțiile (cum sunt ketoconazol, itraconazol și eritromicină) inclusiv unele medicamente pentru tratamentul HIV (cum sunt medicamente care conțin ritonavir, cobicistat). Unele dintre aceste medicamente pot să crească cantitatea de propionat de fluticazonă sau salmeterol din corpul dumneavoastră. Astfel poate să crească riscul de apariție a reacțiilor adverse cu Everio Airmaster, incluzând bătăi neregulate ale inimii, sau se pot înrăutăți reacțiile adverse. Medicul dumneavoastră poate dori să vă monitorizeze cu atenție dacă luați aceste medicamente.
- Corticosteroizi (pe cale orală sau injectabilă). Dacă ați fost tratat recent cu aceste medicamente, există un risc crescut ca Everio Airmaster să vă afecteze glandele suprarenale.
- Diuretice, utilizate pentru tratamentul tensiunii arteriale crescute.
- Alte bronhodilatatoare (cum este salbutamol).
- Derivați xantinici, cum sunt aminofilina și teofilina. Aceștia sunt frecvent folosiți în tratamentul astmului bronșic.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Este puțin probabil ca Everio Airmaster să vă afecteze capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Everio Airmaster conține lactoză

Everio Airmaster conține lactoză monohidrat aproximativ 13 miligrame în fiecare doză. În mod normal cantitatea de lactoză din acest medicament nu cauzează probleme persoanelor cu intoleranță la lactoză. Excipientul lactoză conține cantități mici de proteine din lapte, care pot determina reacții alergice.

3. Cum să utilizați Everio Airmaster

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

- Utilizați Everio Airmaster în fiecare zi, până când medicul dumneavoastră vă sfătuiește să opriți tratamentul. Nu depășiți doza recomandată. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.
- Nu opriți administrarea Everio Airmaster și nu reduceți doza de Everio Airmaster fără să discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră.
- Everio Airmaster trebuie inhalat în plămâni prin cavitatea bucală.

Doza recomandată este de:

Adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste

- Everio Airmaster 50/100 – o inhalare de două ori pe zi
- Everio Airmaster 50/250 – o inhalare de două ori pe zi

Dacă se obține controlul asupra simptomelor dumneavoastră în schema de utilizare a Everio Airmaster de două ori pe zi, medicul dumneavoastră s-ar putea să decidă scăderea dozei la o singură administrare zilnică. Doza poate fi modificată la:

- o dată seara, în cazul în care aveți simptome **nocturne**;
- o dată dimineața, în cazul în care aveți simptome **în timpul zilei**.

Este foarte important să urmați instrucțiunile medicului dumneavoastră referitor la numărul de inhalări de administrat sau cât de des să utilizați medicamentul.

Dacă utilizați Everio Airmaster pentru tratamentul astmului bronșic, medicul dumneavoastră va dori să vă monitorizeze periodic simptomele.

Dacă astmul bronșic sau respirația dumneavoastră se agravează, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră. Este posibil să simțiți că respirați mai zgomotos, să aveți mai des senzație de constricție în piept sau să aveți nevoie să utilizați mai des medicamente de „urgență” cu acțiune rapidă. În aceste cazuri trebuie să continuați utilizarea Everio Airmaster, dar nu trebuie să creșteți numărul de inhalări administrate. Afecțiunea respiratorie se poate agrava și vă puteți îmbolnăvi grav. Adresați-vă medicului dumneavoastră, întrucât ați putea avea nevoie de tratament suplimentar.

Instrucțiuni de utilizare

- Everio Airmaster poate fi diferit față de inhalatoarele pe care le-ați utilizat în trecut, prin urmare, este foarte important să îl utilizați corect. Medicul dumneavoastră, asistenta medicală sau farmacistul trebuie să vă arate cum să utilizați inhalatorul. Această instruire este importantă pentru a asigura faptul că se administrează doza de care aveți nevoie. Dacă nu ați primit această instruire, vă rugăm să cereți medicului dumneavoastră, asistentei medicale sau farmacistului să vă arate cum să utilizați inhalatorul în mod corect, în special înainte să îl utilizați prima dată.

Ei trebuie de asemenea să verifice periodic cum utilizați dispozitivul, pentru a se asigura că îl utilizați corect, conform recomandărilor. Neutilizarea corespunzătoare sau conform recomandărilor a Everio Airmaster poate să ducă la un control inefficient al bolii dumneavoastră (astm bronșic).

- Dispozitivul are blistere care conțin salmeterol/propionat de fluticazonă sub formă de pulbere.
- Există un indicator pe partea de sus a dispozitivului care vă spune câte doze au mai rămas. El numără dozele înapoi până la 0. Numerele de la 5 la 0 vor apărea în roșu, pentru a vă avertiza că mai sunt disponibile doar câteva doze. În momentul în care indicatorul arată 0, inhalatorul dumneavoastră este gol.

Utilizarea inhalatorului

1. Pentru a deschide inhalatorul, țineți inhalatorul într-o mână, în poziție orizontală, la nivel. Apăsăți butonul roșu cu degetul mare (vezi Figura 1) și rotiți capacul de culoare roz deschis (pentru concentrația 50/100 micrograme) sau roz (pentru concentrația 50/250 micrograme) al piesei bucale în direcție opusă dumneavoastră, cu degetul mare al celeilalte mâini, pe atât cât este posibil, până când auziți un „clic” (vezi Figura 2). Acest lucru va deschide un mic orificiu în piesa bucală și plasează o doză din medicamentul dumneavoastră în piesa bucală.




Figura 1




Figura 2

Rețineți că, de fiecare dată când capacul piesei bucale este deschis cu un „clic”, un blister se deschide în interior și pulberea se pregătește pentru inhalare. Prin urmare, nu deschideți capacul piesei bucale dacă nu este necesar să luați medicamentul, întrucât acest lucru deschide blisterele și se pierde medicament.

2. Țineți inhalatorul departe de gură. Expirați cât de mult puteți. Nu expirați niciodată în inhalator.
3. Puneți piesa bucală între buze (vezi Figura 3). Inspirați constant și adânc prin inhalator, **nu prin nas**. Scoateți inhalatorul din gură. Țineți-vă respirația timp de aproximativ 10 secunde sau atât timp cât puteți. Expirați încet.



Figura 3

Inhalatorul vă administrează doza de medicament sub forma unei pulberi foarte fine. Este posibil să simțiți gustul sau atingerea pulberii, sau nu. **Nu utilizați o doză suplimentară din inhalator dacă nu simțiți atingerea sau gustul medicamentului.**

4. Închideți inhalatorul pentru a-l menține curat, rotind capacul roz deschis (pentru concentrația 50/100 micrograme) sau roz (pentru concentrația 50/250 micrograme) al piesei bucale înapoi, către dumneavoastră, cât de mult se poate. Veți auzi un „clic” (vezi Figura 4). Capacul piesei bucale a revenit acum la poziția originală și s-a resetat. Inhalatorul este pregătit acum pentru a vă lua următoarea doză programată.
5. După aceea, clătiți-vă gura cu apă și scuipați și/sau periați-vă dinții. Aceste manevre ar putea ajuta la prevenirea apariției candidozei și răgușelii.




Figura 4

Curățarea inhalatorului

Mențineți-vă inhalatorul uscat și curat.

Dacă este necesar, puteți să ștergeți piesa bucală a inhalatorului cu o lavetă uscată sau un șervețel uscat.

Dacă utilizați mai mult Everio Airmaster decât trebuie

Este important să utilizați inhalatorul conform instrucțiunilor. Dacă ați luat accidental mai multe doze decât numărul recomandat, spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului. Puteți observa că inima dumneavoastră bate mai repede decât în mod normal și puteți simți tremurături. Puteți, de asemenea, avea amețeli, dureri de cap, slăbiciune musculară și dureri articulare.

Dacă ați utilizat timp îndelungat doze mai mari de Everio Airmaster, trebuie să vă adresați medicului dumneavoastră sau farmacistului pentru recomandări. Aceasta întrucât utilizarea unor doze mai mari de Everio Airmaster poate determina o scădere a secreției de hormoni steroidieni de către glandele dumneavoastră suprarenale.

Dacă uitați să utilizați Everio Airmaster

Nu luați o doză dublă pentru a compensa doza uitată. Trebuie doar să luați doza următoare la ora obișnuită.

Dacă încetați să utilizați Everio Airmaster

Este important să utilizați Everio Airmaster în fiecare zi, conform instrucțiunilor. **Continuați să îl luați până când medicul dumneavoastră vă sfătuiește să opriți tratamentul. Nu opriți utilizarea sau nu reduceți brusc doza de Everio Airmaster.** Acest lucru vă poate agrava simptomele respiratorii.

În plus, dacă opriți brusc administrarea Everio Airmaster sau reduceți doza de Everio Airmaster, puteți avea (în cazuri foarte rare) probleme cu glandele suprarenale (insuficiență suprarenală), care uneori cauzează reacții adverse.

Aceste reacții adverse pot include oricare dintre următoarele:

- Dureri de stomac;
- Oboseală și lipsa poftei de mâncare, senzație de rău;
- Slăbiciune și diaree;
- Scădere în greutate;
- Dureri de cap sau somnolență;
- Valori scăzute de zahăr în sânge;
- Tensiune arterială scăzută și convulsii.

Atunci când corpul dumneavoastră este supus unor condiții de stres, cum sunt febră, traumatism (ca de exemplu un accident sau o vătămare), infecție sau intervenție chirurgicală, insuficiența suprarenală se poate înrăutăți și puteți avea oricare din reacțiile adverse enumerate mai sus.

Dacă aveți orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Pentru prevenirea acestor simptome, medicul dumneavoastră vă poate prescrie tratament suplimentar cu corticosteroizi sub formă de comprimate (cum este prednisolonul).

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Pentru a preveni apariția reacțiilor adverse, medicul dumneavoastră trebuie să se asigure că utilizați cea mai mică doză a acestei asocieri de medicamente care are efect terapeutic pentru dumneavoastră în astmul bronșic.

Reacții alergice: puteți simți că respirația dumneavoastră se înrăutățește brusc imediat după utilizarea Everio Airmaster. Puteți avea respirație foarte zgomotoasă și să apară tuse sau puteți avea senzație de lipsă de aer. Puteți, de asemenea, prezenta mâncărime, erupție pe piele (urticarie) și umflare (de obicei la nivelul feței, buzelor, limbii sau gâtului) sau puteți simți brusc că inima dumneavoastră bate foarte repede sau aveți senzație de leșin și „cap ușor” (aceasta poate duce la leșin sau pierderea conștienței). **Dacă prezentați oricare dintre aceste reacții sau dacă acestea apar brusc după ce folosiți Everio Airmaster, nu mai utilizați Everio Airmaster și anunțați imediat medicul dumneavoastră.** Reacțiile adverse alergice la Everio Airmaster sunt mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane).

Foarte frecvente (pot afecta mai mult de 1 din 10 persoane)

- Dureri de cap – această reacție adversă se reduce dacă tratamentul este continuat;

Frecvente (pot afecta mai puțin de 1 din 10 persoane)

- Candidoză (papule galben-crem, dureroase) la nivelul gurii și gâtului. De asemenea, dureri la nivelul limbii, răgușeală și iritația gâtului. Clătirea gurii cu apă și scuiparea imediată a conținutului și/sau periajul dinților după administrarea fiecărei doze de medicament pot fi utile. Medicul dumneavoastră s-ar putea să vă prescrie un medicament antifungic pentru tratamentul candidozei;
- Articulații dureroase, umflate și dureri musculare;
- Crampe musculare.

Mai puțin frecvente (pot afecta mai puțin de 1 din 100 persoane)

- Creșterea cantității de zahăr (glucoză) din sânge (hiperglicemie). Dacă aveți diabet zaharat, s-ar putea să fie necesar să vă verificați mai des glicemia și să fie necesară ajustarea tratamentului antidiabetic;
- Cataractă (opacifierea cristalinului);
- Bătăi foarte rapide ale inimii (tahicardie);
- Senzație de tremurături (tremor) și bătăi rapide sau neregulate ale inimii (palpitații). Aceste reacții adverse sunt în general ușoare și se reduc în timp ce tratamentul este continuat;
- Durere în piept;
- Senzație de îngrijorare (această reacție adversă apare în principal la copii);
- Tulburări de somn;
- Erupții alergice trecătoare pe piele.

Rare (pot afecta mai puțin de 1 din 1000 persoane)

- **Dificultate în respirație sau respirație șuierătoare care se agravează imediat după ce utilizați Everio Airmaster.** Dacă se întâmplă acest lucru, **opriți utilizarea inhalatorului Everio Airmaster.** Utilizați medicamentul inhalator „de urgență” cu acțiune rapidă pentru a vă ajuta să respirați și **adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.**
- Everio Airmaster poate afecta secreția normală de hormoni steroidieni produși de către corpul dumneavoastră, în special dacă ați luat doze mari, timp îndelungat. Aceste reacții adverse includ:
 - încetinirea creșterii la copii și adolescenți
 - subțierea oaselor
 - glaucom
 - creștere în greutate
 - față rotunjită (în formă de lună plină) (sindrom Cushing).Medicul dumneavoastră vă va monitoriza periodic pentru apariția oricăreia dintre aceste reacții adverse și pentru a se asigura că utilizați doza cea mai mică din această asociere de medicamente care vă controlează simptomele de astm bronșic.
- Schimbări ale comportamentului, cum sunt hiperactivitatea și iritabilitatea (deși aceste reacții adverse apar în principal la copii).
- Bătăi neuniforme sau neregulate ale inimii sau o bătaie suplimentară a inimii (aritmii). Informați-l pe medicul dumneavoastră, dar nu opriți utilizarea Everio Airmaster decât dacă medicul dumneavoastră vă recomandă acest lucru.
- O infecție fungică la nivelul esofagului, care poate determina dificultate la înghițire.

Cu frecvență necunoscută, dar care pot apărea de asemenea:

- Depresie sau agresivitate (deși aceste reacții au o probabilitate mai mare de apariție la copii);
- Vedere încețoșată.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Everio Airmaster

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe eticheta inhalatorului după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A nu se păstra la temperaturi peste 30°C.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Everio Airmaster

Substanțele active sunt salmeterol și propionat de fluticazonă.

Everio Airmaster 50 micrograme/100 micrograme

Fiecare inhalare (doza care este eliberată prin piesa bucală) administrează o doză de salmeterol 47 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 92 micrograme. Aceasta corespunde unei doze premăsurate de salmeterol 50 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 100 micrograme.

Everio Airmaster 50 micrograme/250 micrograme

Fiecare inhalare (doza care este eliberată prin piesa bucală) administrează o doză de salmeterol 45 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 229 micrograme. Aceasta corespunde unei doze premăsurate de salmeterol 50 micrograme (sub formă de xinafoat de salmeterol) și propionat de fluticazonă 250 micrograme.

Celălalt component este lactoză monohidrat (vezi pct. 2, la rubrica „Everio Airmaster conține lactoză”) (care conține proteine din lapte).

Cum arată Everio Airmaster și conținutul ambalajului

- Everio Airmaster conține o folie termosudată cu blistere umplute cu pulbere de culoare albă până la albicioasă. Folia protejează pulberea de inhalat de efectul atmosferei.
- Fiecare doză este pregătită pentru eliberare.
- Dispozitivele de inhalat din plastic de culoare albă, cu capac de culoare roz deschis (pentru concentrația 50/100 micrograme) sau roz (pentru concentrația 50/250 micrograme) sunt ambalate în cutii care conțin:
1, 2, 3 sau 10 inhalatoare fiecare conținând 60 inhalări.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

Zentiva, k.s.

U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10
Republica Cehă

Fabricantul

Oy Medfiles Ltd.
Volltikatu 5, Volltikatu 8, Kuopio, 70700
Finlanda

Acest medicament este autorizat în statele membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Suedia	Neuair Airmaster
Austria	Everio Airmaster
Belgia	Brecur Airmaster 50 microgram/100 microgram/ dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld Brecur Airmaster 50 microgram/250 microgram/ dosis, inhalatiepoeder, voorverdeeld Brecur Airmaster 50 microgrammes/100 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose Brecur Airmaster 50 microgrammes/250 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose Brecur Airmaster 50 Mikrogramm/100 mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation Brecur Airmaster 50 Mikrogramm/250 Mikrogramm einzeldosiertes Pulver zur Inhalation
Bulgaria	Еверио Еърмастър 50 микрограма/100 микрограма/доза прах за инхалация, предварително дозиран Еверио Еърмастър 50 микрограма/250 микрограма/доза прах за инхалация, предварително дозиран
Republica Cehă	Everio Airmaster
Estonia	Everio Airmaster
Franța	PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL ZENTIVA 100 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose PROPIONATE DE FLUTICASONE/SALMETEROL ZENTIVA 250 microgrammes/50 microgrammes/dose, poudre pour inhalation en récipient unidose
Ungaria	Fluzalto Airmaster 50 mikrogramm/100 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por Fluzalto Airmaster 50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por
Irlanda	Bronx Airmaster
Letonia	Everio Airmaster 50/100 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts Everio Airmaster 50/250 mikrogrami/devā inhalācijas pulveris, dozēts
Lituania	Everio Airmaster 50/100 mikrogramų/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai Everio Airmaster 50/250 mikrogramų/dozėje dozuoti įkvepiamieji milteliai.
Polonia	Neuair Airmaster
România	Everio Airmaster 50 micrograme /100 micrograme pulbere de inhalat unidoză

	Everio Airmaster 50 micrograme /250 micrograme pulbere de inhalat unidoză
Republica	Everio Airmaster 50 mikrogramov/100 mikrogramov
Slovacă	Everio Airmaster 50 mikrogramov/250 mikrogramov
Spania	Amaira 50 microgramos/100 microgramos/ inhalación, polvo para inhalación (unidosis)
	Amaira 50 microgramos/250 microgramos/ inhalación, polvo para inhalación (unidosis)

Pentru orice informații despre acest medicament, vă rugăm să contactați reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață:

ZENTIVA S.A.

Tel: +4 021.304.72.00

e-mail: zentivaRO@zentiva.com

Acest prospect a fost revizuit în martie 2025.