

Prospect: Informații pentru utilizator**ASAprin Cardio 75 mg comprimate gastrorezistente**
Acid acetilsalicilic

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4

Ce găsiți în acest prospect:

1. Ce este ASAprin Cardio 75 mg și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați ASAprin Cardio 75 mg
3. Cum să utilizați ASAprin Cardio 75 mg
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează ASAprin Cardio 75 mg
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este ASAprin Cardio 75 mg și pentru ce se utilizează

Substanța activă a ASAprin Cardio 75 mg este acidul acetilsalicilic. Acest medicament împiedică agregarea plachetară, realizând beneficii semnificative în boala coronariană.

ASAprin Cardio 75 mg se utilizează pentru:

- Prevenirea repetării infarctului miocardic
- Tratatamentul anginei pectorale instabile
- Pentru menținerea revascularizării după angioplastie și bypass coronarian
- Profilaxia accidentelor ischemice cerebrale tranzitorii și a infarctului cerebral

Comprimatele care conțin doze mici de acid acetilsalicilic nu sunt potrivite pentru folosirea în scop analgezic, antipiretic și antiinflamator (aceste acțiuni apar la doze mai mari).

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați ASAprin Cardio 75 mg**Nu utilizați ASAprin Cardio 75 mg:**

- dacă sunteți alergic (hipersensibil) la acidul acetilsalicilic, antiinflamatoare nesteroidiene sau oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la punctul 6);
- dacă suferiți de diateze hemoragice;
- dacă aveți ulcer gastric sau duodenal în evoluție.

Atenționări și precauții

Folosirea acidului acetilsalicilic impune prudență în următoarele situații clinice:

- pacienți cu teren alergic; în caz de astm bronșic și alte bronhopneumopatii obstructive cronice, alergii la polen, rinită alergică, polipi nazali, reacții alergice la alte medicamente, tratamentul se face sub supraveghere medicală;
- episoade de ulcer gastroduodenal activ în antecedente;
- afecțiuni cu risc hemoragic, meno- și metroragii;
- afecțiuni renale preexistente;
- insuficiență cardiacă necompensată;
- deficit congenital de glucozo-6-fosfat-dehidrogenază.

ASAprin Cardio 75 mg împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Asocierea următoarelor medicamente cu acidul acetilsalicilic (chiar în dozele mici folosite ca antiagregante plachetare) impune prudență sau este contraindicată:

- anticoagulante orale, heparine, ticlopidină și alte antiagregante plachetare, streptokinază și alte trombolitice, pentoxifilină; deoarece crește riscul hemoragic, este necesară prudență și controlul parametrilor de coagulare și a timpului de sângerare;
- metotrexat; asocierea este contraindicată absolut sau relativ (pentru dozele de metotrexat ≥ 15 mg/săptămână, respectiv < 15 mg pe săptămână), deoarece toxicitatea hematologică a metotrexatului este favorizată (prin mecanism farmacocinetic);
- interferon alfa; acidul acetilsalicilic poate inhiba acțiunea interferonului.

Ce trebuie să evitați când luați acest medicament?

Efectul tratamentului poate fi influențat în cazul în care acidul acetilsalicilic este administrat concomitent cu alte medicamente utilizate pentru:

- împiedicarea formării cheagurilor de sânge (de exemplu warfarină)
- rejețul de organ după transplant (ciclosporină, tacrolimus)
- hipertensiune arterială (de exemplu diuretice și inhibitori de enzimă de conversie)
- durere și inflamație (de exemplu steroizi sau medicamente antiinflamatoare)
- gută (probenecid)
- cancer sau artrită reumatoidă (metotrexat)

Înainte de a utiliza acid acetilsalicilic informați-vă medicul despre medicamentele pe care le luați. Dacă utilizați acid acetilsalicilic în mod regulat, cereți sfatul medicului dumneavoastră înainte de a lua orice alt medicament (inclusiv dintre cele eliberate fără prescripție medicală).

Utilizarea ASAprin Cardio 75 mg cu alimente, băuturi și alcool

Deoarece pacienții cărora li se administrează zilnic acid acetilsalicilic prezintă un risc crescut de sângerare gastro-intestinală după ingestia de alcool etilic, se recomandă evitarea consumului acestuia în timpul tratamentului.

Sarcina, alăptarea și fertilitatea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

Acidul acetilsalicilic s-a dovedit teratogen în studii experimentale, la animale de laborator.

În primele două trimestre de sarcină se poate administra acid acetilsalicilic, dar numai la indicația medicului; se recomandă evitarea tratamentului cronic cu doze > 150 mg pe zi. În ultimul trimestru de sarcină acidul acetilsalicilic este contraindicat (cu excepția utilizării punctuale pentru anumite indicații cardiologice și obstetricale foarte limitate).

Deoarece acidul acetilsalicilic trece în lapte, folosirea în timpul alăptării trebuie evitată, sau alăptarea se întrerupe, în funcție de raportul risc/beneficiu.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

ASAprin Cardio 75 mg nu influențează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

3. Cum să utilizați ASAprin Cardio 75 mg

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum este descris în acest prospect sau așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

Doza recomandată pentru profilaxia și tratamentul accidentelor coronariene este de un comprimat (75 mg acid acetilsalicilic) de 1 - 4 ori pe zi. În infarctul miocardic acut administrarea se va face imediat după debutul simptomelor.

Pentru profilaxia accidentelor ischemice cerebrale tranzitorii și a infarctului cerebral se recomandă câte un comprimat de 1 - 2 ori pe zi.

Comprimatele se înghit nesfărâmate, cu o cantitate suficientă de apă, de preferat după mese.

Dacă luați mai mult din ASAprin Cardio 75 mg decât trebuie

Dacă luați mai mult ASAprin Cardio 75 mg decât trebuie, sau dacă o altă persoană ia accidental comprimate de ASAprin Cardio 75 mg, adresați-vă medicului sau mergeți la cel mai apropiat spital (unitate de terapie intensivă).

Păstrați prospectul și toate comprimatele rămase, pentru a le arăta medicului.

Dacă uitați să utilizați ASAprin Cardio 75 mg

Dacă ați uitat să luați o doză de ASAprin Cardio 75 mg, luați-o imediat ce vă aduceți aminte. Dacă este aproape momentul pentru administrarea următoarei doze, nu mai luați doza uitată și continuați-vă schema de tratament.

Nu luați o doză dublă pentru a compensa comprimatul uitat.

Dacă încetați să utilizați ASAprin Cardio 75 mg

Nu încetați să luați ASAprin Cardio 75 mg fără să discutați cu medicul dumneavoastră.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest produs, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Dozele mici de acid acetilsalicilic sunt, de regulă, bine suportate.

Au fost semnalate sângerări diverse – hematemeză, melenă, hemoragii digestive oculte (eventual cu anemie feriprivă), epistaxis, gingivoragii, purpură. Riscul hemoragic chirurgical este crescut. Favorizarea hemoragiilor se menține timp de 4 - 8 zile după oprirea administrării acidului acetilsalicilic.

Fenomenele de iritație gastrică sunt rare dacă tratamentul se face corect. Au fost raportate cazuri de activare a ulcerului gastro-duodenal.

Sunt posibile reacții alergice, manifestate îndeosebi prin urticarie, edeme, rareori astm sau reacții anafilactice. Au fost semnalate reacții de tip anafilactic la pacienți cu predispoziție de a reacționa la anumite medicamente.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

Bucuresti 011478- RO

e-mail: adr@anm.ro

Website: www.anm.ro

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează ASAprin Cardio 75 mg

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original, pentru a fi protejat de umiditate.

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține ASAprin Cardio 75 mg

- Substanța activă este: acidul acetilsalicilic. Fiecare comprimat gastrorezistent conține acid acetilsalicilic 75 mg.
- Celelalte componente sunt: *nucleu* - celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, amidon de porumb, talc; *film* - alcool polivinil parțial hidrolizat, dioxid de titan (E 171), macrogol 3350, talc, acid metacrilic, citrat de trietil, dioxid de siliciu coloidal anhidru, bicarbonat de sodiu, laurilsulfat de sodiu.

Cum arată ASAprin Cardio 75 mg și conținutul ambalajului

Comprimate lenticulare de culoare albă, diametru de 6 mm.

Cutie cu 2 blistere din PVC transparent/Al a câte 10 comprimate gastrorezistente.

Cutie cu 3 blistere din PVC transparent/Al a câte 10 comprimate gastrorezistente.

Cutie cu 4 blistere din PVC transparent/Al a câte 10 comprimate gastrorezistente.

Cutie cu 6 blistere din PVC transparent/Al a câte 10 comprimate gastrorezistente.

Deținătorul autorizației de punere pe piață

AC HELCOR Pharma S.R.L.

Str. Victor Babeș nr. 50, Baia Mare, jud. Maramureș, România

Fabricantul

AC HELCOR S.R.L.

Str. Victor Babeș nr. 62, Baia Mare, jud. Maramureș, cod poștal 430083, România

Acest prospect a fost revizuit în noiembrie 2025.