

**Prospect: Informații pentru utilizator****Apixaban Stada 5 mg comprimate filmate**  
apixaban

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să luați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

**Ce găsiți în acest prospect :**

1. Ce este Apixaban Stada și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să luați Apixaban Stada
3. Cum să luați Apixaban Stada
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Apixaban Stada
6. Conținutul ambalajului și alte informații

**1. Ce este Apixaban Stada și pentru ce se utilizează**

Apixaban Stada conține ca substanță activă apixaban și aparține unui grup de medicamente denumite anticoagulante. Acest medicament acționează prin prevenirea formării de cheaguri de sânge prin blocarea Factorului Xa, care este un component important în coagularea sângelui.

Apixaban Stada este utilizat la adulți:

- pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge la nivelul inimii, în cazul pacienților cu bătăi neregulate ale inimii (fibrilație atrială) și cel puțin un factor de risc suplimentar. Cheagurile de sânge se pot desprinde și pot ajunge până la creier, determinând un accident vascular cerebral, sau la alte organe, împiedicând curgerea normală a sângelui către organul respectiv (situație cunoscută, de asemenea, sub denumirea de embolie sistemică). Un accident vascular cerebral poate pune viața în pericol și necesită asistență medicală imediată.
- pentru a trata cheagurile de sânge formate la nivelul venelor picioarelor (tromboză venoasă profundă) și al vaselor de sânge din plămânii dumneavoastră (embolie pulmonară) și pentru a preveni reapariția cheagurilor de sânge în vasele de sânge de la nivelul picioarelor și/sau plămânilor.

**2. Ce trebuie să știți înainte de a lua Apixaban Stada****Nu luați Apixaban Stada dacă:**

- **sunteți alergic** la apixaban sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6);
- prezentați **sângerări în exces**;

- aveți o **afecțiune a unui organ** al corpului, care crește riscul de sângerare gravă (cum este **ulcer activ sau ulcer recent** la nivelul stomacului sau intestinului, **sângerare recentă la nivelul creierului**);
- aveți o **boală de ficat** care poate duce la risc crescut de sângerare (coagulopatie hepatică);
- **luați medicamente care împiedică coagularea sângelui** (de exemplu warfarină, rivaroxaban, dabigatran sau heparină), cu excepția cazului în care este vorba despre schimbarea tratamentului anticoagulant, despre montarea unei linii venoase sau arteriale și vi se administrează heparină pe această linie pentru a o menține deschisă sau dacă un tub este introdus în vasul de sânge (ablație prin cateter) pentru a trata bătăile neregulate ale inimii (aritmie).

### Atenționări și precauții

Înainte să luați acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă aveți oricare dintre următoarele:

- un **risc crescut de sângerare**, de exemplu:
    - **tulburări de sângerare**, inclusiv afecțiuni care rezultă în scăderea activității plachetare;
    - **tensiune arterială foarte mare**, necontrolată prin tratament medical;
    - aveți vârsta mai mare de 75 ani;
    - greutatea dumneavoastră este de 60 kg sau mai puțin;
  - o **boală de rinichi severă sau dacă sunteți dializat**;
  - o **problemă la ficat sau ați avut probleme la ficat**;
- Acest medicament va fi utilizat cu precauție la pacienții cu semne de afectare a funcției ficatului.
- dacă aveți **proteză la o valvă a inimii**;
  - dacă medicul dumneavoastră stabilește că aveți tensiune arterială oscilantă sau dacă este planificat un alt tratament sau o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea cheagului de sânge de la nivelul plămânilor.

Aveți grijă deosebită când luați Apixaban Stada

- dacă știți că aveți o boală numită sindrom antifosfolipidic (o afecțiune a sistemului imunitar care determină un risc mărit de cheaguri de sânge), spuneți-i medicului dumneavoastră, care va hotărî dacă poate fi necesară schimbarea tratamentului.

Dacă trebuie să vi se efectueze o intervenție chirurgicală sau o procedură care poate provoca **sângerare**, medicul dumneavoastră vă poate cere să opriți temporar administrarea acestui medicament pentru o perioadă scurtă de timp. Dacă nu sunteți sigur dacă o anumită procedură vă poate provoca o sângerare, discutați cu medicul dumneavoastră.

### Copii și adolescenți

Acest medicament nu este recomandat copiilor și adolescenților cu vârsta sub 18 ani.

### Apixaban Stada împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale dacă luați, ați luat recent sau s-ar putea să luați orice alte medicamente.

Unele medicamente pot crește efectele Apixaban Stada în timp ce altele pot scădea aceste efecte. Medicul dumneavoastră va decide dacă veți urma tratamentul cu Apixaban Stada atunci când luați aceste medicamente și cât de atent trebuie să fiți supravegheat

Următoarele medicamente pot crește efectele Apixaban Stada și pot crește riscul de sângerare nedorită:

- unele **medicamente pentru infecții fungice** (de exemplu ketoconazol, etc.)
- unele **medicamente antivirale pentru HIV / SIDA** (de exemplu ritonavir)
- alte **medicamente utilizate pentru reducerea coagulării sângelui** (de exemplu enoxaparină, etc.)
- **medicamente antiinflamatoare** sau **calmante ale durerii** (de exemplu acid acetilsalicilic sau naproxen). În special dacă aveți vârsta peste 75 ani și luați acid acetilsalicilic, puteți avea un risc crescut de sângerare.
- **medicamente pentru tratamentul tensiunii arteriale mari sau pentru probleme**

- **cardiace** (de exemplu diltiazem)
- **medicamente antidepresive** denumite **inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei** sau **inhibitori ai recaptării serotoninei-noradrenalinei**.

Următoarele medicamente pot scădea capacitatea Apixaban Stada de a ajuta la prevenirea formării cheagurilor de sânge:

- **medicamente pentru prevenirea epilepsiei sau a convulsiilor** (de exemplu fenitoină, etc.);
- **sunătoare** (un supliment din plante utilizat pentru tratamentul depresiei);
- **medicamente pentru tratamentul tuberculozei** sau al **altor infecții** (de exemplu rifampicină).

### **Sarcina și alăptarea**

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

### Sarcina

Nu se cunosc efectele Apixaban Stada asupra sarcinii și asupra copilului nenăscut. Nu trebuie să luați acest medicament dacă sunteți gravidă. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră dacă rămâneți gravidă în timpul tratamentului cu acest medicament.

### Alăptarea

Nu se cunoaște dacă Apixaban Stada se elimină în laptele uman. Dacă alăptați, cereți sfatul medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale înainte de a lua acest medicament. Ei vă vor recomanda dacă este cazul să nu mai alăptați sau să opriți administrarea acestui medicament/să nu începeți să luați acest medicament.

### **Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor**

Nu s-a demonstrat că Apixaban Stada vă afectează capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

### **Apixaban Stada conține lactoză și sodiu**

**Lactoză:** Dacă medicul dumneavoastră v-a atenționat că aveți intoleranță la unele categorii de glucide, vă rugăm să-l contactați înainte de a lua acest medicament.

**Sodiu:** Acest medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per comprimat, adică practic „nu conține sodiu”.

## **3. Cum să luați Apixaban Stada**

Luați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră, cu farmacistul sau cu asistenta medicală dacă nu sunteți sigur.

### **Doza**

Comprimatul poate fi divizat în doze egale.

Înghițiți comprimatul cu un pahar cu apă. Apixaban Stada se poate administra cu sau fără alimente.

Încercați să luați comprimatele la aceeași oră în fiecare zi pentru a obține cel mai bun efect al tratamentului.

Dacă vă este dificil să înghițiți comprimatul întreg, adresați-vă medicului dumneavoastră cu privire la alte modalități de a lua Apixaban Stada. Comprimatul poate fi zdrobit și amestecat cu apă, cu soluție de glucoză 5%, cu suc de mere sau piure de mere, imediat înainte de a-l lua.

### **Instrucțiuni pentru zdrobire:**

- Zdrobiți comprimatele cu ajutorul unui mojar cu pistil.

- Transferați cu grijă toată pulberea într-un recipient adecvat, apoi amestecați pulberea cu o cantitate mică, de exemplu 30 ml (2 linguri), de apă sau dintr-unul din celelalte lichide menționate mai sus pentru a face un amestec.
- Înghițiți amestecul.
- Clătiți mojarul și pistilul pe care le-ați utilizat pentru zdrobirea comprimatului și recipientul cu puțină apă sau puțin dintr-unul din celelalte lichide (de exemplu 30 ml) și înghițiți lichidul cu care ați clătit.

De asemenea, dacă este necesar, medicul dumneavoastră vă poate administra comprimatul de Apixaban Stada zdrobit amestecat în 60 ml de apă sau soluție de glucoză 5% printr-o sondă nazogastrică.

### **Luați Apixaban Stada așa cum v-a fost recomandat pentru:**

Prevenirea formării unui cheag de sânge la nivelul inimii la pacienții cu bătăi neregulate ale inimii și cel puțin un factor de risc suplimentar

Doza recomandată este de un comprimat de Apixaban Stada de **5 mg** de două ori pe zi.

Doza recomandată este de un comprimat de Apixaban Stada de **2,5 mg** de două ori pe zi dacă:

- aveți o **reducere severă a funcției renale**;
- **două sau mai multe dintre următoarele situații sunt valabile în cazul dumneavoastră:**
  - analizele dumneavoastră de sânge indică o funcție renală deficitară (valoarea creatininei serice este de 1,5 mg/dl (133 micromoli/l) sau mai mare;
  - aveți vârsta de 80 ani sau peste;
  - aveți o greutate corporală de 60 kg sau mai mică.

Doza recomandată este de un comprimat de două ori pe zi, de exemplu, un comprimat dimineața și unul seara.

Medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să continuați tratamentul.

Tratamentul cheagurilor de sânge formate la nivelul venelor picioarelor și al vaselor de sânge din plămânii dumneavoastră

Doza recomandată este de **două comprimate** de Apixaban Stada **5 mg** de două ori pe zi în primele 7 zile, de exemplu, două comprimate dimineața și două seara.

După 7 zile, doza recomandată este de **un comprimat** de Apixaban Stada **5 mg** de două ori pe zi, de exemplu, un comprimat dimineața și unul seara.

Prevenirea reapariției cheagurilor de sânge după încheierea tratamentului cu durată de 6 luni

Doza recomandată este de un comprimat de Apixaban Stada **2,5 mg** de două ori pe zi, de exemplu, un comprimat dimineața și unul seara.

Medicul dumneavoastră va decide cât timp trebuie să continuați tratamentul.

### **Medicul dumneavoastră vă poate schimba tratamentul anticoagulant după cum urmează:**

- *Schimbarea tratamentului cu Apixaban Stada cu medicamente anticoagulante*

Opriti administrarea Apixaban Stada. Începeți tratamentul cu medicamente anticoagulante (de exemplu heparină) la ora la care ar fi trebuit să luați următorul comprimat.

- *Schimbarea tratamentului cu medicamente anticoagulante cu Apixaban Stada*

Opriti administrarea medicamentelor anticoagulante. Începeți tratamentul cu Apixaban Stada la ora la care ar fi trebuit administrată următoarea doză din medicamentul anticoagulant, apoi continuați administrarea conform orarului obișnuit.

- Schimbarea tratamentului anticoagulant care conține un antagonist al vitaminei K (de exemplu warfarină) cu Apixaban Stada

Oprii administrarea medicamentului care conține un antagonist al vitaminei K. Medicul dumneavoastră trebuie să vă facă analize de sânge și să vă informeze în legătură cu momentul în care să începeți să luați Apixaban Stada.

- Schimbarea tratamentului cu Apixaban Stada cu tratament anticoagulant care conține un antagonist al vitaminei K (de exemplu, warfarină)

Dacă medicul dumneavoastră vă spune că trebuie să începeți să luați un medicament care conține un antagonist al vitaminei K, continuați administrarea Apixaban Stada timp de cel puțin 2 zile după prima doză din medicamentul care conține un antagonist al vitaminei K. Medicul dumneavoastră trebuie să vă facă analize de sânge și să vă informeze când să opriți administrarea Apixaban Stada.

#### **Pacienți la care se efectuează cardioversie**

Dacă ritmul anormal al bătailor inimii dumneavoastră trebuie să fie readus la normal printr-o procedură numită cardioversie, luați acest medicament în momentul în care vă spune medicul dumneavoastră, pentru a preveni formarea de cheaguri de sânge în vasele de sânge din creierul dumneavoastră și alte vase de sânge din corp.

#### **Dacă luați mai mult Apixaban Stada decât trebuie**

**Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră** dacă ați luat mai multe comprimate din acest medicament decât doza recomandată. Luați cutia medicamentului cu dumneavoastră, chiar dacă nu mai conține comprimate.

Dacă luați mai mult Apixaban Stada decât vi s-a recomandat, puteți avea un risc crescut de sângerare. Dacă apare sângerare, poate fi necesară o intervenție chirurgicală, transfuzii de sânge sau alte tratamente care ar putea inversa activitatea anti-factor Xa.

#### **Dacă uitați să luați Apixaban Stada**

Luați doza imediat ce vă amintiți și:

- luați următoarea doză de Apixaban Stada la ora obișnuită
- apoi continuați să le luați ca de obicei.

**Dacă nu știți ce să faceți sau ați omis mai mult de o doză**, întrebați medicul dumneavoastră, farmacistul sau asistenta medicală.

#### **Dacă încetați să luați Apixaban Stada**

Nu încetați să luați acest medicament fără să discutați mai întâi cu medicul dumneavoastră, deoarece crește riscul de apariție a cheagurilor de sânge dacă tratamentul este întrerupt prea devreme.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.

## **4. Reacții adverse posibile**

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Cea mai frecventă reacție adversă generală la acest medicament este sângerarea, care poate pune viața în pericol și necesită asistență medicală imediată.

**Următoarele reacții adverse pot să apară dacă luați Apixaban Stada pentru prevenirea formării cheagurilor de sânge la nivelul inimii la pacienții cu băți neregulate ale inimii și cel puțin un factor de risc suplimentar.**

**Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)**

- Sângerare, incluzând:
  - sângerare la nivelul ochilor;
  - sângerare la nivelul stomacului sau intestinului;
  - de la nivelul rectului;
  - sânge în urină;
  - sângerare nazală;
  - sângerare la nivelul gingiilor;
  - vânătăi și umflături;
- Anemie care poate determina oboseală sau paloare;
- Tensiune arterială mică care poate determina stare de leșin sau accelerarea bătăilor inimii;
- Greață (senzație de rău);
- Testele de sânge pot arăta:
  - o creștere a valorilor unei enzime a ficatului (gama glutamil transferază (GGT)).

**Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)**

- Sângerare:
  - sângerare la nivelul creierului sau al coloanei vertebrale;
  - sângerare la nivelul gurii sau eliminare de sânge prin tuse;
  - sângerare la nivelul abdomenului sau vaginului;
  - sânge roșu în materiile fecale;
  - sângerare apărută după intervenția chirurgicală, inclusiv vânătăi și umflături, sânge sau lichid care se scurge de la nivelul plăgii/inciziei chirurgicale (secreție a plăgii) sau de la locul de injectare;
  - dintr-un hemoroid;
  - rezultatele testelor indică prezența de sânge în materiile fecale sau în urină;
- Scădere a numărului de plachete din sângele dumneavoastră (care poate influența formarea cheagurilor);
- Testele de sânge pot arăta:
  - funcționare anormală a ficatului;
  - o creștere a valorilor unor enzime ale ficatului;
  - o creștere a valorii bilirubinei, un produs apărut din degradarea celulelor roșii din sânge, care poate determina colorarea în galben a pielii și a ochilor;
- Erupție trecătoare pe piele;
- Mâncărimi la nivelul pielii;
- Cădere a părului;
- Reacții alergice (hipersensibilitate) care pot determina: umflare a feței, buzelor, gurii, limbii și/sau a gâtului și dificultate la respirație. **Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră** dacă aveți oricare dintre aceste simptome.

**Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)**

- Sângerare:
  - la nivelul plămânilor sau al gâtului;
  - la nivelul spațiului situat în spatele cavității dumneavoastră abdominale;
  - la nivelul unui mușchi.

**Reacții adverse foarte rare (pot afecta până la 1 din 10000 persoane)**

- Erupție trecătoare pe piele care poate fi sub formă de vezicule și arată ca niște mici ținte (pete închise la culoare în centru, înconjurate de o zonă mai palidă, cu un inel mai închis în jurul marginii) (*eritem polimorf*).

**Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)**

- Inflamație a vaselor de sânge (vasculită) care poate conduce la erupție trecătoare pe piele sau pete ca înțepătura de ac, plane, roșii, rotunde sub suprafața pielii sau la apariția de vânătăi
- Sângerare la nivelul rinichiului, uneori cu prezența de sânge în urină, ceea ce duce la

incapacitatea rinichilor de a funcționa corespunzător (nefropatie legată de anticoagulante).

Următoarele reacții adverse pot să apară dacă luați **Apixaban Stada** pentru tratamentul sau prevenirea reaparității cheagurilor de sânge la nivelul venelor picioarelor și al vaselor de sânge din plămâni dumneavoastră.

**Reacții adverse frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane)**

- Sângerare, inclusiv:
  - sângerare nazală;
  - sângerare la nivelul gingiilor;
  - sânge în urină;
  - vânătăi și umflături;
  - sângerare la nivelul stomacului, intestinului, de la nivelul rectului dumneavoastră;
  - la nivelul gurii;
  - de la nivelul vaginului;
- Anemie care poate determina oboseală sau paloare;
- Scădere a numărului de plachete din sângele dumneavoastră (care poate influența formarea cheagurilor);
- Greață (senzație de rău);
- Erupție trecătoare pe piele;
- Testele de sânge pot arăta:
  - o creștere a valorilor enzimelor ficatului: a gama glutamil transferazei (GGT) sau alanin aminotransferazei (ALT).

**Reacții adverse mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane)**

- Tensiune arterială mică care poate determina stare de leșin sau accelerarea bătăilor inimii;
- Sângerare:
  - sângerare la nivelul ochilor;
  - sângerare la nivelul gurii sau eliminare de sânge prin tuse;
  - sânge roșu în materiile fecale;
  - rezultatele testelor indică prezența de sânge în materiile fecale sau în urină;
  - sângerare apărută după intervenția chirurgicală, inclusiv vânătăi și umflături, sânge sau lichid care se scurge de la nivelul plăgii/inciziei chirurgicale (secreție a plăgii) sau de la locul de injectare;
  - dintr-un hemoroid;
  - la nivelul unui mușchi;
- Mâncărimi la nivelul pielii;
- Cădere a părului;
- Reacții alergice (hipersensibilitate) care pot determina: umflarea feței, buzelor, gurii, limbii și/sau a gâtului și dificultate la respirație. **Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră** dacă aveți oricare dintre aceste simptome;
- Testele de sânge pot arăta:
  - funcționare anormală a ficatului;
  - o creștere a valorilor unor enzime ale ficatului;
  - o creștere a valorii bilirubinei, un produs apărut din degradarea celulelor roșii din sânge, care poate determina colorarea în galben a pielii și a ochilor.

**Reacții adverse rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane)**

- Sângerare:
  - sângerare la nivelul creierului sau al coloanei vertebrale;
  - sângerare la nivelul plămânilor.

**Cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile)**

- Sângerare:
  - la nivelul abdomenului sau al spațiului situat în spatele cavității dumneavoastră abdominale.

- Erupție trecătoare pe piele care poate fi sub formă de vezicule și arată ca niște mici ținte (pete închise la culoare în centru, înconjurată de o zonă mai palidă, cu un inel mai închis în jurul marginii) (*eritem polimorf*);
- Inflamație a vaselor de sânge (vasculită) care poate conduce la erupție trecătoare pe piele sau pete ca înțepătura de ac, plane, roșii, rotunde sub suprafața pielii sau la apariția de vânătăi.
- Sângerare la nivelul rinichiului, uneori cu prezența de sânge în urină, ceea ce duce la incapacitatea rinichilor de a funcționa corespunzător (nefropatie legată de anticoagulante).

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro).

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro).

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

## **5. Cum se păstrează Apixaban Stada**

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și pe blister după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Acest medicament nu necesită condiții speciale de păstrare.

### **MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.**

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

## **6. Conținutul ambalajului și alte informații**

### **Ce conține Apixaban Stada**

Substanța activă este apixaban. Fiecare comprimat conține apixaban 5 mg.

Celelalte componente sunt:

Nucleul comprimatului: celuloză microcristalină, croscarmeloză sodică, docusat de sodiu, copolimer grefat de polivinil caprolactam-acetat de polivinil-polietilen glicol, stearat de magneziu.

Film (opadry II roz): hipromeloză (2910, 15mPas), lactoză monohidrat, dioxid de titan (E171), macrogol (3350), oxid roșu de fier (E172), oxid galben de fier (E172)

### **Cum arată Apixaban Stada și conținutul ambalajului**

Comprimatele filmate sunt roz, ovale, cu o linie mediană pe o parte.

Apixaban Stada este disponibil în cutii cu blistere care conțin 14, 20, 28, 30, 56, 60, 100, 168 și 200 de comprimate filmate.

De asemenea, Apixaban Stada este disponibil în cutii cu blistere cu doze unitare care conțin 14 x 1, 20 x 1, 28 x 1, 30 x 1, 56 x 1, 60 x 1, 100 x 1, 168 x 1 și 200 x 1 comprimate filmate.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

### **Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul**

#### **Deținătorul autorizației de punere pe piață**

STADA M&D SRL  
Strada Sfântul Elefterie, nr. 18,  
Parte A, Etaj 1 Sector 5, București  
România

#### **Fabricanții**

Stada Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel 61118  
Germania

Stada Arzneimittel GmbH  
Muthgasse 36/2, Doebling, Vienna 1190  
Austria

Centrafarm Services B.V.  
Van de Reijtstraat 31 E, Breda 4814NE  
Țările de jos

Clonmel Healthcare Limited  
3 Waterford Road, Clonmel Co. Tipperary E91 D768  
Irlanda

### **Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spațiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:**

|               |                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| Germania      | Apixaban STADA 5 mg Filmtabletten                            |
| Austria       | Apixaban STADA 5 mg Filmtabletten                            |
| Belgia        | Apixaban EG 5 mg filmomhulde tabletten                       |
| Cehia         | Apixaban STADA                                               |
| Danemarca     | Apixaban STADA                                               |
| Spania        | Apixaban STADA 5 mg comprimidos recubiertos con película EFG |
| Finlanda      | Apixaban STADA 5 mg kalvopäällysteiset tabletit              |
| Franța        | APIXABAN EG 5 mg, comprimé pelliculé                         |
| Ungaria       | Apixaban Stada 5mg filmdragerade tabletta                    |
| Irlanda       | Apixaban Clonmel 5 mg film-coated tablets                    |
| Islanda       | Apixaban STADA 5 mg filmuhúðuð tafla                         |
| Luxemburg     | Apixaban 5 mg EG comprimés pelliculés                        |
| Țările de jos | Apixaban CF 5 mg, filmomhulde tabletten                      |
| Portugalia    | Apixabano Ciclum                                             |
| România       | Apixaban STADA 5 mg comprimate filmate                       |
| Slovenia      | Apixaban STADA 5 mg filmsko obložene tablete                 |
| Slovacia      | Apixaban STADA 5 mg                                          |
| Suedia        | Apixaban STADA 5 mg filmdragerade tabletter                  |

**Acest prospect a fost revizuit în septembrie 2026**