Prospect: Informaţii pentru utilizator

Dacarbazină Accord 200 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă
dacarbazină

Citiţi cu atenţie şi în întregime acest prospect înainte de a utiliza acest medicament, deoarece conţine informaţii importante pentru dumneavoastră.
- Păstraţi acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiţi.
- Dacă aveţi orice întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră, farmacistului sau asistentei medicale. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. Vezi pct.4.

Ce găsiţi în acest prospect:
1. Ce este Dacarbazină Accord şi pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să ştiți înainte să utilizați Dacarbazină Accord
3. Cum să utilizați Dacarbazină Accord
4. Reacţii adverse posibile
5. Cum se păstrează Dacarbazină Accord
6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

1. Ce este Dacarbazină Accord şi pentru ce se utilizează

Dacarbazina aparţine unui grup de medicamente numite medicamente citostatice. Aceste medicamente influenţează creşterea celulelor canceroase.

Dacarbazină Accord a fost prescris de medicul dumneavoastră pentru tratamentul cancerului, cum este:
- melanomul malign în stadiu avansat (cancer de piele),
- boala Hodgkin (cancer al ţesutului limfatic),
- sarcomul de ţesut moale (cancer al muşchilor, ţesutului adipos, ţesutului fibros, al vaselor de sânge sau al altui ţesut de susţinere din organism).

Dacarbazină Accord poate fi administrat în asociere cu alte medicamente citostatice.

2. Ce trebuie să ştiți înainte să utilizați Dacarbazină Accord

Nu utilizați Dacarbazină Accord
- dacă sunteţi alergic la dacarbazină sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerate la pct. 6)
- dacă numărul de globule albe şi/sau trombocite din sânge este prea scăzut (leucopenie şi/sau trombocitopenie),
- dacă aveţi o boală severă la ficat sau rinichi,
- dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi

Atenţionări şi precauţii
Înainte să utilizaţi Dacarbazină Accord, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Înainte de fiecare administrare, medicul dumneavoastră vă va testa sângele pentru a verifica dacă aveţi suficiente globule sanguine pentru a vi se administra acest medicament. Va fi monitorizată, de asemenea, funcţia ficatului şi a rinichilor.

Nu trebuie să vă vaccinați cu un vaccin viu dacă vi se administrează Dacarbazină Accord. Asta pentru ca Dacarbazină Accord vă poate slăbi sistemul imunitar şi vă poate creşte probabilitatea de a contracta o infecţie gravă.

Nu trebuie să utilizați fotemustină dacă urmați un tratament cu Dacarbazină Accord.

Dacarbazină Accord împreună cu alte medicamente
Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu se recomandă utilizarea niciunui tratament medical fără a-i spune medicului dumneavoastră, deoarece pot exista interacţiuni între Dacarbazină Accord şi alte medicamente.

În special, spuneţi medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă luaţi sau vi se administrează vreunul dintre următoarele:
- Radioterapie sau alte medicamente destinate reducerii creșterii tumorale (chimioterapie). Utilizarea acestor medicamente împreună cu Dacarbazină Accord poate agrava afectarea măduvei osoase.
- Alte medicamente care sunt metabolizate de un sistem de enzime hepatice numit citocrom P450.
- Metoxipsoralen (pentru afecțiuni ale pielii, cum sunt psoriazisul și eczema) – Administrarea Dacarbazină Accord împreună cu metoxipsoralenul vă poate face mai sensibil la lumina soarelui (fotosensibilizare).
- Fenitoină (utilizată pentru tratarea crizelor convulsive) – Utilizarea simultană de Dacarbazină Accord și fenitoină poate crește riscul de a avea crize (convulsii).
- Ciclosporină sau tacrolimus (utilizate pentru a reduce reacțiile imune ale organismului) – Aceste medicamente pot slăbi sistemul imunitar.
- Fotemustină (utilizată pentru tratamentul cancerului de piele) – Utilizarea simultană de Dacarbazină Accord și fotemustină poate duce la afectarea plămânilor.
- Medicamentele care pot provoca leziuni hepatice, de exemplu diazepam (utilizat pentru tratarea anxietății, a spasmelor musculare și a convulsiilor), imipramină (utilizată pentru tratarea simptomelor depresiei), ketoconazol (utilizat pentru tratarea infecțiilor fungice), carbamazepină (utilizată pentru prevenirea crizelor, ameliorarea anumitor tipuri de durere sau pentru controlul tulburărilor de dispoziție) trebuie evitate în timpul chimioterapiei.
- Anticoagulante (medicamente utilizate pentru a preveni formarea cheagurilor de sânge) – Medicul dumneavoastră va decide dacă vi se vor administra aceste medicamente și va verifica tendința de coagulare a sângelui dumneavoastră.

Nu trebuie să vă vaccinați cu un vaccin viu dacă vi se administrează Dacarbazină Accord și timp de 3 luni după încheierea tratamentului cu Dacarbazină Accord. Asta pentru că Dacarbazină Accord vă poate slăbi sistemul imunitar şi vă poate creşte probabilitatea de a contracta o infecţie gravă.

Este posibil să vi se administreze un vaccin „mort” sau inactivat dacă vi se administrează Dacarbazină Accord.

Dacarbazină Accord împreună cu alcool
În timpul chimioterapiei nu trebuie să consumaţi alcool.

Sarcina, alăptarea şi fertilitatea
Dacă sunteţi gravidă sau alăptaţi sau credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă, adresaţi-vă medicului pentru recomandări înainte de a vi se administra acest medicament.
Acest medicament poate fi dăunător pentru copilul nenăscut.
Nu utilizați dacarbazină dacă sunteți gravidă, credeţi că aţi putea fi gravidă sau intenţionaţi să rămâneţi gravidă.
Nu alăptați în timpul tratamentului cu Dacarbazină Accord.

<u>Femeile aflate la vârsta fertilă/contracepția la bărbați și femei</u>

Dacă sunteți femeie și doriți să rămâneți gravidă, trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră, deoarece acesta vă poate îndruma către un specialist înainte de începerea planificată a tratamentului și după încheierea acestuia.
Dacă sunteți bărbat, vi se recomandă să solicitați consiliere privind conservarea spermei înainte de începerea planificată a tratamentului.
Femeile aflate la vârsta fertilă trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace pe durata tratamentului cu dacarbazină și timp de 6 luni după încheierea tratamentului.
Bărbații trebuie să utilizeze metode contraceptive eficace și să nu conceapă un copil pe durata tratamentului cu dacarbazină și timp de 3 luni după încheierea tratamentului.

Conducerea vehiculelor şi folosirea utilajelor
Capacitatea dumneavoastră de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje poate fi afectată din cauza reacţiilor adverse la nivelul sistemului nervos central (reacţii adverse la nivelul creierului şi nervilor) sau a greței și vărsăturilor; dar nu există niciun motiv pentru care să nu conduceţi vehicule sau să folosiţi utilaje între schemele de tratament cu acest medicament, cu excepţia cazului în care vă simţiţi ameţit sau nesigur.

3. Cum să utilizați Dacarbazină Accord

Acest medicament vă va fi administrat sub supravegherea unui medic specializat în oncologie (tratament pentru cancer) sau hematologie (studiul bolilor de sânge). Veți fi monitorizat periodic, atât în timpul tratamentului, cât și după acesta, pentru a depista eventualele semne de reacții adverse.

Dacarbazina este o substanţă sensibilă la expunerea la lumină.
Medicul sau asistenta medicală care vă administrează acest medicament se va asigura că dacarbazina este protejată de expunerea la lumina soarelui în timpul administrării.

Ce cantitate de Dacarbazină Accord vi se va administra
Medicul dumneavoastră va calcula doza care vi se va administra.
Aceasta va depinde de tipul de cancer pe care îl aveți și de stadiul acestuia, de suprafața dumneavoastră corporală (m^2), de valorile hemoleucogramei și de alte medicamente sau tratamente anticancer pe care le urmați în prezent. De asemenea, medicul va decide în mod individual durata administrării acestui medicament.

Medicul dumneavoastră poate modifica doza și frecvența administrării în funcție de rezultatele analizelor de sânge, starea dumneavoastră generală, alte tratamente urmate și răspunsul dumneavoastră la acest medicament. Dacă aveți întrebări cu privire la tratamentul dumneavoastră, adresați-vă medicului, asistentei medicale sau farmacistului.

Cancer de piele (melanom malign metastatic)
Doza uzuală este de 200 – 250 mg pe m^2 de suprafață corporală, o dată pe zi. Veți primi această doză timp de 5 zile consecutive, la fiecare 3 săptămâni. Medicamentul va fi administrat sub formă de injecție rapidă în venă sau sub formă de perfuzie lentă în venă, cu o durată de 15 – 30 de minute.
Alternativ, vi se poate administra o singură doză mai mare de 850 mg pe m^2 suprafață corporală, la fiecare 3 săptămâni. Aceasta va fi administrată sub formă de perfuzie lentă intravenoasă.

Cancerul țesutului limfatic (boala Hodgkin)
Doza uzuală este de 375 mg pe m^2 suprafață corporală, la fiecare 15 zile. De asemenea, vi se vor administra medicamente numite doxorubicină, bleomicină și vinblastină (această combinație se numește schema terapeutică ABVD). Acestea vor fi administrate sub formă de perfuzie lentă intravenoasă.

Cancerul mușchilor, țesutului adipos, țesutului fibros, vaselor de sânge sau al altor țesuturi de susținere ale corpului (sarcomul țesuturilor moi)
Doza uzuală este de 250 mg pe m^2 suprafață corporală, o dată pe zi. Vi se administrează această doză 5 zile la rând, la fiecare 3 săptămâni. Se va administra sub formă de perfuzie lentă în venă, cu o durată de

15 – 30 de minute.
De asemenea, vi se va administra un medicament numit doxorubicină (această combinație se numește schema terapeutică ADIC).

Pacienții cu probleme cu rinichii sau ficatul
Dacă aveți probleme cu rinichii sau ficatul, ușoare sau moderate, de obicei nu este necesar să vi se administreze o doză mai mică din acest medicament. Dacă aveți atât probleme cu rinichii, cât și cu ficatul, organismul dumneavoastră va avea nevoie de mai mult timp pentru a utiliza medicamentul și a-l elimina din organism. Medicul dumneavoastră vă poate administra o doză mai mică din acest medicament.

Utilizarea la copii și adolescenți
Nu se pot face recomandări speciale pentru medicul dumneavoastră privind utilizarea Dacarbazină Accord la copii și adolescenți, până ce nu apar date suplimentare.

Dacă utilizați mai mult Dacarbazină Accord decât trebuie
Dacă vi s-a administrat o cantitate prea mare de Dacarbazină Accord, acest lucru poate provoca o scădere severă a numărului de celule sanguine. Poate duce la pierderea completă a funcției măduvei osoase. Simptomele posibile includ semne de infecții, vânătăi cauzate de o tendință crescută de sângerare sau oboseală. Aceste simptome pot apărea cu o întârziere de până la 2 săptămâni.

Dacă credeți că vi s-a administrat o doză prea mare de Dacarbazină Accord, spuneți imediat medicului sau asistentei medicale. Se va verifica numărul de celule sanguine și pot fi necesare măsuri de susținere, cum ar fi transfuzii.

Dacă aveți întrebări suplimentare privind utilizarea acestui medicament, adresați-vă medicului sau farmacistului.

4. Reacţii adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacţii adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele. Medicul dumneavoastră va discuta cu dumneavoastră despre acest lucru şi vă va explica riscurile şi beneficiile tratamentului dumneavoastră.

Spuneţi imediat medicului dumneavoastră dacă observaţi vreuna dintre următoarele:
- Semne de infecţie, cum sunt durerile în gât şi temperatura crescută
- Învineţire sau sângerare anormală
- Oboseală extremă
- Vărsături sau diaree persistentă sau severă
- Reacţie alergică severă - puteţi manifesta o erupţie bruscă pe piele, umflare a mâinilor, labelor picioarelor, gleznelor, feţei, buzelor, gurii sau gâtului (care poate provoca dificultăţi la înghiţire sau la respiraţie) şi puteţi simţi că o să leşinaţi
- Îngălbenire a pielii şi a ochilor din cauza problemelor la ficat
- Semne de probleme la nivelul creierului sau nervilor, cum sunt dureri de cap, afectare a vederii, convulsii, confuzie, letargie sau amorţire şi furnicături la nivelul feţei.
- Probleme grave cu ficatul cauzate de obstrucția vaselor sanguine hepatice (boala veno-ocluzivă [BVO] sau sindromul Budd-Chiari), cu distrugerea celulelor hepatice, care pot pune viața în pericol. Dacă se suspectează aceste complicații, medicul dumneavoastră va decide tratamentul adecvat pentru dumneavoastră.

Toate acestea sunt reacţii adverse grave. Este posibil să aveţi nevoie de asistenţă medicală de urgenţă.

Pot să apară și următoarele reacții adverse:

Frecvente (pot afecta până la 1 din 10 persoane):

- Scăderea numărului celulelor roşii din sânge (anemie), scăderea numărului celulelor albe din sânge (leucopenie) și/sau scăderea numărului trombocitelor din sânge (trombocitopenie). Modificările numărului de globule din sânge sunt dependente de doză şi pot să apară mai târziu, valorile cele mai scăzute apar adesea abia după 3 până la 4 săptămâni.
- Pierdere a poftei de mâncare (anorexie), greață şi vărsături (toate aceste reacţii adverse pot fi severe)

Mai puțin frecvente (pot afecta până la 1 din 100 persoane):
- Cădere a părului (alopecie)
- Creştere a colorării pielii (hiperpigmentare)
- Creştere a sensibilităţii pielii dumneavoastră la lumina soarelui (fotosensibilitate)
- Simptome similare gripei, însoţite de epuizare, frisoane, febră şi dureri musculare. Aceste simptome pot să apară în timpul administrării medicamentului sau după un număr de zile de la administrare. Acestea pot să reapară la următoarea administrare de dacarbazină.
- Infecţii.

Rare (pot afecta până la 1 din 1000 persoane):
- Scădere a numărului tuturor globulelor din sânge (pancitopenie)
- Scădere severă a numărului de granulocite, un tip special de globule albe din sânge (agranulocitoză)
- Reacţie alergică severă (reacţie anafilactică) care duce, de exemplu, la scăderea tensiunii arteriale, umflare a mâinilor, picioarelor, gleznelor, feţei, buzelor, gurii şi gâtului, care poate provoca dificultăți la înghiţire sau la respiraţie, puls rapid, urticarie şi mâncărimi generalizate sau înroşire a pielii
- Dureri de cap
- Afectare a vederii
- Confuzie
- Letargie
- Crize (convulsii)
- Senzaţie anormală la nivelul feţei (parestezie facială), amorţire şi înroşire a feţei la scurt timp după injecție
- Diaree
- Creştere a valorilor enzimelor de la nivelul ficatului
- Afectare a funcţiei rinichilor
- Înroşire a pielii (eritem)
- Erupţii pe piele (exantem maculopapular)
- Erupţie pe piele însoțită de mâncărimi (urticarie)
- Iritaţie la locul administrării

Dacă acest medicament este administrat accidental în ţesut din jurul venei, acest lucru poate provoca durere şi distrugerea ţesutului.

Puteţi manifesta unul sau mai multe dintre aceste simptome.
Dacă apar reacţii adverse, adresați-vă medicului sau farmacistului.

Raportarea reacţiilor adverse
Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacţii adverse nemenţionate în acest prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct la
Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478- RO
e-mail: adr@anm.ro
Website: www.anm.ro
Raportând reacţiile adverse, puteţi contribui la furnizarea de informaţii suplimentare privind siguranţa acestui medicament.

5. Cum se păstrează Dacarbazină Accord

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie și flacon după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra flaconul în cutie, pentru a fi protejat de lumină. Soluțiile reconstituite trebuie, de asemenea, protejate de lumină.

Soluția reconstituită de Dacarbazină Accord
S-a demonstrat că soluțiile proaspăt preparate (reconstituite) de Dacarbazină Accord sunt stabile timp de 48 de ore la 2–8°C, protejate de lumină, și timp de 1 oră la 25°C, protejate de lumină. Din punct de vedere microbiologic, medicamentul trebuie utilizat imediat. Dacă nu se utilizează imediat, durata și condițiile de păstrare înainte de utilizare sunt responsabilitatea utilizatorului și, în mod normal, nu ar trebui să depășească 24 de ore la 2–8°C, cu excepția cazului în care reconstituirea a avut loc în condiții aseptice controlate și validate.

Soluția reconstituită și diluată suplimentar de Dacarbazină Accord
Soluția reconstituită și diluată suplimentar de Dacarbazină Accord a fost supusă unor teste de stabilitate timp de 2 ore la 25°C, în cazul soluției reconstituite și diluate suplimentar păstrate în recipiente din polietilenă, și timp de 24 de ore la 2-8°C, protejată de lumină, atât în recipiente din polietilenă, cât și în flacoane din sticlă. Din punct de vedere microbiologic, soluția reconstituită și diluată suplimentar trebuie utilizată imediat.

Dacarbazină Accord este numai pentru o singură utilizare.

Orice cantitate de conținut rămasă după utilizare trebuie eliminată de către medicul dumneavoastră, la fel ca și soluțiile al căror aspect vizual s-a modificat. Soluția diluată pentru perfuzie trebuie inspectată vizual de către medicul dumneavoastră și trebuie utilizate numai soluții limpezi, practic lipsite de particule.

MEDICAMENTELE EXPIRATE ȘI/SAU NEUTILIZATE TREBUIE RETURNATE LA SPITALE PUBLICE SAU PRIVATE.

6. Conţinutul ambalajului şi alte informaţii

Ce conține Dacarbazină Accord

- Substanța activă este este dacarbazina (sub formă de citrat de dacarbazină).

Fiecare flacon unidoză de Dacarbazină Accord 200 mg conţine dacarbazină 200 mg, sub formă de citrat de dacarbazină.
După reconstituire Dacarbazină Accord conține dacarbazină 10 mg/ml.
- Celelalte componente sunt acid citric (E330) și manitol (E421).

Cum arată Dacarbazină Accord și conţinutul ambalajului

Dacarbazină Accord 200 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă este o pulbere sau un aglutinat de culoare albă sau galben deschis.

Dacarbazină Accord 200 mg este disponibil sub formă de pulbere sterilă pentru soluție injectabilă/perfuzabilă, în flacoane unidoză din sticlă brună de 20 ml (tip I, Ph.Eur.), închise cu dop din cauciuc butilic și sigilat cu capsă din aluminiu și un capac de protecție detasabil din plastic de culoare verde. Fiecare flacon este învelit într-o husă protectoare din plastic pentru a preveni scurgerea conținutului în caz de spargere.

Fiecare cutie de Dacarbazină Accord conţine 1 sau 10 flacoane.

Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

Deţinătorul autorizaţiei de punere pe piaţă şi fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Ul. Taśmowa 7, Warszawa 02-677, Polonia

Fabricanți
Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.
Ul. Lutomierska 50, Pabianice 95-200, Polonia

Laboratori Fundacio Dau
C/ C, 12-14 Pol. Ind.
Zona Franca,
Barcelona 08040, Spania

Accord Healthcare Single Member S.A.
64th Km National Road Athens, Lamia, Schimatari, 32009, Grecia

Acest medicament este autorizat în Statele Membre ale Spaţiului Economic European sub următoarele denumiri comerciale:

Stat membru	**Denumire comercială**
Germania	Dacarbazine Accord 200 mg/vial pulver zur Herstellung einer Injektions-/Infusionslösung
Cipru	Dacarbazine Accord 200 mg/vial
Italia	Dacarbazina Accord
Spania	Dacarbazina Accord 200 mg polvo para solución inyectable y para perfusión EFG
Polonia	Dacarbazine Accord
România	Dacarbazină Accord 200 mg pulbere pentru soluţie injectabilă/perfuzabilă
Slovenia	Dakarbazin Accord 200 mg prašek za raztopino za injiciranje/infundiranje
Ungaria	Dacarbazine Accord 200 mg por oldatos injekcióhoz/infúzióhoz

Acest prospect a fost aprobat în Noiembrie 2026.

Următoarele informaţii sunt destinate numai profesioniştilor din domeniul sănătăţii:

Recomandări privind manipularea în condiții de siguranță
Dacarbazina este un agent antineoplazic și trebuie manipulată conform procedurilor standard aplicabile citostaticelor cu efecte mutagene, carcinogene și teratogene. Înainte de începerea tratamentului, trebuie consultate ghidurile locale privind citostaticele.

Dacarbazina trebuie deschisă numai de personal instruit și, la fel ca în cazul tuturor agenților citotoxici, trebuie luate măsuri de precauție pentru a evita expunerea personalului. În general, manipularea medicamentelor citotoxice trebuie evitată în timpul sarcinii. Prepararea soluției pentru administrare trebuie efectuată într-o zonă de manipulare desemnată și lucrând deasupra unei tăvi lavabile sau a unei hârtii absorbante de unică folosință cu suport din plastic.
Este necesară purtarea unor ochelari de protecţie adecvaţi, a mănuşilor de unică folosinţă, a măştii faciale şi a unui şorţ de unică folosinţă. Seringile şi seturile de perfuzie trebuie asamblate cu atenţie pentru a evita scurgerile (se recomandă utilizarea de conectoare de tip Luer lock).

La finalizare, orice suprafață expusă trebuie curățată temeinic, iar mâinile și fața trebuie spălate.

În cazul vărsării, operatorii trebuie să își pună mănuși, măști de protecție, ochelari de protecție și șorț de unică folosință și să șteargă materialul vărsat cu un material absorbant pus la dispoziție în zona respectivă în acest scop. Zona trebuie apoi curățată, iar toate materialele contaminate trebuie transferate într-o pungă sau coș pentru deșeuri citotoxice sau sigilate pentru incinerare.

Prepararea pentru administrare intravenoasă
Soluțiile de dacarbazină se prepară imediat înainte de utilizare.

Dacarbazina este sensibilă la expunerea la lumină. În timpul administrării, recipientul de perfuzie și setul de perfuzie trebuie protejate de expunerea la lumina zilei, de exemplu prin utilizarea unor seturi de perfuzie din PVC rezistente la lumină. Seturile de perfuzie obișnuite trebuie învelite, de exemplu, în folii rezistente la radiațiile UV.

Prepararea Dacarbazină Accord 200 mg:
Se transferă aseptic 20 ml de apă pentru preparate injectabile în flacon și se agită până se obține o soluție. Această soluție proaspăt preparată, conținând dacarbazină 10 mg/ml (densitatea soluției: ρ = 1,007 g/ml), se administrează sub formă de injecție lentă.

Pentru prepararea Dacarbazină Accord 200 mg pentru perfuzie intravenoasă, soluția proaspăt preparată se diluează în continuare cu 200 – 300 ml de soluție de clorură de sodiu 0,9 % sau soluție de glucoză 5 % pentru perfuzie.
Această soluție se administrează sub formă de perfuzie de scurtă durată pe o perioadă cuprinsă între 15-30 minute.

Dacarbazină Accord 200 mg este numai pentru o singură utilizare.

Soluția diluată pentru perfuzie trebuie inspectată vizual și trebuie utilizate numai soluțiile limpezi, practic lipsite de particule. Nu utilizați soluția dacă sunt prezente particule.
Orice soluție al cărei aspect vizual s-a modificat trebuie eliminată.

Orice medicament neutilizat sau deșeu trebuie eliminat în conformitate cu cerințele locale.