

Prospect: Informații pentru utilizator**Meclon 40 mg/g + 200 mg/g cremă vaginală**
clotrimazol + metronidazol

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au aceleași semne de boală ca dumneavoastră.
- Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. Vezi pct. 4.

Ce găsiți în acest prospect

1. Ce este Meclon cremă vaginală și pentru ce se utilizează
2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meclon cremă vaginală
3. Cum să utilizați Meclon cremă vaginală
4. Reacții adverse posibile
5. Cum se păstrează Meclon cremă vaginală
6. Conținutul ambalajului și alte informații

1. Ce este Meclon cremă vaginală și pentru ce se utilizează

1 g Meclon cremă vaginală conține 40 mg clotrimazol și 200 mg metronidazol.

Meclon cremă vaginală este indicat în tratamentul vaginitei cervicale și vulvo-vaginitei determinate de *Trichomonas vaginalis*, chiar și în cazurile în care germele se asociază cu *Candida albicans*, *Gardnerella vaginalis* și alți germeni sensibili.

De asemenea, Meclon cremă vaginală se poate utiliza ca tratament profilactic de către partener.

2. Ce trebuie să știți înainte să utilizați Meclon cremă vaginală**Nu utilizați Meclon cremă vaginală:**

- dacă sunteți alergic la clotrimazol și metronidazol sau la oricare dintre celelalte componente ale acestui medicament (enumerat la pct. 6).

Atenționări și precauții

Înainte să utilizați Meclon cremă vaginală, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Se recomandă evitarea tratamentului cu Meclon cremă vaginală în timpul menstruației.

În cazul asocierii metronidazolului administrat pe cale orală, se recomandă să se ia în considerație contraindicațiile, precauțiile, atenționările și reacțiile adverse ale acestui medicament.

Meclon cremă vaginală împreună cu alte medicamente

Spuneți medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă utilizați, ați utilizat recent sau s-ar putea să utilizați orice alte medicamente.

Nu au fost raportate interacțiuni.

Sarcina și alăptarea

Dacă sunteți gravidă sau alăptați, credeți că ați putea fi gravidă sau intenționați să rămâneți gravidă, adresați-vă medicului sau farmacistului pentru recomandări înainte de a lua acest medicament.

În timpul sarcinii și alăptării medicamentul trebuie utilizat numai dacă este absolut necesar, sub supraveghere medicală.

Conducerea vehiculelor și folosirea utilajelor

Meclon cremă vaginală nu are nici o influență asupra capacității de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Meclon cremă vaginală conține p-Hidroxibenzoat de metil sodic, P-Hidroxibenzoat de propil sodic și poate provoca reacții alergice (chiar întârziate).

3. Cum să utilizați Meclon cremă vaginală

Utilizați întotdeauna acest medicament exact așa cum v-a spus medicul dumneavoastră sau farmacistul. Discutați cu medicul dumneavoastră sau cu farmacistul dacă nu sunteți sigur.

În cazul în care medicul nu recomandă altfel, conținutul unui aplicator se introduce profund în vagin, o dată pe zi, preferabil seara la culcare. Medicamentul se va aplica cel puțin 6 zile consecutiv.

În tricomoniază, pentru creșterea eficacității tratamentului se recomandă asocierea de metronidazol administrat pe cale orală la femeia neînsărcinată și la partenerul acesteia.

Instrucțiuni privind pregătirea produsului medicamentos în vederea administrării și manipularea sa

1. Se deschide tubul folosind vârful ascuțit al aplicatorului.
2. Se înșurubează aplicatorul pe tubul deschis (figura 1).
3. Stoarceți tubul până ce aplicatorul se umple cu cremă (figura 2).
4. Se îndepărtează aplicatorul de pe tub și se introduce profund în vagin (figura 3).
5. Se apasă pistonul până când aplicatorul se golește complet (figura 3).




Figura 1

Figura 2

Figura 3

Utilizarea la copii

Meclon este contraindicat la copii.

Dacă utilizați mai mult Meclon decât trebuie

Dacă ați utilizat mai mult Meclon sau dacă altcineva a utilizat accidental Meclon, discutați cu medicul dumneavoastră.

Dacă uitați să utilizați Meclon

Utilizați-l imediat ce v-ați amintit. Nu folosiți o doză dublă pentru a compensa doza uitată.

Dacă aveți orice întrebări suplimentare cu privire la acest medicament, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

4. Reacții adverse posibile

Ca toate medicamentele, acest medicament poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Datorită absorbției slabe a metronidazolului și clotrimazolului după administrare topică, nu sunt de așteptat reacții adverse sistemice.

Ocazional, pot să apară fenomene de iritație locală, care necesită rareori întreruperea tratamentului. Eritemul cutanat care apare ocazional poate necesita întreruperea administrării.

Când apar reacții adverse, tratamentul cu Meclon cremă vaginală trebuie întrerupt.

Raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare, ale cărui detalii sunt publicate pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>. Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

5. Cum se păstrează Meclon cremă vaginală

Nu lăsați acest medicament la vederea și îndemâna copiilor.

Nu sunt necesare condiții speciale pentru păstrare.

Nu utilizați acest medicament după data de expirare înscrisă pe cutie, după EXP. Data de expirare se referă la ultima zi a lunii respective.

Nu aruncați niciun medicament pe calea apei sau a reziduurilor menajere. Întrebați farmacistul cum să aruncați medicamentele pe care nu le mai folosiți. Aceste măsuri vor ajuta la protejarea mediului.

6. Conținutul ambalajului și alte informații

Ce conține Meclon cremă vaginală

- Substanțele active sunt: clotrimazol și metronidazol. 100 g cremă vaginală conțin clotrimazol 4 g, metronidazol 20 g
- Celelalte componente sunt: parafină lichidă, etilenglicol și polioxietilenglicol palmitostearat, p-Hidroxibenzoat de metil sodic, p-Hidroxibenzoat de propil sodic, apă purificată.

Cum arată Meclon cremă vaginală și conținutul ambalajului

Cutie cu un tub din aluminiu închis cu capac de polietilenă albă, conținând 30 g cremă vaginală și 6 aplicatoare din polipropilenă.

Deținătorul autorizației de punere pe piață și fabricantul

Deținătorul autorizației de punere pe piață

ALFASIGMA S.p.A.

Via Ragazzi del '99, 5

40133, Bologna (BO), Italia

Fabricantul

DOPPEL FARMACEUTICI S.R.L.

Via Martiri Delle Foibe, 1

29016 Cortemaggiore - Piacenza, Italia

Acest prospect a fost revizuit în Octombrie, 2020.

Alte surse de informații

Informații detaliate privind acest medicament sunt disponibile pe web-site-ul Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale <http://www.anm.ro/>