

## REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI

### 1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI

Desloratadină Terapia 5 mg comprimate filmate

### 2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ

Fiecare comprimat filmat conține desloratadină 5 mg.

Excipient cu efect cunoscut:

Fiecare comprimat filmat conține izomalt (E953) 31,5 mg.

Pentru lista tuturor excipienților, vezi pct. 6.1.

### 3. FORMA FARMACEUTICĂ

Comprimate filmate

Desloratadină Terapia 5 mg comprimate filmate sunt comprimate filmate rotunde, biconvexe, de culoare albastră, cu un diametru de aproximativ 6,5 mm.

### 4. DATE CLINICE

#### 4.1 Indicații terapeutice

Desloratadină Terapia este indicat la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste pentru ameliorarea simptomelor asociate cu:

- rinita alergică (vezi pct. 5.1)
- urticaria (vezi pct. 5.1)

#### 4.2 Doze și mod de administrare

##### Doze

*Adulți și adolescenți (cu vârsta de 12 ani și peste)*

Doza recomandată de desloratadină este de un comprimat o dată pe zi.

Rinita alergică intermitentă (prezența simptomelor timp de mai puțin de 4 zile pe săptămână sau mai puțin de 4 săptămâni) trebuie abordată terapeutic în conformitate cu evaluarea antecedentelor bolii pacientului, iar tratamentul trebuie întrerupt după ce simptomele s-au remis și va fi reinițiat odată cu reapariția lor.

În rinita alergică persistentă (prezența simptomelor timp de 4 zile sau mai mult pe săptămână și mai mult de 4 săptămâni), se poate propune pacienților tratamentul continuu pe durata perioadelor de expunere la alergeni.

##### *Copii și adolescenți*

Există o experiență limitată în studiile clinice referitoare la eficacitatea utilizării desloratadinei la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani (vezi pct. 4.8 și 5.1).

Nu a fost stabilită siguranța și eficacitatea Desloratadină Terapie 5 mg comprimate filmate la copii cu vârsta sub 12 ani.

#### Mod de administrare

Administrare orală.

Doza poate fi luată cu sau fără alimente.

### **4.3 Contraindicații**

Hipersensibilitate la substanța activă, la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1 sau la loratadină.

### **4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare**

#### Insuficiența renală

În caz de insuficiență renală severă, Desloratadină Terapie trebuie utilizată cu prudență (vezi pct. 5.2).

#### Convulsii

Desloratadina trebuie administrată cu precauție la pacienții cu antecedente medicale sau familiale de crize convulsive, în special la copii mici (vezi pct.4.8), aceștia fiind mai susceptibili de a dezvolta noi crize convulsive în timpul tratamentului cu desloratadină. Personalul medical poate lua în considerare întreruperea tratamentului cu desloratadină la pacienții care prezintă o criză convulsivă în timpul tratamentului.

Acest medicament conține izomalt. Pacienții cu afecțiuni ereditare rare de intoleranță la fructoză nu trebuie să utilizeze acest medicament.

### **4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune**

În studiile clinice cu desloratadină comprimate administrate concomitent cu eritromicină sau ketoconazol nu au fost observate interacțiuni relevante clinic (vezi pct. 5.1).

#### Copii și adolescenți

Au fost efectuate studii privind interacțiunile numai la adulți.

Într-un studiu clinic farmacologic, desloratadina administrată concomitent cu alcoolul etilic nu a potențat efectele alcoolului etilic de diminuare a performanțelor (vezi pct. 5.1). Cu toate acestea, au fost raportate cazuri de intoleranță la alcool și intoxicație în timpul utilizării după punerea pe piață. De aceea, se recomandă prudență în cazul administrării concomitente cu alcool.

### **4.6 Fertilitatea, sarcina și alăptarea**

#### Sarcina

Conform unui număr mare de date privind femeile gravide (peste 1000 de rezultate obținute din sarcini), nu s-au evidențiat efecte malformative sau efecte toxice fetale/neonatale ale desloratadinei. Studiile la animale nu au evidențiat efecte dăunătoare directe sau indirecte asupra funcției de reproducere (vezi pct 5.3). Ca măsură de precauție, este de preferat să se evite utilizarea Desloratadină Terapie în timpul sarcinii.

#### Alăptarea

Desloratadina a fost identificată la nou-născuții/sugarii alăptați de femei tratate. Efectul desloratadinei asupra nou-născuților/sugarilor este necunoscut. Trebuie să se aibă în vedere dacă să se întrerupă alăptarea sau să se întrerupă /să se abțină de la terapia cu Desloratadină Terapie ținând cont de beneficiul alăptării pentru copil și beneficiul tratamentului pentru femeie.

### Fertilitatea

Nu există date disponibile cu privire la fertilitatea masculină și feminină.

## **4.7 Efecte asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje**

Desloratadină Terapia nu are nicio influență sau are influență neglijabilă asupra capacității de a conduce vehicule și de a folosi utilaje, pe baza studiilor clinice. Pacienții trebuie să fie informați că majoritatea oamenilor nu prezintă somnolență.

Cu toate acestea, așa cum există variații individuale ca răspuns la toate medicamentele, se recomandă ca pacienții să fie sfătuiți să nu se angajeze în activități care necesită vigilență, cum ar fi conducerea unui vehicul sau folosirea utilajelor, până când nu au stabilit propriul lor răspuns la medicament.

## **4.8 Reacții adverse**

### Rezumatul profilului de siguranță

În studiile clinice efectuate pentru diferite indicații, inclusiv rinita alergică și urticaria idiopatică cronică, reacțiile adverse determinate de administrarea de desloratadină în doza recomandată de 5 mg pe zi au fost raportate la un număr de pacienți cu 3% mai mare decât în cazul celor cărora li s-a administrat placebo. Cele mai frecvente reacții adverse, apărute în plus față de cele observate la pacienții cărora li s-a administrat placebo au fost oboseală (1,2%), xerostomie (0,8 %) și cefalee (0,6%).

### Copii și adolescenți

Într-un studiu clinic efectuat la 578 pacienți adolescenți, cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani, cel mai frecvent eveniment advers a fost cefaleea; aceasta a apărut la 5,9% dintre pacienții tratați cu desloratadină și la 6,9% dintre pacienții cărora li s-a administrat placebo.

### Lista tabelară a reacțiilor adverse

Frecvența reacțiilor adverse din studiile clinice raportate în plus față de placebo și alte reacții adverse raportate în perioada de după punerea pe piață sunt prezentate în tabelul de mai jos. Frecvențele sunt definite ca foarte frecvente ( $\geq 1/10$ ), frecvente ( $\geq 1/100$  și  $<1/10$ ), mai puțin frecvente ( $\geq 1/1000$  și  $<1/100$ ), rare ( $\geq 1/10000$  și  $<1/1000$ ), foarte rare ( $<1/10000$ ) și cu frecvență necunoscută (nu poate fi estimată din datele disponibile).

| <b>Clasificarea pe sisteme și organe</b> | <b>Frecvența</b>                        | <b>Reacții adverse</b>                                                                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tulburări metabolice și de nutriție      | Cu frecvență necunoscută                | Apetit crescut                                                                                                 |
| Tulburări psihice                        | Foarte rare<br>Cu frecvență necunoscută | Halucinații<br>Comportament anormal,<br>agresivitate<br>Stare depresivă                                        |
| Tulburări oculare                        | Cu frecvență necunoscută                | Uscăciune oculară                                                                                              |
| Tulburări ale sistemului nervos          | Frecvente<br>Foarte rare                | Cefalee<br>Amețeli, somnolență, insomnie,<br>hiperactivitate psihomotorie,<br>convulsii                        |
| Tulburări cardiace                       | Foarte rare<br>Cu frecvență necunoscută | Tahicardie, palpitații<br>Prelungirea intervalului QT                                                          |
| Tulburări gastro-intestinale             | Frecvente<br>Foarte rare                | Xerostomie<br>Durere abdominală, greață,<br>vărsături, dispepsie, diaree                                       |
| Tulburări hepatobiliare                  | Foarte rare                             | Creșteri ale concentrațiilor<br>plasmatică ale enzimelor<br>hepatice, creștere a<br>bilirubinemiciei, hepatită |

|                                                          |                                                          |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Cu frecvență necunoscută                                 | Icter                                                                                                                                                   |
| Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat           | Cu frecvență necunoscută                                 | Fotosensibilitate                                                                                                                                       |
| Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv | Foarte rare                                              | Mialgii                                                                                                                                                 |
| Tulburări generale și la nivelul locului de administrare | Frecvente<br>Foarte rare<br><br>Cu frecvență necunoscută | Fatigabilitate<br>Reacții de hipersensibilitate (cum sunt anafilaxie, angioedem, dispnee, prurit, erupție cutanată tranzitorie și urticarie)<br>Astenie |
| Investigații diagnostice                                 | Cu frecvență necunoscută                                 | Creștere ponderală                                                                                                                                      |

#### Copii și adolescenți

Alte reacții adverse cu o frecvență necunoscută raportate la copii și adolescenți în perioada după punerea pe piață au inclus prelungirea intervalului QT, aritmie, bradicardie, comportament anormal și agresivitate.

Un studiu observațional retrospectiv privind siguranța a indicat o incidență crescută de nou debut al convulsiilor la pacienții cu vârsta cuprinsă între 0 și 19 ani atunci când li s-a administrat desloratadină comparativ cu perioadele în care nu li s-a administrat desloratadină. La copiii cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani, creșterea absolută ajustată a fost de 37,5 (Interval de Încredere (ÎI) 95% 10,5-64,5) per 100000 persoane-ani (PA) cu o rată de fond de nou debut al convulsiilor de 80,3 per 100000 PA. La pacienții cu vârsta cuprinsă între 5 și 19 ani, creșterea absolută ajustată a fost de 11,3 (ÎI 95% 2,3-20,2) per 100000 PA cu o rată de fond de 36,4 per 100000 PA. (Vezi pct. 4.4.).

#### Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată la:

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro).

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

## **4.9 Supradozaj**

Profilul evenimentelor adverse asociate cu supradozajul, așa cum s-a observat în timpul utilizării după punerea pe piață, este similar cu cel observat la doze terapeutice, dar amplitudinea efectelor poate fi mai mare.

#### Tratament

În caz de supradozaj, trebuie avute în vedere măsurile standard pentru eliminarea substanței active neabsorbite.

Se recomandă tratament simptomatic și de susținere a funcțiilor vitale.

Desloratadina nu este eliminată prin hemodializă; nu se știe dacă este eliminată prin dializă peritoneală.

#### Simptome

Pe baza rezultatelor unui studiu clinic cu doze repetate, în care au fost administrate doze de până

la 45 mg desloratadină (de nouă ori doza terapeutică), nu s-au observat efecte relevante clinic.

#### Copii și adolescenți

Profilul evenimentelor adverse asociate cu supradozajul, așa cum s-a observat în timpul utilizării după punerea pe piață, este similar cu cel observat la doze terapeutice, dar amploarea efectelor poate fi mai mare.

## **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Grupa farmacoterapeutică: antihistaminice – antagoniști  $H_1$  pentru uz sistemic, codul ATC: R06AX27

#### Mecanism de acțiune

Desloratadina este un antagonist histaminic non-sedativ, cu acțiune de lungă durată, cu activitate antagonistă selectivă asupra receptorilor  $H_1$  periferici. După administrare orală, desloratadina blochează selectiv receptorii histaminergici  $H_1$  periferici, deoarece substanța nu pătrunde în sistemul nervos central.

Proprietățile antialergice ale desloratadinei au fost demonstrate în studii *in vitro*. Acestea includ inhibarea eliberării de citokine proinflamatorii, cum sunt IL-4, IL-6, IL-8 și IL-13 din mastocitele/bazofilele umane, precum și inhibarea exprimării moleculei de adeziune selectină-P la suprafața celulelor endoteliale. Relevanța clinică a acestor observații urmează să fie confirmată.

#### Eficacitate clinică și siguranță

Într-un studiu clinic cu doze repetate, în care au fost administrate zilnic, timp de 14 zile, doze de până la 20 mg desloratadină, nu s-a observat niciun efect cardiovascular relevant din punct de vedere statistic sau clinic. Într-un studiu clinic de farmacologie, în care desloratadina a fost administrată zilnic în doză de 45 mg (de 9 ori doza terapeutică), timp de 10 zile, nu s-a observat prelungirea intervalului QTc.

În studiile de interacțiune cu doze multiple de ketoconazol și eritromicină, nu s-au observat modificări relevante clinic ale concentrațiilor plasmatice ale desloratadinei.

#### Efecte farmacodinamice

Desloratadina nu pătrunde cu ușurință în sistemul nervos central. În studiile clinice controlate, pentru doza recomandată de 5 mg pe zi, nu s-a semnalat creșterea incidenței somnolenței, comparativ cu administrarea de placebo. În studiile clinice, desloratadina administrată în doză zilnică unică de 7,5 mg, nu a afectat performanțele psihomotorii. Într-un studiu cu doză unică efectuat la adulți, doza de 5 mg desloratadină nu a afectat determinările standard ale capacității de pilotaj, inclusiv exacerbarea stării subiective de somnolență sau activitățile legate de pilotaj.

În studiile clinice de farmacologie, administrarea concomitentă cu alcoolul etilic nu a determinat creșterea gradului de afectare a performanțelor sau accentuarea stării de somnolență, induse de alcoolul etilic. Nu au fost semnalate diferențe semnificative ale rezultatelor testelor psihomotorii între grupul căruia i s-a administrat desloratadină și cel căruia i s-a administrat placebo, chiar dacă au fost administrate cu sau fără alcool etilic.

La pacienții cu rinită alergică, desloratadina a fost eficace în ameliorarea simptomelor, cum sunt strănutul, secreția și pruritul nazal, pruritul ocular, lăcrimarea și înroșirea ochilor, precum și pruritul de la nivelul palatului. Desloratadina a controlat eficace simptomele timp de 24 ore.

### Copii și adolescenți

Eficacitatea desloratadinei administrată sub formă de comprimate nu a fost clar demonstrată în studiile efectuate la pacienți adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și 17 ani.

În plus față de clasificarea stabilită ca rinită alergică sezonieră și rinită alergică perenă, rinita alergică poate fi clasificată alternativ în rinită alergică intermitentă și rinită alergică persistentă, în funcție de durata simptomelor. Rinita alergică intermitentă se definește prin prezența simptomelor pentru mai puțin de 4 zile pe săptămână sau mai puțin de 4 săptămâni. Rinita alergică persistentă se definește prin prezența simptomelor pentru 4 zile sau mai mult pe săptămână și pe o perioadă mai mare de 4 săptămâni.

Desloratadina a fost eficientă în atenuarea simptomatologiei asociate rinitei alergice sezoniere, după cum arată scorul total din chestionarul referitor la calitatea vieții pacienților care prezintă rino-conjunctivită. Cele mai importante ameliorări s-au observat în domeniile problemelor de ordin practic și ale activităților cotidiene, care sunt limitate de aceste simptome.

Urticaria idiopatică cronică a fost studiată ca model clinic pentru condițiile urticariene, luând în considerare faptul că fiziopatologia lor este similară, indiferent de etiologie, și deoarece pacienții cronici pot fi recrutați prospectiv mai ușor. Deoarece eliberarea de histamină este un factor determinant pentru toate afecțiunile însoțite de urticarie, este de așteptat ca desloratadina să fie eficientă în asigurarea ameliorării simptomatice a altor stări caracterizate prin urticarie, în plus față de urticaria cronică idiopatică, așa cum se menționează și în ghidurile clinice.

În două studii clinice controlate cu placebo, cu o durată de șase săptămâni, efectuate la pacienți cu urticarie idiopatică cronică, desloratadina a fost eficientă în ameliorarea pruritului și micșorarea dimensiunii și a numărului de papule urticariene până la sfârșitul primului interval de administrare a medicamentului. În fiecare dintre studii, efectele de ameliorare au acoperit intervalul de 24 de ore dintre administrări. La fel ca în cazul altor studii cu antihistaminice administrate în tratamentul urticariei idiopatice cronice, puținii pacienți care nu au răspuns la terapia cu antihistaminice au fost excluși. O ameliorare a pruritului de peste 50% s-a observat la 55% dintre pacienții tratați cu desloratadină, comparativ cu 19% dintre pacienții cărora li s-a administrat placebo. Tratamentul cu desloratadină a redus semnificativ și gradul de afectare a somnului și a activităților cotidiene, măsurate pe o scală de la 1 la 4, utilizată pentru evaluarea acestor parametri variabili.

## **5.2 Proprietăți farmacocinetice**

### Absorbție

Concentrațiile plasmatice de desloratadină pot fi detectate în decurs de 30 de minute după administrare. Desloratadina se absoarbe bine, concentrația plasmatică maximă obținându-se după aproximativ 3 ore; timpul de înjumătățire plasmatică prin eliminare este de aproximativ 27 de ore. Gradul de acumulare a desloratadinei a depins de timpul de înjumătățire plasmatică (aproximativ 27 ore) și de frecvența administrării, ca doză unică zilnică. Biodisponibilitatea desloratadinei a fost proporțională cu doza, pentru intervalul de doze cuprins între 5 mg și 20 mg.

Într-un studiu de farmacocinetică în care datele demografice ale pacienților au fost comparabile cu cele ale populației generale cu rinită alergică sezonieră, 4% dintre subiecți au prezentat o concentrație plasmatică mai mare de desloratadină. Acest procent poate varia în funcție de originea etnică. Concentrația plasmatică maximă a desloratadinei a fost de aproximativ 3 ori mai mare după aproximativ 7 ore, cu un timp de înjumătățire plasmatică prin eliminare de aproximativ 89 de ore. Profilul de siguranță la acești subiecți nu a fost diferit de cel observat în cazul populației generale.

### Distribuire

Desloratadina se leagă de proteinele plasmatice în proporție moderată (83%-87%). Nu există date care să indice o acumulare relevantă clinic a medicamentului, după administrarea zilnică a desloratadinei în doză unică (5 mg până la 20 mg) timp de 14 zile.

### Metabolizare

Până în prezent nu a fost identificată enzima responsabilă de metabolizarea desloratadinei și, de aceea, nu pot fi total excluse unele interacțiuni cu alte medicamente. Studiile *in vivo* au arătat că desloratadina nu inhibă CYP3A4, iar studiile *in vitro* au arătat că medicamentul nu inhibă CYP2D6 și nu este nici substrat, nici inhibitor al glicoproteinei P.

### Eliminare

Într-un studiu clinic cu doză unică, în care s-a administrat doza de 7,5 mg desloratadină, nu s-a semnalat niciun efect al alimentelor (mic dejun hiperlipidic și hipercaloric) asupra biodisponibilității desloratadinei. În alt studiu, sucul de grapefruit nu a avut niciun efect asupra biodisponibilității desloratadinei.

### Pacienți cu insuficiență renală

Farmacocinetica desloratadinei la pacienții cu insuficiență renală cronică (IRC) a fost comparată cu cea a subiecților sănătoși într-un studiu cu doză unică și într-un studiu cu doze multiple. În studiul cu doză unică, expunerea la desloratadină a fost de aproximativ 2 și 2,5 ori mai mare la subiecții cu IRC ușoară până la moderată, respectiv severă, decât la subiecții sănătoși. În studiul cu doze multiple, starea de echilibru a fost atinsă după Ziua 11, iar expunerea la desloratadină a fost de ~1,5 ori mai mare la subiecții cu IRC ușoară până la moderată și de ~2,5 ori mai mare la subiecții cu IRC severă comparativ cu cea a subiecților sănătoși. În ambele studii, modificările expunerii ( $ASC$  și  $C_{max}$ ) desloratadinei și 3-hidroxidesloratadinei nu au fost relevante clinic.

## **5.3 Date preclinice de siguranță**

Desloratadina este principalul metabolit activ al loratadinei. Studiile non-clinice realizate cu desloratadină și loratadină au demonstrat că nu există diferențe calitative sau cantitative ale profilului de toxicitate între desloratadină și loratadină la valori comparabile de expunere la desloratadină.

Datele non-clinice referitoare la desloratadină nu au evidențiat niciun risc special pentru om pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea după doze repetate, genotoxicitatea, carcinogenitatea, toxicitatea asupra funcției de reproducere și a dezvoltării. Lipsa potențialului carcinogen a fost demonstrată în studii efectuate cu desloratadină și loratadină.

## **6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE**

### **6.1 Lista excipienților**

#### Nucleul comprimatului:

Izomalț (E953)  
Amidon pregelatinizat de porumb  
Celuloză microcristalină  
Oxid de magneziu greu  
Hidroxipropilceluloză  
Crospovidonă (tip A)  
Stearat de magneziu

#### Filmul comprimatului:

Polivinil alcool  
Dioxid de titan (E 171)  
Macrogol PEG 3350  
Talc  
Indigo carmin lac de aluminiu (E 132)

## **6.2 Incompatibilități**

Nu este cazul.

## **6.3 Perioada de valabilitate**

3 ani.

## **6.4 Precauții speciale pentru depozitare**

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de umiditate.

## **6.5 Natura și conținutul ambalajului**

Desloratadină Terapie 5 mg comprimate filmate este ambalat în blistere din PCTFE-PVC/Al. Cutie cu 7, 10, 15, 20, 21, 28, 30, 50, 90, 100 comprimate filmate. Este posibil ca nu toate mărimile de ambalaj să fie comercializate.

## **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor**

Fără cerințe speciale.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Terapie SA  
Str. Fabricii nr. 124, Cluj Napoca  
România

## **8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

10520/2018/01-10

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Autorizare – Martie 2012

Data ultimei reînnoiri a autorizației: Ianuarie 2018

## **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Iulie 2024