

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR PRODUSULUI****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml soluție injectabilă

**2. COMPOZIȚIA CALITATIVĂ ȘI CANTITATIVĂ**

1 ml de soluție injectabilă conține clorhidrat de articaină 40 mg și adrenalină 5 micrograme (sub formă de tartrat de adrenalina).

Fiecare cartuș de 1,8 ml de soluție injectabilă conține clorhidrat de articaină 72 mg și adrenalină 9 micrograme (sub formă de tartrat de adrenalina).

Excipienti cu efect cunoscut: metabisulfit de sodiu (E223), clorură de sodiu, acid citric monohidrat., ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml conține sodiu 0,83 mg per 1 ml de soluție, adică 1,5 mg/1,8 ml.

Pentru lista tuturor excipientilor, vezi pct. 6.1.

**3. FORMA FARMACEUTICĂ**

Soluție injectabilă.

Soluția este un lichid limpede, neopalescent, incolor, cu un pH cuprins între 3,0 și 5,0. Osmolalitatea soluției este de aproximativ 290 mOsm/kg.

Soluția nu prezintă particule vizibile.

**4. DATE CLINICE****4.1 Indicații terapeutice**

Anestezie locală și loco-regională în intervențiile stomatologice.

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml, este indicat la adulți, adolescenți și copii cu vârstă peste 4 ani (sau cu greutate corporală începând de la 20 kg ).

**4.2 Doze și mod de administrare**

Numai pentru utilizare profesională de către medici sau medici dentiști

**Doze**

Pentru toate grupele de pacienți, trebuie utilizată cea mai mică doză care asigură anestezie eficace. Dozele necesare trebuie determinate în mod individual.

Pentru o procedură de rutină, doza normală pentru pacienții adulți este de 1 cartuș, dar o cantitate mai mică decât conținutul unui cartuș poate fi suficientă pentru anestezia eficace. Conform deciziei medicului stomatolog, pot fi necesare mai multe cartușe pentru proceduri mai extinse, fără a depăși doza maximă recomandată.

Pentru majoritatea intervențiilor stomatologice, se preferă utilizarea ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml.

Pentru intervenții stomatologice mai complexe, cum sunt cele care necesită hemostază pronunțată, se preferă utilizarea ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml.

**Utilizarea concomitentă a sedativelor pentru a reduce anxietatea pacientului:**

Doza maximă sigură de anestezice locale poate fi redusă la pacienții sedați, datorită unui efect cumulativ asupra deprimării sistemului nervos central (vezi pct. 4.5).

**• Adulți și adolescenți (cu vârsta cuprinsă între 12 și 18 ani)**

La adulți și adolescenți, doza maximă de articaină este de 7 mg/kg, cu o doză maximă absolută de articaină de 500 mg. Doza maximă de articaină de 500 mg corespunde dozei recomandate la un adult sănătos, cu o greutate corporală de peste 70 kg.

Tabelul de mai jos prezintă doza maximă recomandată:

Greutatea corporală a pacientului (kg)	Doza maximă de clorhidrat de articaină (mg)	Doza de adrenalină (mg)	Volumul total (ml) și numărul echivalent de cartușe (1,8 ml)
40	280	<u>0,035</u>	7,0 (3,9 cartușe)
50	350	<u>0,044</u>	8,8 (4,9 cartușe)
60	420	<u>0,053</u>	10,5 (5,8 cartușe)
70 sau peste	490	<u>0,061</u>	12,3 (6,8 cartușe)

**• Copii (cu vârsta cuprinsă între 4 și 11 ani)**

Siguranța ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml, la copii cu vârsta de 4 ani și mai mică nu a fost stabilită. Nu sunt disponibile date.

Cantitatea injectabilă trebuie determinată în funcție de vârsta și greutatea corporală a copilului și de amploarea intervenției chirurgicale. Doza medie eficace de articaină este 2 mg/kg pentru intervenții simple și 4 mg/kg pentru intervenții complexe. Trebuie utilizată doza cea mai mică care oferă anestezie dentară eficace. La copiii cu vârsta de 4 ani (sau începând cu o greutate corporală de 20 kg) și peste, doza maximă de articaină este de 7 mg/kg, cu o doză maximă absolută de articaină de 385 mg pentru un copil sănătos cu greutate corporală de 55 kg.

Tabelul de mai jos prezintă doza maximă recomandată:

Greutatea corporală a pacientului (kg)	Doza maximă de clorhidrat de articaină (mg)	Doza de adrenalină (mg)	Volumul total (ml) și numărul echivalent de cartușe (1,8 ml)
20	140	<u>0,018</u>	3,5 (1,9 cartușe)
30	210	<u>0,026</u>	5,3 (2,9 cartușe)
40	280	<u>0,035</u>	7,0 (3,9 cartușe)
55	385	<u>0,048</u>	9,6 (5,3 cartușe)

**• Grupe speciale de pacienți**

**Vârstnici și pacienți cu tulburări renale**

Din cauza lipsei datelor clinice, trebuie luate măsuri de precauție speciale pentru a se administra cea mai mică doză care asigură anestezie eficace la vârstnici și pacienți cu tulburări renale (vezi pct. 4.4 și 5.2).

Pot să apară concentrații plasmatici crescute de medicament la acești pacienți, în special după utilizarea repetată. În caz de necesitate a reinjectării, pacientul trebuie monitorizat cu strictețe, pentru a identifica orice semn de supradozaj relativ (vezi pct. 4.9).

#### Pacienți cu insuficiență hepatică

Trebuie luate măsuri de precauție speciale pentru a se administra cea mai mică doză care duce la anestezie eficace la pacienții cu insuficiență hepatică, în special după utilizarea repetată, deși 90% din articaină este inițial inactivată de esteraze plasmatici nespecifice la nivelul țesutului și în sânge.

#### Pacienți cu deficit de colinesterază plasmatică

Pot apărea concentrații plasmatici crescute de medicament la pacienții cu deficit de colinesterază sau aflați în tratament cu inhibitori ai acetilcolinesterazei, întrucât medicamentul este inactivat în proporție de 90% de către esterazele plasmatici, vezi pct. 4.4 și 5.2. Prin urmare, trebuie utilizată doza cea mai mică care asigură anestezie eficace.

#### Mod de administrare

Infiltrare și administrare perineurală în cavitatea bucală.

Anestezicele locale trebuie injectate cu precauție atunci când există o inflamație și/sau infecție la nivelul locului de injectare. Viteza de injectare trebuie să fie foarte scăzută (1 ml/minut).

#### *Precauții care trebuie luate înaintea manipulării sau administrării medicamentului*

Acest medicament trebuie utilizat numai de către sau sub supravegherea medicilor sau medicilor stomatologi instruși suficient și familiarizați cu diagnosticul și tratamentul toxicității sistemice. Disponibilitatea echipamentului adecvat de resuscitare și a medicației adecvate trebuie să fie asigurate înainte de inducerea anesteziei regionale cu anestezice locale, pentru a se permite tratamentul rapid al oricărui urgență respiratorie și cardiovascular. Starea conștiinței pacientului trebuie monitorizată după fiecare injectare de anestezic local.

Atunci când ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml, este utilizat pentru infiltrări sau anestezie regională în bloc, injectarea trebuie efectuată întotdeauna lent și cu aspirație prealabilă.

Pentru instrucțiuni privind manipularea medicamentului înainte de administrare, vezi pct. 6.6.

### **4.3 Contraindicații**

- Hipersensibilitate la articaină (sau la orice agent anestezic local de tip amidic), la adrenalină sau la oricare dintre excipienții enumerați la pct. 6.1.
- Pacienți cu epilepsie necontrolată de tratament.

### **4.4 Atenționări și precauții speciale pentru utilizare**

Înainte de utilizarea acestui medicament, este important să:

- vă interesați de terapiile actuale și de istoricul pacientului;
- mențineți contactul verbal cu pacientul;
- aveți la îndemână echipament de resuscitare (vezi pct. 4.9).

#### **Atenționări speciale**

Acest medicament trebuie utilizat cu precauție deosebită la pacienții cu următoarele afecțiuni și trebuie luată în considerare amânarea intervenției chirurgicale stomatologice dacă afecțiunea este severă și/sau instabilă.

#### Pacienți cu afecțiuni cardiovasculare:

Trebuie utilizată cea mai mică doză care asigură anestezie eficace în caz de:

- tulburări ale formării și conducerii impulsurilor cardiaice (de exemplu, bloc atrioventricular de gradul 2 sau 3, bradicardie pronunțată)
- insuficiență cardiacă acută decompensată (insuficiență cardiacă acută congestivă)
- hipotensiune arterială
- pacienți cu tachicardie paroxistică sau aritmii absolute cu ritm cardiac rapid
- pacienți cu angină instabilă sau istoric de infarct miocardic recent (mai puțin de 6 luni)
- pacienți cu intervenție chirurgicală recentă (3 luni) de bypass al arterei coronare
- pacienți care utilizează betablocante neselective (de exemplu, propranolol) (risc de criză hipertensivă sau bradicardie severă) (vezi pct. 4.5)
- pacienți cu hipotensiune arterială necontrolată terapeutic
- 
- tratament concomitent cu antidepresive triciclice, întrucât aceste substanțe active pot intensifica efectele cardiovasculare ale adrenalinei (vezi pct. 4.5)

Acest medicament trebuie utilizat cu prudență la pacienții cu următoarele afecțiuni:

#### Pacienți cu epilepsie:

Din cauza acțiunii convulsivante, toate anestezicele locale trebuie utilizate cu foarte mare prudență.

#### Pacienți cu deficit de colinesterază plasmatică:

Un deficit de colinesterază plasmatică poate fi susținut atunci când apar semne clinice de supradozaj la doza uzuale pentru anestezie și când a fost exclusă injectarea vasculară. În acest caz, trebuie exercitată prudență la următoarea injectare și trebuie aplicată reducerea dozei.

#### Pacienți cu boală renală:

Trebuie utilizată doza cea mai mică care asigură anestezie eficace.

#### Pacienți cu boală hepatică severă:

Acet medament trebuie utilizat cu prudență, din cauza prezenței bolii hepatice, deși 90% din articaină este inițial inactivată de esteraze plasmatici nespecifice la nivelul țesutului și în sânge.

#### Pacienți cu miastenia gravis tratați cu inhibitori ai acetilcolinesterazei:

Trebuie utilizată cea mai mică doză care asigură anestezie eficace.

#### Pacienți cu porfirie:

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml trebuie utilizat la pacienții cu porfirie acută numai atunci când nu există alternative mai sigure. Trebuie luate măsurile de precauție adecvate la toți pacienții cu porfirie, întrucât acest medicament poate declansa porfuria.

#### Pacienți cu tratament concomitent cu anestezice halogenate inhalatorii:

Trebuie utilizată cea mai mică doză care duce la anestezie eficace (vezi pct. 4.5).

#### Pacienți cărora li se administrează tratament cu antiagregante plăchetare/anticoagulante:

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml, trebuie administrat cu precauție la pacienții care utilizează medicamente antiagregante plăchetare/anticoagulante sau diagnosticați cu tulburări de coagulare, din cauza riscului crescut de sânge. Riscul crescut de sânge este mai degrabă asociat cu intervenția decât cu medicamentul.

#### Pacienți vârstnici:

Pot să apară concentrații plasmaticice crescute de medicament la pacienții vârstnici, în special după utilizarea repetată. În caz de necesitate a reinjectării, pacientul trebuie monitorizat cu strictețe, pentru a identifica orice semn de supradoxaj relativ (vezi pct. 4.9).  
Prin urmare, trebuie utilizată doza cea mai mică care asigură anestezie eficace.

Utilizarea ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml soluție injectabilă în loc de ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml soluție injectabilă, trebuie luată în considerare datorită conținutului mai scăzut de adrenalină de 5 micrograme/ml, la:

- Pacienți cu boli cardiovasculare (de exemplu, insuficiență cardiacă, boală coronariană, istoric de infarct miocardic, aritmie cardiacă, hipertensiune arterială)
- Pacienți cu tulburări ale circulației cerebrale, istoric de accidente vasculare cerebrale:  
Se recomandă ca tratamentul dentar cu articaină/adrenalină să fie amânat timp de șase luni după un accident vascular cerebral, din cauza riscului crescut de accidente vasculare cerebrale recurente.
- Pacienți cu diabet zaharat necontrolat terapeutic:  
Acet medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza efectului hiperglicemiant al adrenalinei
- Pacienți cu tireotoxicoză:  
Acet medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza prezenței adrenalinei.
- Pacienți cu feocromocitom:  
Acet medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza prezenței adrenalinei.
- Pacienți cu suspiciune de glaucom cu unghi încis acut:  
Acet medicament trebuie utilizat cu precauție, din cauza prezenței adrenalinei.

Trebuie utilizată doza cea mai mică care asigură anestezie eficace.

**Acest medicament trebuie utilizat în mod sigur și eficace, în condițiile corespunzătoare:**

Adrenalină afectează circulația sanguină de la nivelul gingiilor, putând să cauzeze necroza țesutului local.

Au fost raportate cazuri foarte rare de leziuni nervoase prelungite sau ireversibile și de pierdere a simțului gustativ după analgezia blocului mandibular.

Efectele anesteziei locale pot fi reduse atunci când acest medicament este injectat într-o zonă inflamată sau infectată.

Doza poate fi de asemenea redusă în caz de hipoxie, hiperkaliemie și acidoză metabolică.

Riscul de traumatism prin mușcături (ale buzelor, obrajilor, mucoaselor și limbii) există, în special la copii; pacientul trebuie informat să evite guma de mestecat sau consumul de alimente până la reinstalarea sensibilității normale.

Acet medicament conține sodiu mai puțin de 1 mmol (23 mg) per cartuș, adică practic „nu conține sodiu”.

Datorită prezenței metabisulfitului de sodiu, medicamentul poate provoca rareori reacții de hipersensibilitate severe și bronhospasm.

Dacă există orice risc de reacție alergică, alegeti un medicament diferit pentru anestezie (vezi pct. 4.3).

**Precăuții pentru utilizare**

### *Risc asociat cu injectarea intravasculară accidentală:*

Injectarea intravasculară accidentală poate cauza cresterea bruscă a concentratiilor de adrenalină și articaină în circulația sistemică. Aceasta poate fi asociată cu reacții adverse severe, cum sunt convulsii, urmate de deprimarea sistemului nervos central și cardiorespiratorie și comă, progresând spre stop respirator și circulator.

Astfel, pentru a vă asigura că acul nu penetreză un vas de sânge în timpul injectării, trebuie efectuată aspirația înainte de injectarea medicamentului anestezic local. Cu toate acestea, absența săngelui în seringă nu garantează evitarea injectării intravasculare

### *Risc asociat cu injectarea intraneurală:*

Injectarea intraneurală accidentală poate conduce la deplasarea retrogradă a medicamentului de-a lungul nervului.

Pentru a evita injectarea intraneurală și a împiedica leziunile nervoase din blocadele nervoase, acul trebuie să fie întotdeauna retras ușor dacă pacientul resimte o senzație de soc electric în timpul injectării sau dacă injectarea este deosebit de dureroasă. În caz de leziunile nervilor prin întepare cu acul, efectul neurotoxic poate fi agravat de potențialul de neurotoxicitate chimică al articainei și de prezența adrenalinei, întrucât poate afecta irigarea sanguină perineurală și împiedică eliminarea locală a articainei.

## **4.5 Interacțiuni cu alte medicamente și alte forme de interacțiune**

### Interacțiuni cu articaina

#### Interacțiuni ce necesită precauții de utilizare:

##### **Alte anestezice locale**

Toxicitatea anestezicelor locale este cumulativă.

Doza totală a tuturor anestezicelor locale administrate nu trebuie să depășească doza maximă recomandată a medicamentelor utilizate.

##### **Sedative (deprimante ale sistemului nervos central, de exemplu, benzodiazepine, opioide):**

Dacă sunt utilizate sedative pentru a scădea anxietatea pacientului, trebuie utilizate doze reduse de anestezice, întrucât anestezicele locale, la fel ca și sedativele, sunt deprimante ale sistemului nervos central, care, în asociere, pot avea un efect cumulativ (vezi pct. 4.2).

### Interacțiuni cu adrenalina

#### Interacțiuni ce necesită precauții de utilizare:

##### **Anestezice halogenate volatile (de exemplu, halotan):**

Trebuie utilizate doze reduse ale acestui medicament, din cauza sensibilizării cordului la efectele aritmogene ale catecolaminelor: risc de aritmie ventriculară severă.

Se recomandă discuția cu medicul anestezist înainte de administrarea anestezicului local în timpul anesteziei generale.

##### **Agenți blocanți adrenergici postganglionari (de exemplu, guanadrel, guanetidină și alcaloizi din rauwolfia):**

Trebuie utilizate doze reduse ale acestui medicament, sub supraveghere medicală strictă și cu aspirație atentă, din cauza posibilității de creștere a răspunsului la vasoconstrictoare adrenergice: risc de hipertensiune arterială și alte efecte cardiovasculare.

##### **Betablocante adrenergice neselective (de exemplu, propranolol, nadolol):**

Trebuie utilizate doze reduse ale acestui medicament, din cauza posibilității de creștere a tensiunii arteriale și riscului crescut de bradicardie.

**Antidepresive triciclice (ADT) (de exemplu, amitriptilină, desipramină, imipramină, nortriptilină, maprotilină și protriptilină):**

Doza și rata de administrare ale acestui medicament trebuie reduse, din cauza unui risc crescut de hipertensiune arterială severă.

**Inhibitori COMT (inhibitori ai catecol-O-metil transferazei) (de exemplu, entacaponă, tolcaponă):**

Pot să apară aritmii, creșterea frecvenței cardiace și variații ale tensiunii arteriale.

La pacienții aflați în tratament cu inhibitori COMT trebuie să fie administrată o cantitate redusă de adrenalină în cadrul anesteziei dentare.

**Inhibitori MAO (atât A-selectivi [de exemplu, moclobemidă], cât și neselectivi [de exemplu, fenelzină, trancipromină, linezolid]):**

Dacă nu poate fi evitată administrarea concomitentă a acestor substanțe, doza și viteza de administrare a acestui medicament trebuie reduse, iar medicamentul trebuie utilizat sub supraveghere medicală strictă, din cauza posibilității de potențare a efectelor adrenalinei, care duce la risc de criză hipertensivă.

**Medicamente care cauzează aritmii (de exemplu, antiaritmice cum sunt digitalicele, chinidina):**

Doza de administrare a acestui medicament trebuie redusă din cauza riscului crescut de aritmie, atunci când se administrează concomitent pacienților adrenalină și glucozide digitalice. Se recomandă aspirarea atentă înaintea administrării.

**Medicamente ocitotice de tipul alcaloizilor din ergot (de exemplu, metisergidă, ergotamină, ergonovină):**

Utilizați acest medicament sub strictă supraveghere medicală, din cauza creșterilor aditive sau sinergice ale tensiunii arteriale și/sau răspunsului ischemic.

**Vasopresoare simpatomimetice (de exemplu, în principal cocaină, dar și amfetamine, fenilefrină, pseudoefedrină și oximetazolină):**

Există un risc de toxicitate adrenergică.

Dacă a fost utilizat orice vasopresor simpatomimetic în timpul ultimelor 24 ore, tratamentul stomatologic planificat trebuie amânat.

**Fenotiazine (și alte neuroleptice):**

A se utiliza cu precauție la pacienții care iau fenotiazine, luându-se în considerare riscul de hipotensiune arterială din cauza posibilității de inhibare a efectului adrenalinei.

#### **4.6 Sarcina și alăptarea**

##### Sarcina

Studiile la animale, efectuate cu articaină 40 mg/ml + adrenalină 10 micrograme/ml, precum și cu articaină în monoterapie, nu au evidențiat efecte dăunătoare asupra sarcinii, dezvoltării embrionare/fetale, nașterii sau dezvoltării postnatale (vezi pct. 5.3).

Studiile la animale au evidențiat că adrenalina are efecte toxice asupra funcției de reproducere, în doze mai mari decât doza maximă recomandată (vezi pct. 5.3).

Nu există experiență privind utilizarea articainei la femeile gravide, mai puțin în timpul travaliului. Adrenalină și articaina traversează bariera placentară, deși articaina face acest lucru într-o proporție mai scăzută decât alte anestezice locale. Concentrațiile serice ale articainei, măsurate la sugarii nou-născuți, au fost de aproximativ 30% din concentrațiile materne. În cazul administrării intravasculare accidentale la mamă, adrenalina poate reduce perfuzia uterină.

În timpul sarcinii, ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml trebuie administrat doar după analiza atentă a raportului beneficiu/risc.

Datorită conținutului scăzut de adrenalină, trebuie preferată utilizarea de ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml soluție injectabilă în loc de ARTIDENTAL 40 mg/ml + 10 micrograme/ml soluție injectabilă.

#### Alăptarea

Ca rezultat al scăderii rapide a concentrațiilor serice și al eliminării rapide, nu au fost găsite cantități de articaină relevante din punct de vedere clinic în laptele uman. Adrenalina trece în laptele uman, dar are de asemenea un timp de înjumătățire plasmatică prin eliminare scurtă. De obicei nu este necesară întreruperea alăptării în cazul utilizării pe termen scurt, începând cu 5 ore după anestezie.

#### Fertilitatea

Studiile la animale cu articaină 40 mg/ml + adrenalină 5 micrograme/ml nu au evidențiat efecte asupra fertilității (vezi pct. 5.3). Nu se așteaptă efecte dăunătoare asupra fertilității umane la dozele terapeutice.

### **4.7 Efecte asupra capacitatei de a conduce vehicule și de a folosi utilaje**

Asocierea de clorhidrat de articaină și tartrat de adrenalină, soluție injectabilă, poate avea o influență minoră asupra capacitatei de a conduce vehicule și de a folosi utilaje. Amețeala (inclusiv vertij, tulburări de vedere și oboseală) poate să apară ca urmare a administrării ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml (vezi pct. 4.8 al RCP). Astfel, pacienții nu trebuie să părăsească cabinetul stomatologic până când nu își recuperează capacitatele (în general în decurs de 30 de minute) în urma intervenției stomatologice..

### **4.8 Reacții adverse**

#### **a) Rezumatul profilului de siguranță**

Reacțiile adverse în urma administrării articainei/adrenalinei sunt similare celor observate cu alte anestezice amidice locale /vasoconstrictoare. Aceste reacții adverse sunt, în general, asociate cu doza. Acestea pot fi, de asemenea, determinate de hipersensibilitatea, idiosincrazia sau toleranța diminuată a pacientului. Tulburările sistemului nervos, reacțiile la nivelul locului de injectare, hipersensibilitatea, tulburările cardiace și tulburările vasculare sunt reacțiile adverse care apar cel mai frecvent. Reacțiile adverse grave sunt în general sistemic.

#### **b) Lista reacțiilor adverse sub formă de tabel**

Reacțiile adverse raportate provin din raportarea spontană, din studiile clinice și din literatură. Clasificarea frecvențelor respectă următoarea convenție: foarte frecvente ( $\geq 1/10$ ), frecvente ( $\geq 1/100$  și  $< 1/10$ ), mai puțin frecvente ( $\geq 1/1000$  și  $< 1/100$ ), rare ( $\geq 1/10000$  și  $< 1/1000$ ), foarte rare ( $< 1/10000$ ) și cu frecvență necunoscută (care nu poate fi estimată din datele disponibile).

Clasificarea MedDRA pe aparate, sisteme și organe	Frecvență	Reacții adverse
<b>Infecții și infestări</b>	Frecvente	Gingivită
<b>Tulburări ale sistemului imunitar</b>	Rare	Reacții alergice <sup>1</sup> , anafilactice/anafilactoide
<b>Tulburări psihice</b>	Rare	Nervozitate/anxietate <sup>4</sup>
	Frecvență necunoscută	Dispoziție euforică
<b>Tulburări ale sistemului nervos</b>	Frecvente	Neuropatie: Nevralgie (durere neuropatică)

		Hipoestezie/amorțeală (orală și periorală) <sup>4</sup> Hiperestezie Disestezie (orală și periorală), <i>include</i> Disgeuzie (de exemplu, gust metalic, tulburări ale gustului) Ageuzie Alodinie Termohiperestezie Cefalee
	Mai puțin frecvente	Senzație de arsură
	Rare	Tulburare a nervului facial <sup>2</sup> (paralizie și pareză) Sindrom Horner (ptoză a pleoapei, enoftalmie, mioză) Somnolență Nistagmus
	Foarte rare	Parestezie <sup>3</sup> (hipoestezie persistentă și pierdere a simțului gustativ) după blocarea nervului mandibular sau alveolar inferior
<b>Tulburări oculare</b>	Rare	Diplopie (paralizia mușchilor oculomotori) <sup>4</sup> Tulburări ale vederii (orbire temporară) <sup>4</sup> Ptoză Mioză Enoftalmie
<b>Tulburări acustice și vestibulare</b>	Rare	Hiperacuzie <sup>4</sup> Tinnitus
<b>Tulburări cardiace</b>	Frecvente	Bradicardie Tahicardie
	Rare	Palpitații
	Frecvență necunoscută	Tulburări de conducere (bloc atrioventricular)
<b>Tulburări vasculare</b>	Frecvente	Hipotensiune arterială (cu posibil colaps circulator)
	Mai puțin frecvente	Hipertensiune arterială
	Rare	Hiperemie facială
	Frecvență necunoscută	Hiperemie locală/regională Vasodilatație Vasoconstricție
<b>Tulburări respiratorii, toracice și mediastinale</b>	Rare	Bronhospasm/astm bronșic <sup>2</sup> Dispnee
	Frecvență necunoscută	Disfonie (răgușeală) <sup>1</sup>
<b>Tulburări gastro-intestinale</b>	Frecvente	Edem al limbii, buzelor, gingilor
	Mai puțin frecvente	Stomatită, glosită Greață, vârsături, diaree
	Rare	Exfoliere (desprindere)/ulceratie/a mucoasei gingivale/orale
	Frecvență necunoscută	Disfagie Edem al obrajilor Glosodinie
<b>Afecțiuni cutanate și ale țesutului subcutanat</b>	Mai puțin frecvente	Eruptie cutanată tranzitorie Prurit

	Rare	Angioedem (edem facial/lingual/labial/traheal/laringian/periorbital) Urticarie
	Frecvență necunoscută	Eritem Hiperhidroză
<b>Tulburări musculo-scheletice și ale țesutului conjunctiv</b>	Mai puțin frecvente	Durere cervicală
	Rare	Contractii musculare <sup>4</sup>
	Frecvență necunoscută	Agravare a manifestărilor neuromusculare ale sindromului Kearns-Sayre Trismus
<b>Tulburări generale și la nivelul locului de administrare</b>	Mai puțin frecvente	Durere la nivelul locului de injectare
	Rare	Exfoliere/necroză la nivelul locului de injectare Fatigabilitate, astenie (slăbiciune)/Frisoane
	Frecvență necunoscută	Inflamație locală Senzație de căldură Senzație de frig

#### c) Descrierea reacțiilor adverse selectate

<sup>1</sup> Reacțiile alergice nu trebuie confundate cu episoade de sincopă (palipații cardiace din cauza adrenaliniei).

<sup>2</sup> În urma administrării articainei în asociere cu adrenalină, a fost descrisă instalarea paraliziei faciale cu debut tardiv, după 2 săptămâni, iar afectiunea a fost neschimbată 6 luni mai târziu.

<sup>3</sup> Aceste patologii nervoase pot să apară cu simptome variate de senzații anormale. Parestezia poate fi definită ca o senzație anormală spontană, de obicei nedureroasă (de exemplu, arsură, încălzire, furnicături sau prurit), cu mult peste durata estimată a anesteziei. Cele mai multe cazuri de parestezie raportate în urma tratamentului dental sunt trecătoare și se rezolvă în decurs de zile, săptămâni sau luni.

Parestezia persistentă, în principal ca urmare a blocării nervilor de la nivelul mandibulei, este caracterizată de recuperare lentă, incompletă sau absență recuperării.

<sup>4</sup> Mai multe reacții adverse, cum sunt agitația, anxietatea/nervozitatea, tremorul, tulburările de vorbire, pot reprezenta semne de avertizare înainte de deprimarea SNC. În abordarea terapeutică a acestor semne, pacienților trebuie să li se ceară să hiperventileze și trebuie instituită supravegherea (vezi pct. 4.9 al RCP).

#### d) Copii și adolescenti

Profilul de siguranță a fost similar la copiii și adolescentii cu vîrstă cuprinsă între 4 și 18 ani, comparativ cu adulții. Cu toate acestea, lezarea accidentală a țesuturilor moi a fost observată mai frecvent, în special la copiii cu vîrstă cuprinsă între 3 și 7 ani, din cauza anesteziei prelungite a țesuturilor moi.

#### Raportarea reacțiilor adverse suspectate

Raportarea reacțiilor adverse suspectate după autorizarea medicamentului este importantă. Acest lucru permite monitorizarea continuă a raportului beneficiu/risc al medicamentului. Profesioniștii din domeniul sănătății sunt rugați să raporteze orice reacție adversă suspectată la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

#### 4.9 Supradozaj

##### Tipuri de supradozaj

Termenul „supradozaj cu anestezic local”, în sensul cel mai larg, este utilizat deseori pentru a descrie:

- supradozaj absolut,
- supradozaj relativ, de exemplu:
  - injectarea accidentală într-un vas de sânge sau
  - absorbția anormal de rapidă în circulația sistemică sau
  - întârzierea metabolizării și eliminării medicamentului.

În cazul unui supradozaj relativ, pacienții prezintă în general simptome în intervalul primelor minute. În schimb, în cazul supradozajului absolut, semnele de toxicitate, în funcție de locul de injectare, apar ulterior, după injectare.

## **Sимптомы**

Datorate unui supradozaj (absolut sau relativ), având în vedere că excitarea poate fi tranzitorie sau absentă, primele manifestări pot fi somnolenta care evoluează la inconștientă și stop respirator.

### Datorate articainei:

Simptomele sunt dependente de doză și au o severitate progresivă în ceea ce privește manifestările neurologice (presincopă, sincopă, cefalee, neliniște, agitație, stare confuzională,dezorientare, amețeală (senzație de leșin), tremor, stupore, deprimare profundă a SNC, pierdere a conștiinței, comă, convulsii (inclusiv criză convulsivă tonico-clonică), tulburare de vorbire (de exemplu, dizartrie, logoree), vertij, tulburare de echilibru (instabilitate), manifestări oculare (midriază, vedere încețoșată, tulburări de acomodare), urmate de toxicitate vasculară (paloare (locală, regională, generală)), respiratorie (apnee (stop respirator), bradipnee, tahipnee, căscat, deprimare respiratorie) și în final cardiacă (stop cardiac, deprimare miocardică).

Acidoza exacerbează efectele toxice ale anestezicelor locale

### Datorate adrenalinei:

Simptomele sunt dependente de doză și au o severitate progresivă în ceea ce privește manifestările neurologice (anxietate, agitație, presincopă, sincopă), urmate de toxicitate vasculară (paloare (locală, regională, generală)), respiratorie (apnee (stop respirator), bradipnee, tahipnee, deprimare respiratorie) și în final cardiacă (stop cardiac, deprimare miocardică).

## **Tratamentul supradozajului**

Disponibilitatea echipamentului de resuscitare și medicației respective trebuie să fie asigurate înainte de administrarea anesteziei regionale cu anestezice locale, pentru a se permite tratamentul rapid al oricărora urgențe respiratorii și cardiovasculare.

Gravitatea simptomelor supradozajului trebuie să determine medici/medicii stomatologi să urmeze protocoale care anticipatează oportunitatea asigurării permeabilității căilor respiratorii și a ventilației asistate.

Starea conștiinței pacientului trebuie monitorizată după fiecare administrare injectabilă a anestezicului local.

Dacă apar semne de toxicitate sistemică acută, injectarea anestezicului local trebuie oprită imediat.

Schimbați poziția pacientului la decubit dorsal, dacă este necesar.

Simptomele la nivelul SNC (convulsii, deprimarea SNC) trebuie tratate rapid, cu susținerea corespunzătoare a permeabilității căilor respiratorii/respirației și administrarea de medicamente anticonvulsivante.

Oxigenarea și ventilarea optime și suportul circulator, precum și tratamentul acidozei, pot preveni stopul cardiac.

Dacă apare deprimarea cardiovasculară (hipotensiune arterială, bradicardie), trebuie luat în considerare tratamentul corespunzător cu fluide intravenoase, vasopresoare și/sau agenți inotropi. În cazul copiilor, trebuie administrate doze proporționale cu vîrstă și greutatea corporală.

În cazul unui stop cardiac, trebuie inițiată imediat resuscitarea cardiopulmonară.

## **5. PROPRIETĂȚI FARMACOLOGICE**

### **5.1 Proprietăți farmacodinamice**

Grupa farmacoterapeutică: Anestezice ale sistemului nervos/locale / Anestezice, locale / Amide / Articaină, combinații

Codul ATC: N01B B58

#### Mecanism de acțiune și efecte farmacodinamice:

Articaina, un anestezic amidic local, blochează reversibil conducerea nervoasă prin intermediul unui mecanism cunoscut pe larg, observat, de obicei, și la alte anestezice amidice locale. Acesta constă în scăderea sau împiedicarea creșterii tranzitorii accentuate a permeabilității membranelor excitabile la sodiu ( $\text{Na}^+$ ), care este produsă în mod normal prin depolarizarea ușoară membranei. Aceste acțiuni duc la acțiunea anestezică. Pe măsură ce acțiunea anestezică se dezvoltă progresiv la nivelul nervului, pragul excitabilității electrice crește treptat, rata de creștere a potențialului de acțiune scade și conducerea impulsurilor este încetinită. Valoarea  $pK_a$  (constanta de aciditate) a articainei a fost estimată la 7,8.

Adrenalina, ca vasoconstrictor, acționează direct atât asupra receptorilor  $\alpha$ -, cât și asupra celor  $\beta$ -adrenergici; efectele  $\beta$ -adrenergice predomină. Adrenalina prelungesc durata efectului articainei și reduce riscul de absorbție excesivă a articainei în circulația sistemică.

#### Eficacitate și siguranță clinică:

ARTIDENTAL 40 mg/ml + 5 micrograme/ml, are o durată de instalare a efectului de 1,5-1,8 minute pentru infiltrație și de 1,4-3,6 minute pentru blocarea nervoasă.

Durata anesteziei cu articaină 40 mg/ml cu adrenalină 1:100000 este de 60 până la 75 minute pentru anestezia intrapulpară și de 180 până la 360 minute pentru anestezia la nivelul țesuturilor moi.

Durata anesteziei cu articaină 40 mg/ml cu adrenalină 1:200000 este de 45 până la 60 minute pentru anestezia intrapulpară și de 120 până la 300 minute pentru anestezia la nivelul țesuturilor moi.

Nu a fost observată nicio diferență în ceea ce privește proprietățile farmacodinamice între adulți și copii și adolescenți.

### **5.2 Proprietăți farmacocinetice**

#### **• Articaină**

Absorbție: În trei studii clinice publicate, care descriu profilul farmacocinetic al combinației dintre clorhidrat de articaină 40 mg/ml și adrenalină 10 sau 5 micrograme/ml, valorile  $T_{max}$  au fost cuprinse între 10 și 12 minute, valorile  $C_{max}$  variind între 400 și 2100 ng/ml.

În studiile clinice efectuate la copii,  $C_{max}$  a fost de 1382 ng/ml și  $T_{max}$ , de 7,78 minute în urma infiltrării unei doze de 2 mg/kg greutate corporală.

Distribuție: a fost observată legarea în proporție mare a articainei de proteinele plasmatic - legare de albumină serică umană (68,5-80,8%) și legare de  $\alpha/\beta$ -globuline (62,5-73,4%). Legarea de  $\gamma$ -globulină (8,6-23,7%) a fost mult mai scăzută. Adrenalina este un vasoconstrictor adăugat articainei cu rolul de a încetini absorbția articainei în circulația sistemică și a prelungi astfel menținerea concentrației tisulare de articaină activă. Volumul de distribuție plasmatică a fost de aproximativ 4 l/kg.

Metabolizare: Articaina este supusă hidrolizei grupului său carboxilic de către esteraze nespecifice la nivelul țesutului și în sânge. Deoarece această hidroliză este foarte rapidă, aproximativ 90% din articaină este inactivată prin această cale. Articaina este metabolizată suplimentar la nivelul microzomilor hepatici. Acidul articainic este produsul major al metabolizării articainei indușă de citocromul P450, acesta fiind metabolizat suplimentar pentru a forma glucurononoconjugațul de acid articainic.

**Eliminare:** Ca urmare a injectării dentare, timpul de înjumătărire plasmatică prin eliminare al articainei a fost de aproximativ 20-40 minute. Într-un studiu clinic, s-a observat scăderea rapidă a concentrațiilor plasmatic ale articainei și acidului articainic au scăzut rapid în urma injectării submucoase. O cantitate foarte scăzută de articaină a fost detectată în plasmă după 12 până la 24 ore de la injectare. Mai mult de 50% din doză a fost eliminată în urină, 95% sub formă de acid articainic, în interval de 8 ore de la administrare. În interval de 24 ore, aproximativ 57% (68 mg) și 53% (204 mg) din doză a fost eliminată în urină. Eliminarea renală a articainei nemodificate a reprezentat numai aproximativ 2% din eliminarea totală..

### 5.3 Date preclinice de siguranță

Datele preclinice nu au evidențiat niciun risc special pentru om la dozele terapeutice pe baza studiilor convenționale farmacologice privind evaluarea siguranței, toxicitatea cronică, toxicitatea asupra funcției de reproducere și genotoxicitatea.

La doze supraterapeutice, articaina a avut proprietăți cardiodioprimeante și poate exercita efecte vasodilatatoare.

Adrenalina manifestă efecte simpatomimetică.

Înjecțiile subcutanate cu articaină asociată cu adrenalină au indus reacții adverse începând cu dozele de 50 mg/kg și zi la şobolani și 80 mg/kg și zi la câini, după administrări zilnice repetitive, timp de 4 săptămâni. Cu toate acestea, aceste constatări au o relevanță foarte scăzută pentru utilizarea clinică în administrarea acută.

În studiile privind embriotoxicitatea articainei, nu a fost observată nicio creștere a ratei mortalității fetale sau a malformațiilor la doze zilnice, administrate pe cale intravenoasă, de până la 20 mg/kg la şobolani și 12,5 mg/kg la iepuri.

Teratogenitatea a fost observată la animalele tratate cu adrenalină numai la expunerii considerate ca fiind mult mai mari decât expunerea maximă la om, ceea ce indică o relevanță scăzută pentru utilizarea clinică. Studiile privind toxicitatea asupra funcției de reproducere, efectuate cu articaină 40 mg/ml + adrenalină 10 micrograme/ml administrate pe cale subcutanată, în doze de până la 80 mg/kg și zi, nu au evidențiat efecte dăunătoare asupra fertilității, dezvoltării embrionare/fetale sau a dezvoltării pre- și postnatale.

Nu a fost observat niciun efect genotoxic în timpul studiilor *in vitro* și *in vivo* desfășurate cu articaină în monoterapie sau într-un studiu *in vivo* desfășurat cu articaină în asociere cu adrenalină.

În urma studiilor *in vitro* și *in vivo* privind genotoxicitatea adrenalinei observațiile au fost contradictorii.

## 6. PROPRIETĂȚI FARMACEUTICE

### 6.1 Lista excipientilor

Metabisulfit de sodiu (E223)

Clorură de sodiu

Acid citric monohidrat

Acid clorhidric (pentru ajustarea pH-ului)

Hidroxid de sodiu (pentru ajustarea pH-ului)

Apă pentru preparate injectabile

### 6.2 Incompatibilități

În absența studiilor privind compatibilitatea, acest medicament nu trebuie amestecat cu alte medicamente.

### **6.3 Perioada de valabilitate**

24 luni.

### **6.4 Precauții speciale pentru păstrare**

A se păstra la temperaturi sub 30°C. A se păstra cartușul în cutie, pentru a fi protejat de lumină.

### **6.5 Natura și conținutul ambalajului**

Cartuș din sticlă incoloră neutră tip I.

Pistonul este fabricat din cauciuc bromobutilic.

Capac din aluminiu cu disc din cauciuc bromobutilic.

Cutie cu 50 x 1,8 ml cartușe cu piston plat pentru autoaspirare.

Cutie cu 50 x 1,8 ml cartușe cu piston cu cavitate pentru aspirare manuală.

Cutie cu 100 x 1,8 ml cartușe cu piston plat pentru autoaspirare.

Cutie cu 100 x 1,8 ml cartușe cu piston cu cavitate pentru aspirare manuală.

Este posibil ca nu toate mărimele de ambalaj să fie comercializate.

### **6.6 Precauții speciale pentru eliminarea reziduurilor și alte instrucțiuni de manipulare**

Pentru a se evita riscul unei infecții (de exemplu, transmiterea hepatitei), seringa și acele utilizate pentru extragerea soluției trebuie să fie întotdeauna noi și sterile.

Acet medicament nu trebuie utilizat dacă soluția este tulbure sau are modificări de culoare.

Cartușele sunt pentru o singură administrare. Dacă este utilizată doar o parte a cartușului, cantitatea rămasă trebuie eliminată.

A se utiliza imediat după deschiderea cartușului.

Orice medicament neutilizat sau material rezidual trebuie eliminat în conformitate cu reglementările locale.

## **7. DEȚINĂTORUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Laboratorios Inibsa S.A.  
Ctra. Sabadell a Granollers, km. 14,5  
08185 Lliçà de Vall  
Barcelona, Spania

## **8. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

8233/2015/01-04

## **9. DATA PRIMEI AUTORIZĂRI SAU A REÎNNOIRII AUTORIZAȚIEI**

Data Reînnoire Autorizație Septembrie 2015

## **10. DATA REVIZUIRII TEXTULUI**

Octombrie 2024