

Nr crt	DCI	DC	INDICAȚIE	Stadiu
1	Regorafenibum	Stivarga	Tratamentul adulților cu neoplasm colorectal (NCR) metastatic carora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe baza de fluoropirimidina, un tratament anti-VEGF și un tratament anti EGFR	Finalizat
2	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie dacă dieta și exercitiile fizice nu asigură un control corespunzător al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminului nu este adecvată din cauza intoleranței sau tratament adjuvant asociat în asociere cu alte medicamente care scad concentrația plasmatică de glucoză, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercitiile fizice, nu asigură un control glicemic corespunzător.	Finalizat
3	Vildagliptinum	Galvus	Vildagliptin este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la adulți: În monoterapie - la pacienții cu control adecvat numai prin regim alimentar și exerciții și pentru care metformina nu este recomandată datorită contraindicațiilor sau intoleranței. Ca tratament oral dublu, în asociere cu - metformina, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerabile de metformina în monoterapie, - o sulfonilură, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerabile de sulfonilură și pentru care tratamentul cu metformina este recomandabil din cauza contraindicațiilor sau intoleranței, - o tiazolidindionă, la pacienții cu control glicemic insuficient și la care este indicată utilizarea unei tiazolidindione. Ca tratament oral triplu, în asociere cu - o sulfonilură și o metformină când exercitiile fizice împreună cu tratamentul dual cu aceste medicamente nu asigură un control glicemic adecvat. Vildagliptin este, de asemenea, indicată pentru administrarea în asociere cu insulina (cu sau fără metformina) când regimul alimentar și exercitiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
4	Saxagliptinum	Onglyza 2,5mg și 5mg	Onglyza este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia asociere cu alte medicamente antidiabetice orale (ADO), dubla în asociere cu metformin, atunci când monoterapia cu metformin, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, o sulfonilură, atunci când monoterapia cu sulfonilură, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care administrarea de metformin este considerată inadecvată, o tiazolidindionă, atunci când monoterapia cu tiazolidindionă, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, la pacienții la care administrarea unei tiazolidindione este considerată adecvată, în terapia orală triplă în asociere cu metformin și o sulfonilură, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
5	Ustekinumabum	Stelara	Stelara este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu psoriazis în placi, forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen și ultraviolete A).	Finalizat
6	Riociguat	Adempas	Hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu clasa funcțională II și III conform clasificării OMS cu: -HAPCTE inoperabilă, -HAPCTE persistentă sau recurentă după un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacității de efort fizic. Hipertensiune arterială pulmonară (HAP). Adempas, în monoterapie sau în combinație cu antagoniști ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu hipertensiune arterială pulmonară (HAP) cu clasa funcțională II și III conform clasificării OMS pentru ameliorarea capacității de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrată la pacienții cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatică sau ereditară sau HAP asociată cu o boală a țesutului conjunctiv.	Finalizat
7	Febuxostatium	Adenuric	Tratamentul Hiperuricemiei cronice în bolile în care depunerea de urati a avut deja loc (inclusiv toful gutoș și/sau artrita gutoasă în antecedente sau în prezent). Adenuric este indicat pentru adulți.	Finalizat
8	Belimumab	Benlysta	Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacienții adulți cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard.	Finalizat
9	Bromura de acildinium	Bretaris Genuair 322micrograme	Tratament bronhodilatator de menținere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacienții adulți.	Finalizat
10	Certolizumab Pegol	Cimzia 200mg	Artrita psoriazică. Cimzia, în asociere cu MTX, este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificate ale evoluției bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie în cazul intoleranței la metotrexat sau când continuarea tratamentului cu metotrexat este inadecvată. Tratamentul artritei psoriazice active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificate ale evoluției bolii a fost inadecvat.	Finalizat
11	Duodart (Dutasterida + Clorhidrat de Tamsulosin)	Duodart	Tratamentul simptomelor moderate până la severe ale hiperplaziei benigne de prostată (HBP). Reducerea riscului de retenție acută de urină (RAU) și a necesității intervențiilor chirurgicale la pacienții cu simptome moderate până la severe de HBP.	Finalizat

12	Degarelix	Firmagon	Firmagon este un antagonist al hormonului eliberator de gonadotrofina (GnRH) indicat pentru tratamentul pacienților adulți de sex masculin cu cancer de prostată hormono-dependent în stadiu avansat.	Finalizat
13	Ulipristal Acetat	Esmya	Tratamentul preoperator al simptomelor moderate până la severe ale fibroamelor uterine la femeile adulte aflate la vârsta fertilă.	Finalizat
14	Ethionamidum	Etionamida ATB	Medicament tuberculostatic de linia a II la pacienții cu rezistență la medicația antituberculoasă de linia I.	Finalizat
15	Carboximaltoza ferica	Ferinject	Tratamentul carentei de fier când preparatele de fier orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei asociate cu insuficiența renală cronică pentru pacienții în predializă.	Finalizat
16	Carboximaltoza ferica	Ferinject	Tratamentul carentei de fier când preparatele de fier orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei prin deficit de fier asociate bolilor inflamatorii intestinale.	Finalizat
17	Denosumab	Xgeva	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologică, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau intervenție chirurgicală la nivel osos) la adulți cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.	Finalizat
18	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie dacă dieta și exercitiile fizice nu asigură un control corespunzător al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminului nu este adecvată din cauza intoleranței.	Finalizat
19	Dipropinat de bedometazonă anhidru / fumarat de formoterol dihidrat	Foster	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50% din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.	Finalizat
20	Lantanum	Fosrenol	Fosrenol este indicat, de asemenea, pacienților adulți cu boală renală cronică , nedializați, având nivelul concentrației plasmatice de fosfat $\geq 1,78$ mmol/L, la care exclusiv dieta săracă în fosfat este insuficientă pentru a controla nivelul fosfaților.	Finalizat
21	Everolimus	Afinitor	Cancer mamar în stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenți, cu HER2/neu negativ, administrat în combinație cu exemestane, la femeile în postmenopauză, fără boala viscerală simptomatică, după recurența sau progresia bolii în urma administrării unui inhibitor de aromatază non-steroidal.	Finalizat
22	Everolimus	Afinitor	Carcinom celular renal avansat, care au înregistrat progresie a bolii la sau în urma tratamentului cu terapie țintită asupra FCEV (factor de creștere endotelială vasculară).	Finalizat
23	Eplerenona	Inspra	În asociere cu tratamentul standard optim pentru scăderea riscului mortalității și morbidității cardiovasculare la pacienți adulți cu insuficiență cardiacă (cronică) clasa II NYHA și disfuncție ventriculară stângă (FEVS $\leq 30\%$).	Finalizat
24	Canagliflozin	Invokana	Invokana este indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic fiind administrat ca monoterapie (în cazul în care doar prin dietă și exerciții fizice nu se obține un control glicemic adecvat la pacienții la care utilizarea de metformin este inadecvată datorită intoleranței sau contraindicațiilor) sau terapie adjuvantă (terapie adjuvantă la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercitiile fizice, nu asigură un control glicemic adecvat).	Finalizat
25	Everolimus	Afinitor	Tumori neuroendocrine, nerezectabile sau metastatice, bine sau moderat diferențiate, de origine pancreatică, la adulți cu boala progresivă.	Finalizat
26	Gefitinibum	Iressa	Iressa este indicată pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozininkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR TK (linia aII-a).	Finalizat
27	Gefitinibum	Iressa	Tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC - non small cell lung cancer), avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozininkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR TK.	Finalizat
28	Alemtuzumab	Lemtrada	Pacienții adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR), cu boala activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice.	Finalizat
29	Minocyclinum	Minoz MR	Tratamentul acneei	Finalizat
30	Fotemustinum	Mustaphoran	Melanom malign diseminat cu metastaze cerebrale	Finalizat
31	Rotigotinum	Neupro	Tratamentul simptomatic al sindromului picioarelor nelinistite idiopatic, moderat până la sever	Finalizat
32	Nepafenac	Nevanac	Prevenirea și tratamentul durerilor și inflamațiilor postoperatorii asociate cu operația de cataractă.	Finalizat
33	Simeprevirum	Olysio	Olysio, în asociere cu alte medicamente, este indicat în tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienți adulți.	Finalizat
34	Tapentadolom	Palexia	Palexia retard este indicat la adulți pentru abordarea terapeutică a durerilor cronice severe care pot fi tratate adecvat numai cu analgezice opioide.	Finalizat
35	Dabigatran Etxilat	Pradaxa	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral, atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârsta ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă (NYHA2 II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	Finalizat
36	Perindopril argininum + Amlodipinum	Prestance	Hipertensiune arterială	Finalizat
37	Perindopril argininum + Amlodipinum	Prestance	Boala coronariană stabilă	Finalizat
38	Denosumab	Prolia	Tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale și de sold.	Finalizat
39	Furoat de fluticazonă/vilanterol	Relvar Ellipta	Relvar Ellipta este indicat în tratamentul regulat la astmul bronșic la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, la care este adecvată utilizarea unui medicament combinat (beta, agonisti cu durată lungă de acțiune și corticosteroizi cu administrare inhalatorie): Pacienți la care nu se obține un control adecvat prin terapie cu corticosteroizi cu administrare inhalatorie și beta ₂ agonisti cu durată scurtă de acțiune cu administrare inhalatorie, utilizată la nevoie.	Finalizat
40	Fluticazonă/ Vilanterol	Relvar Ellipta	Relvar Ellipta este indicat în tratamentul simptomatic al adulților cu BPOC cu VEMS <70% din valoarea predictibilă normală (post-bronhodilatator) și cu un istoric de exacerbări, în ciuda administrării regulate a unei terapii bronhodilatatoare.	Finalizat
41	Agalsidasum alfa	Replagal	Replagal este indicat pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiență de α -galactosidază A).	Finalizat
42	Eltrombopag olamina	Revolade	Revolade este indicat pentru tratamentul adulților cu infecție cu virusul hepatic C (VHC) pentru tratamentul trombocitopeniei, în situațiile în care gradul de trombocitopenie este factorul principal care împiedică inițierea sau limitează posibilitatea menținerii unei terapii optime pe baza de interferon.	Finalizat
43	Bendamustinum	Ribovact	Tratament de primă linie în Leucemia Limfatică Cronică(LLC), Binet stadiul B sau C, la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabină.	Finalizat
44	Bendamustinum	Ribovact	Tratament de primă linie în mielomul multiplu(MM), Durie-Salmon stadiul II cu progresie sau stadiul III, în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomida sau bortezomib.	Finalizat
45	Conestat Alfa	Ruconest	Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adulții cu angioedem ereditar (AEE) cauzat de deficit de inhibitor al C1-esterazei.	Finalizat
46	Tafuprostum	Saflutan	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții adulți cu vârsta ≥ 18 ani cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: - care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți - care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie - care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante.	Finalizat

47	Nalmefen	Selincro	Reducerea consumului de alcool la pacienții adulți cu dependența de alcool și care au un risc crescut de consum de alcool, fara simptome somatice de sevraj și care nu necesită în mod imediat tratament detoxifiant	Finalizat
48	Bedaquilinum	Sirturo	Sirturo este indicat la adulți ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzător pentru tuberculoza pulmonară multi-drog rezistentă (MDR-TB) atunci când un tratament eficient nu poate fi altfel alcătuit din motive de rezistență sau tolerabilitate.	Finalizat
49	Ustekinumabum	Stelara	Stelara, în monoterapie sau în asociere cu MTX este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu artrita psoriazică activă care au avut un răspuns insuficient la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice non-biologice modificatoare ale evoluției bolii (MARMb).	Finalizat
50	Lapatinib	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu trastuzumab, la pacienții cu boala metastatică cu receptori hormonalni absenți, progresivă în urma unor terapii anterioare ce trastuzumab în combinație cu chimioterapie.	Finalizat
51	Regorafenibum	Stivarga	Stivarga este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu tumori stromale gastro-intestinale (GIST- Gastrointestinal stromal tumor) neresectabile sau metastatice care au progresat sau care nu au tolerat tratamentul anterior cu imatinib și sunitinib.	Finalizat
52	Oxicodonum/Naloxonum	Targin	Dureri severe, care pot fi tratate în mod adecvat numai cu analgezice opioide. Naloxona, antagonist opioid este adăugată pentru a contracara constipatia indusă de opioide prin antagonizarea acțiunii oxicodeinei la nivelul receptorilor opioizi locali, în intestin.	Finalizat
53	Imunoglobulina Anti-Limfocite	Thymoglobuline	Tratamentul anemiei aplastice	Finalizat
54	Fesoterodina	Toviaz	Tratamentul simptomelor (polakiurie și/sau mictiuni imperioase și/sau incontinență imperioasă) care pot surveni la pacienții adulți cu sindrom de vezică hiperactivă.	Finalizat
55	Atosiban	Tractocile	Tractocile este indicat pentru întârzierea iminentă de naștere prematură la gravidele adulte cu: • contractii uterine regulate, cu durata de cel puțin 30 secunde, cu o frecvență de ≥ 4 și 30 minute; • dilatație cervicală de 1 până la 3 cm (0-3 cm la nulipare) și stergere a colului uterin de $\geq 50\%$; • vârsta ≥ 18 ani; • dilatația sarcinii cuprinsă între 24 și 33 de săptămâni complete; • frecvența normală a bătăilor cardiace fetale. Întârzierea iminentă de naștere prematură la gravidele adulte.	Finalizat
56	Telmisartan+Amlodipna	Twynsta	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la adulți. Terapie de asociere. Indicată la pacienții a căror tensiune arterială nu este controlată adecvat cu amlodipina. Terapie de substituție. Pacienților adulți la care tensiunea arterială esențială este controlată adecvat și cărora li se administrează telmisartan și amlodipina sub formă de monoterapie li se pot administra în schimb comprimate de Twynsta care conțin în compoziție aceleași doze	Finalizat
57	Agomelatinum	Valdoxan	Tratamentul episoadelor depresive majore la adulți	Finalizat
58	Silodosin	Urorec 4mg/8mg	Tratamentul semnelor și simptomelor hiperplaziei prostatice benigne (HPB) pentru grupurile speciale de pacienți, cu insuficiență renală și hepatică.	Finalizat
59	Cilostazol	Velyn	Claudicație intermitentă fără semne de necroză a țesutului periferic (boala arterială periferică stadiul II Fontaine)	Finalizat
60	Lacosamidum	Vimpat	Vimpat este indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienții adulți și adolescenți (16-18 ani) cu epilepsie.	Finalizat
61	Paliperidonum Palmitat	Xeplion	XEPLION este indicat în tratamentul de întreținere al schizofreniei la pacienții adulți stabiliți cu paliperidona sau risperidona. La pacienții adulți selectați cu schizofrenie și care au răspuns anterior la administrarea orală a paliperidonei sau risperidonei, se poate administra XEPLION fără stabilizare anterioară cu un tratament pe cale orală dacă simptomele psihotice sunt ușoare până la moderate și este necesar un tratament injectabil cu eliberare prelungită.	Finalizat
62	Trastuzumabum	Herceptin	Trastuzumabum (Herceptin) în asociere cu capecitabina sau 5-fluorouracil și cisplatina este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu adenocarcinom gastric metastatic HER2 pozitiv sau a joncțiunii gastroesofagiene, cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului pentru boala lor metastatică.	Finalizat
63	Vismodegib	Erivedge	Erivedge este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu: carcinom bazocelular metastatic simptomatic sau carcinom bazocelular avansat local, inadecvat pentru intervenție chirurgicală sau radioterapie.	Finalizat
64	Abirateronum	Zytiga	Zytiga este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în tratamentul neoplasmului de prostată metastatic rezistent la castrare, la bărbații adulți care sunt asimptomatici sau ușor simptomatici după eșecul terapiei de privare de androgeni și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic.	Finalizat
65	Furoat de fluticazona	Avamys	Avamys este indicat pentru tratamentul simptomelor rinitei alergice. Avamys este indicat la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 6 ani peste).	Finalizat
66	Bosutinib	Bosulif	Bosulif este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) în faza cronică (FC), faza accelerată (FA) sau faza blastică (FB), tratați anterior cu unul sau mai mulți inhibitori de tirozininkinază și la care administrarea de imatinib, nilotinib și dasatinib nu este considerată o opțiune terapeutică adecvată.	Finalizat
67	Toxina botulinică	Dysport	Ca medicație adjuvantă fizioterapie, pentru reducerea spasticității membrului superior, apărută ca urmare a unui accident vascular cerebral -prezentând astfel un beneficiu semnificativ pentru pacientul adult.	Finalizat
68	Dalteparin	Fragmin	Tratamentul de durată al tromboemboliei venoase simptomatice (TEV) pentru prevenirea recurenței TEV la pacienții cu cancer	Finalizat
69	Bevacizumabum	Avastin	Neoplasm ovarian epitelial, neoplasm de trompe uterine și neoplasm peritoneal primar.	Finalizat
70	Fenilbutirat de Sodiu	Ammonaps	Ammonaps este indicat ca adjuvant în tratamentul cronic al tulburărilor de ciclu ureic, incluzând deficiența de carbamil-fosfat-sintetă, ornitin-transcarbamilază sau argininosuccinat-sintetă.	Finalizat
71	Ofatumumab	Arzerra	Arzerra, în asociere cu clorambucil sau bendamustina, este indicat în tratamentul pacienților cu LLC care nu au primit tratament anterior și care nu sunt eligibili pentru tratamentul pe baza de fludarabina.	Finalizat
72	Teriflunomidum	Aubagio	Este indicat la adulți, pentru tratamentul pacienților cu scleroză multiplă recurent-remisivă.	Finalizat
73	Cabazitaxelum	Jevtana	Jevtana este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament continuând docetaxel.	Finalizat
74	Bilastinum	Borenar	Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice (sezoniere și perene).	Finalizat
75	Bilastinum	Borenar	Tratamentul simptomatic al urticăriei.	Finalizat
76	Combinații (Candesartan cilexetil+Amlodipin)	Caramlo	Terapie de substituție la pacienții adulți cu hipertensiune arterială esențială a căror tensiune arterială este controlată adecvat cu amlodipină și candesartan administrate concomitent în aceleași doze	Finalizat
77	Bisoprololum + Amlodipinum	Concor AM	Concor AM este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale ca terapie de substituție pentru pacienții la care s-au administrat separat medicamentele individuale în același regim de dozaj ca și în combinație.	Finalizat
78	Ivabradinum	Corlantor	Tratamentul insuficienței cardiace cronice. Ivabradina este indicată în insuficiența cardiacă cronică clasa II-IV NYHA cu disfuncție sistolică, la pacienți în ritm sinus și a căror frecvență cardiacă este ≥ 75 bpm, în asociere cu terapie standard incluzând beta-blocante sau atunci când tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat.	Finalizat
79	Toxina botulinică	Dysport	Torticollis spastic/distonie cervicală (adulți)	Finalizat
80	Toxina botulinică	Dysport	Paralizii spastice la copii cu vârsta de doi ani sau peste, cu infirmitate motorie cerebrală cum este deformarea dinamică, datorată spasticității - picior equin	Finalizat
81	Lapatinibum	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu trastuzumab, la pacienții cu boală metastatică cu receptori hormonalni absenți, progresivă în urma unor terapii anterioare ce trastuzumab în combinație cu chimioterapie	Finalizat
82	Conestat alfa	Ruconest	Episoade acute de angioedem la adulți cu angioedem ereditar (aee) datorat deficitului de inhibitor al C1-esterazei	Finalizat
83	Dabigatran Etxilat	Pradaxa	Prevenția primară a evenimentelor tromboembolice venoase la pacienții adulți care au suferit o intervenție chirurgicală electivă de înlocuire completă de sold sau o intervenție chirurgicală de înlocuire completă a genunchiului.	Finalizat
84	Afliberceptum	Zaltrap	Zaltrap în asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulți cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat după o schemă de tratament pe baza de oxaliplatină.	Finalizat

85	Candesartanum Cilexetil + HCT	Canzeno HCT 8mg/12.5mg	Tratamentul hipertensiunii esențiale insuficient controlată prin monoterapie cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.	Finalizat
86	Sitagliptinum + Metforminum	Janumet	Pentru pacienții adulți cu diabet zaharat de tip 2, Janumet este indicat: ●ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru îmbunătățirea controlului glicemic, la pacienții controlați inadecvat cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie sau la cei care au fost deja tratați cu asocierea dintre sitagliptin și metformin. ●sub forma de terapie triplă în asociere cu o sulfonilurică ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic, la pacienții controlați inadecvat cu doza maximă tolerată de metformin și o sulfonilurică. ● sub forma de terapie triplă, în asociere cu un agonist al receptorilor gama activați de proliferatorul peroxizomilor (PPAPy) (adica, o tiazolidindionă) ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic, la pacienții controlați inadecvat cu doza maximă tolerată de metformin și un agonist PPAPy. ● sub forma de terapie adăugată tratamentului cu insulina (terapie triplă), ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic, pentru îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții la care doza stabilită de insulina și metformin în monoterapie nu realizează un control glicemic adecvat.	Finalizat
87	Saxagliptinum + Metforminum	Komboglyze	Komboglyze este indicat în asociere cu o sulfonilurică (de exemplu terapie combinată triplă (cu ADO)). Ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci când doza maximă tolerată de metformin și sulfonilurică nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
88	Saxagliptinum	Onglyza 2,5mg și 5mg	Onglyza este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapie combinată, în asociere cu insulina (cu sau fără metformin), ca acest tratament, împreună cu dieta și exercitiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
89	Epoetinum Zeta	Retacrit	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficienței renale cronice (IRC) la pacienții adulți, adolescenți și copii: - Tratamentul anemiei asociate cu insuficiența renală cronică la pacienții adulți, copii și adolescenți suferind de hemodializă și la pacienții adulți suferind de dializă peritoneală. - Tratamentul anemiei simptomatice severe de etiologie renală la pacienții adulți cu insuficiența renală care nu sunt încă suferind de dializă.	Finalizat
90	Epoetinum Zeta	Retacrit	Retacrit poate fi folosit pentru creșterea disponibilității de sânge autolog la pacienții încadrați într-un program de pre-donare. Decizia utilizării în această indicație trebuie cântărită și în funcție de riscul raportat de evenimente tromboembolice. Tratamentul trebuie administrat numai pacienților cu anemie moderată (fără deficit de fier) dacă procedurile de conservare a sângelui nu sunt disponibile sau sunt insuficiente atunci când intervențiile chirurgicale electivă majore planificate necesită volume mari de sânge (4 sau mai multe unități de sânge pentru femei sau 5 sau mai multe unități pentru bărbați).	Finalizat
91	Epoetinum Zeta	Retacrit	Tratamentul anemiei și reducerea nevoilor transfuzionale la pacienții adulți tratați prin chimioterapie pentru tumori solide, limfoame maligne sau mielome multiple, și care prezintă risc la primirea transfuziei, după cum indică starea generală a pacientului (de exemplu: statusul cardiovascular, anemia preexistentă la începutul tratamentului prin chimioterapie).	Finalizat
92	Epoetinum Zeta	Retacrit	Retacrit poate fi folosit pentru reducerea expunerii la transfuzii de sânge alogene la pacienții adulți fără deficit de fier, înaintea intervențiilor chirurgicale ortopedice electivă majore, care au un risc potențial crescut de a prezenta complicații ale transfuziei. Utilizarea trebuie limitată la pacienții cu anemie moderată (de exemplu Hb 10-13 g/dl) care nu sunt încadrați într-un program de pre-donare de sânge autolog și la care se așteaptă pierderi de sânge moderate (900-1 800 ml).	Finalizat
93	Naproxenum + Esomeprazolum	Vimovo	Tratamentul simptomatic al osteoartritei, poliartritei reumatoide și spondilitei anchilozate la pacienții cu risc de apariție a ulcerului gastric și/sau duodenal ca urmare a administrării medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) și atunci când tratamentul cu doze mai mici de naproxen sau alte AINS este considerat insuficient.	Finalizat
94	Candesartanum Cilexetil + HCT	Canzeno HCT 16mg/12.5mg	Tratamentul hipertensiunii esențiale insuficient controlată prin monoterapie cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.	Finalizat
95	Rilpivirinum	Edurant	Edurant, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții adulți netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1 ≤100000 copii/ml.	Finalizat
96	Lantanum	Fosrenol	Fosrenol este indicat la pacienții adulți ca agent de fixare a fosfatului utilizat pentru controlul hiperfosfatemiei la pacienții cu insuficiență renală cronică suferind de hemodializă sau dializă peritoneală continuă ambulatorie (DPCA)	Finalizat
97	Fingolimod	Gilenya	Gilenya este indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroză multiplă recidivantă-remitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți: - Pacienți cu activitate intensă a bolii în ciuda tratamentului cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții în informații privind perioadele de eliminare completă. Acești pacienți pot fi definiți ca pacienți care nu au răspuns la un ciclu complet și adecvat (în mod normal, minim un an de tratament) cu cel puțin un tratament de modificare a bolii. Pacienții trebuie să fi avut minim 1 recidivă în anul anterior în timpul tratamentului sau să aibă cel puțin 9 leziuni T2-hiperintense la RMN-ul craniu sau minim 1 leziune ca captare de Gadolinium. Un astfel de pacient poate fi definit și ca pacient cu o rată nemodificată sau crescută de recidivă sau cu recidive curente severe, comparativ cu anul anterior; sau, Pacienți cu scleroză multiplă recidivantă-remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive debilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni ca captare de Gadolinium la RMN craniu sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	Finalizat
98	Saxagliptinum + Metformin	Komboglyze 1000mg	Tratamentul adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru ameliorarea controlului glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2 inadecvat controlat cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie sau la cei care sunt deja tratați cu combinația de saxagliptin și metformin sub forma de comprimate separate; de asemenea, Komboglyze este indicat în asociere cu insulina (de exemplu terapie combinată cu triplă), ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, când insulina și metforminul nu asigură un control glicemic adecvat. De asemenea, Komboglyze este indicat în asociere cu o sulfonilurică (de exemplu terapie combinată triplă), ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci când doza maximă tolerată de metformin și sulfonilurică nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
99	Bromura de aclidiniu	Eklira Genuair 322micrograme	Tratament bronhodilatator de menținere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacienții adulți.	Finalizat
100	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Mircera	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficienței renale cronice (IRC) la pacienții adulți.	Finalizat
101	Glicopirionium	Seebri Breezhaler	Tratament bronhodilatator de întreținere, pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC)	Finalizat
102	Rivaroxaban	Xarelto	Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de elecție pentru substituția soldului sau genunchiului (proteza totală a soldului sau genunchiului).	Finalizat
103	Perindopril + Amlodipina	Amlessa	Hipertensiunea arterială esențială și/sau boala coronariană stabilă.	Finalizat
104	Amlodipina + Valsartan +Hidroclorotiazida	Exforge HCT	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale ca terapie de substituție la pacienții adulți a căror tensiune arterială este controlată adecvat prin combinație cu amlodipina, valsartan și hidroclorotiazidă (HCT), administrate fie ca trei formule cu un component, fie ca formule cu două sau un component.	Finalizat
105	Golimumab	Simponi	Tratamentul spondilitei anchilozate (SA) active, aflată în stadiu sever, la adulți care au avut un răspuns inadecvat la terapia convențională.	Finalizat
106	Dolutegravir	Tivicay	Tivicay este indicat în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale destinate tratamentului infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus-HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani.	Finalizat
107	Tenofovir disoproxil	Viread	Viread 245 mg comprimate filmate este indicat în tratamentul hepatitei B cronice la adulți cu: ● boala hepatică compensată, cu dovezi de replicare virală activă, concentrație serică a alaninaminotransferazei (ALT/SGPT) persistent crescută și dovada histologică a inflamației active și/sau fibrozei. ● dovezi privind prezența virusului hepatic B rezistent la lamivudina. ● boala hepatică decompensată.	Finalizat
108	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a soldului sau genunchiului.	Finalizat
109	Brinzolamida/Timolol	Azarga	Scaderea presiunii intraoculare (PIO) la pacienții adulți cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune intraoculară la care monoterapia determină reducerea insuficientă a PIO.	Finalizat

110	Certolizumab Pegol	Cimzia	Artrita reumatoida. Cimzia, in asociere cu metotrexatul (MTX), este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide actice, moderata pana la severa, la pacientii adulti, atunci raspunsul la medicamentele antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, este inadecvat. Cimzia poate fi administrat in monoterapie in caz de intoleranta la metotrexat sau atunci cand tratamentul continuu cu metotrexat este inadecvat. S-a demonstrat ca Cimzia reduce rata progresiei distructiei articulare evidentiate radiologic si amelioreaza functionalitatea articulare, atunci cand este administrat in asociere cu metotrexat.	Finalizat
111	Linagliptin+Metforminum	Jentaduet	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 in combinatie cu o sulfoniluree (de exemplu tratament cu tripla combinatie) ca un adjuvant la dieta si exercitii fizice la pacientii adulti la care controlul glicemiei nu se realizeaza adecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina si sulfoniluree	Finalizat
112	Aprepitant	Emend	Prevenirea senzatiei de greata si a varsaturilor acute si tardive asociate: ● chimioterapii anticanceroase pe baza de cisplatina, cu potential emetogen mare, la adulti. ● chimioterapii anticanceroase cu potential emetogen moderat, la adulti.	Finalizat
113	Afliberceptum	Eylea	Tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinate de edemul macular secundar occluziei venei centrale a retinei (OVCR)	Finalizat
114	Dipropinat de bclometazona anhidru / fumarat de formoterol dihidrat	Foster	FOSTER este indicat in tratamentul de fond al astmului bronic atunci cand utilizarea unei combinatii (glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune) este adecvata: ● pacienti care nu au raspuns corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata scurta de actiune administrat la nevoie sau ● pacienti care au raspuns deja corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune. A. Terapia de intretinere: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, care se poate asocia, la nevoie cu un bronhodilatator cu durata scurta de actiune. B. Terapia de intretinere si de ameliorare a simptomelor: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, si, la nevoie, pentru controlul simptomatologiei.	Finalizat
115	Telaprevirum	Incivo	Incivo, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, este indicat in tratamentul hepatitei cronice cu virus C, genotipul 1, la pacientii adulti cu boala hepatica compensata (inclusiv ciroza): - netratati anterior; - care au fost tratati anterior cu interferon alfa (pefiat sau nepefiat) in monoterapie sau in asociere cu ribavirina, inclusiv pacientii cu recaderi, pacientii cu raspuns terapeutic partial sau pacientii care nu au raspuns la tratament.	Finalizat
116	Axitinibum	Inlyta	Inlyta este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu carcinom renal in stadiu avansat (CCR) dupa esecul tratamentului anterior cu sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.	Finalizat
117	Eltrombopag olamina	Revolade	Revolade este indicat pentru tratamentul adultilor cu purpura trombocitopenica imuna (idiopatica) (PTI) cronica splenectomizati care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline). Revolade poate fi luat in considerare in tratamentul de linia a doua a adultilor nesplenectomizati pentru care tratamentul chirurgical este contraindicat.	Finalizat
118	Bendamustinum	Ribovact	Ca monoterapie in limfomul non-Hodgkin indolent la pacientii cu progresia bolii in timpul sau in decurs de 6 luni dupa tratamentul cu rituximab sau cu o schema terapeutică ce contine rituximab.	Finalizat
119	Lapatinib	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu un inhibitor de aromatază la femeile cu boală metastatică cu receptori hormonalni prezenți, aflate în postmenopauză, pentru care chimioterapia nu este indicată în prezent.	Finalizat
120	Dabrafenib	Tafinlar	Dabrafenib este indicat ca monoterapie in tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
121	Apomorphinum	Dacepton	Tratamentul pentru inhibarea fluctuatiilor motorii la pacientii cu boala Parkinson, fluctuatii care persista chiar in conditiile administrării unui tratament titrat individual cu Levodopa și/sau alti agonisti ai dopaminei	Finalizat
122	Golimumab	Simponi	Colita ulcerativă (CU) activa aflată în stadii moderate până la severe, la pacienții adulți care au prezentat un răspuns inadecvat la terapia convențională, incluzând corticosteroizi, 6-mercaptopurina (6-MP) sau azatioprina (AZA), ori care prezintă întotdeauna sau contraindicații pentru un astfel de tratament.	Finalizat
123	Linagliptinum	Trajenta 5 mg	Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatati controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
124	Linagliptinum	Trajenta 5 mg	Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatati controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu o sulfoniluree si metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic impreuna cu terapia asociata/duala a acestor doua medicamente nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
125	Panitumumab	Vectibix	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
126	Panitumumab	Vectibix	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
127	Boceprevirum	Victralis	Victralis este indicat in tratamentul hepatitei cronice virale tip C (HCC), genotipul 1, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, la pacientii adulti cu insuficienta hepatica compensata, la care nu s-a administrat tratament sau care nu au raspuns la tratamentele anterioare.	Finalizat
128	Pazopanib	Votrient	Votrient este indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul cu celule renale (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala in stadiu avansat.	Finalizat
129	Pazopanib	Votrient	Votrient este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu subtipuri selectate de sarcom de tesuturi moi (STM) aflat in stadiu avansat carora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatica sau la care boala a progresat in decurs de 12 luni dupa terapia (neo) adjuvanta. Eficacitatea si siguranta au fost stabilite doar pentru anumite subtipuri histologice tumorale de STM.	Finalizat
130	Crizotinib	Xalkori	Xalkori este indicat pentru tratamentul adultilor cu neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv).	Finalizat
131	Rivaroxaban	Xarelto	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si a emboliei pulmonare (EP), si prevenirea recurentei TVP si a EP la adulti.	Finalizat
132	Rivaroxaban	Xarelto	Prevenirea accidentului vascular cerebral si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara cu unul sau mai multi factori de risc, cum sunt insuficienta cardiaca congestiva, hipertensiunea arteriala, varsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu in antecedente.	Finalizat
133	Enzalutamida	Xtandi	Xtandi este indicat la barbati adulti pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, a caror boala a evoluat in timpul, sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat
134	Certolizumab Pegol	Cimzia	Spondiliartrita axiala. Cimzia este indicat in tratamentul pacientilor adulti cu spondiliartrita axiala activa severa, incluzand: -Spondilita anchilozata (SA). Adulti cu spondilita anchilozata activa severa care au un raspuns inadecvat sau intoleranta la antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). -Spondiliartrita axiala fara dovada radiografica de SA. Adulti cu spondiliartrita axiala activa severa fara dovada radiografica de SA, dar cu semne obiective de inflamatie manifestate prin proteina C reactiva (PCR) crescuta si/sau rezonanta magnetica nucleara (RMN), care au avut un raspuns inadecvat sau intoleranta la AINS.	Finalizat
135	Ticagrelor	Brilique	Ticagrelor, administrat in asociere cu acid acetilsalicilic, este indicat pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacientii adulti cu sindrom coronarian acut (SCA) (angina instabila, infarct miocardic fara supradenivelare de segment ST sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST) atat pacientii tratati medical cat si cei tratati prin interventie coronariana percutanata (PCI) sau by-pass coronarian (CABG).	Finalizat
136	Prasugrelum	Eflent	Prevenirea evenimentelor atero-trombotice la pacienti cu sindrom coronarian acut (adica, angina instabila, infarct miocardic fara supra-denivelare de segment ST [UA/NSTEMI], infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST [STEMI]) ce sufera o interventie coronariana per-cutanata (PTCA) primara sau amanata.	Finalizat

137	Golimumab	Simponi 50mg	Golimumab administrat singur sau in asociere cu MTX, este recomandat in tratamentul artritei psoriazice active si progresive, la adulti la care raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare bolii (MARB) a fost inadecvat. S-a demonstrat ca Simponi determina scaderea progresiei afectarii articulatilor extremitatilor, masurata prin metode radiologice, la pacienti cu subtipurile poliariculare simetrice ale afectiunii si amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat
138	Paliperidonium	Invega	Invega este indicat in tratamentul schizofreniei la adulti si adolescenti cu varsta de 15 ani si peste. Invega este indicat pentru tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburarile schizoafective la adulti. Nu a fost demonstrat efectul asupra simptomelor depresive.	Finalizat
139	Abataceptum	Orencia (Jia)	Artrita idiopatica juvenila poliariculara. Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul artritei idiopatie juvenile (AIJ) poliariculare active, forma moderata pana la severa, la copii si adolescenti cu varsta de 6 ani si peste, care au raspuns insuficient la alte MAMB, inclusiv cel putin un inhibitor TNF.	Finalizat
140	Ingenoli Mebutas	Picato	Tratamentul cutanat al Keratozei actinice non-hipertrofie non-hipercheratozice la adulti la nivelul trunchiului si extremitatilor.	Finalizat
141	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 20mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
142	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 40mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
143	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 40mg/10mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
144	Golimumab	Simponi 50mg	Golimumab, in asociere cu metotrexat (MTX), este recomandat in: •Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii moderate pana la severe, la adulti la care raspunsul la tratamentul cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, a fost inadecvat. •Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii severe, la adulti care nu au fost tratati anterior cu MTX. S-a demonstrat faptul ca Golimumab, in combinatie c u MTX, reduce rata de progresie a leziunilor distructive de la nivel articular, conform determinarilor radiologice si ca amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat
145	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHAII).	Finalizat
146	Indacaterolum	Onbrez Breezhaler	Onbrez Breezhaler este indicat pentru tratamentul bronhodilatator de intretinere al obstructiei calilor respiratorii la pacienti adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC).	Finalizat
147	Abataceptum	Orencia (1st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorală (TNF)-alfa.	Finalizat
148	Vildagliptinum + Metforminum	Eucreas	Eucreas este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat on tratamentul pacientilor adulti care nu pot obtine un control glicemic suficient la doza maxima tolerata de metformina administrata oral in monoterapie sau care sunt tratati deja cu o asociere de vildagliptin si metformina sub o forma de comprimate separate. - Eucreas este indicat in combinatie cu o sulfoniluree (si anume terapie in combinatie tripla) ca terapie adjuvanta la regimul alimentar si exercitiile fizice la pacientii adulti, controlati necorespunzator cu metformina si o sulfoniluree. - Eucreas este indicat in terapie in combinatie tripla cu insulina ca terapie adjuvanta la regimul alimentar si exercitiile fizice pentru a imbunatati controlul glicemic la pacienti adulti cand utilizarea insulinei in doza stabila si metformina administrata in monoterapie nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat
149	Afatinibum	Giotrif	Afatinib este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacientilor netratati anterior ce Receptori al Factorului de Crestere Epidermal (EGFR) TKI cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutatie(i) activatoare a(ie) EGFR.	Finalizat
150	Afliberceptum	Eylea	Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul degenerescentei maculare legata de varsta (DMLV) forma neovasculara (umeda).	Finalizat
151	Linagliptinum+Metforminum	Jentaduet	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 ca un adjuvant al dietei si exercitiului fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti controlati inadecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina sau la pacientii carora deja li s-a administrat tratament combinat cu linagliptin si metformina	Finalizat
152	Lixisenatidum	LYXUMIA	Lyxumia este indicat la adulti pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 in asociere cu medicamente hipoglicemizante, administrate pe cale orală, și/sau cu insulina bazală, în vederea obținerii controlului glicemic atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei	Finalizat
153	Abataceptum	Orencia (2st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorală (TNF)-alfa.	Finalizat
154	Tocilizumabum	RoActemra	Tratamentul pacientilor adulti cu poliartrita reumatoida activa, moderata pana la severa si pacientilor cu varsta de 2 ani si peste, cu artrita idiopatica juvenila, forma sistematica activa si cu poliartrita idiopatica juvenila.	Finalizat
155	Ipilimumab	Yervoy	Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezecabil sau metastatic) la pacientii adulti.	Finalizat
156	Vemurafenibum	Zelboraf	Vemurafenibum este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
157	Abirateronum	Zytiga	Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei scheme chimioterapeutice pe baza de docetaxel.	Finalizat
158	METHOTREXATUM	METHOTREXAT EBEWE	Forme severe de psoriazis, in special psoriazisul tip placa, care nu pot fi tratate eficient cu terapie conventionala cum ar fi fototerapia, PUVA si retinoidii si psoriazis sever care afecteaza articulatiile (artrita psoriazica)	Finalizat
159	SILIBINUM	SILIMARINA BIOFARM	Hepatoprotector utilizat ca adjuvant în diferite afecțiuni hepatice cronice incluzând hepatita etanolică	Finalizat
160	INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM	ULTIBRO BREEZHALER 85 micrograme/43 micrograme	Ultibro Breezhaler este indicat in tratamentul bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
161	Perindopril Arginina + Indapamida + Amlodipina	TRIPLIXAM	Hipertensiunea arteriala esentiala la pacientii a caror afectiune este deja controlata cu combinatia in doza fixa perindopril/indapamida si amlodipina administrate concomitent, in aceleasi doze.	Finalizat
162	OFLOXACINUM	UNIFLOX	Infectii bacteriene	Finalizat
163	BRIMONIDINUM	BRIMONAL	Glaucom	Finalizat
164	AGOMELATINUM	VALDOXAN	Tratamentul episoadelor depresive majore	Finalizat
165	DENOSUMAB	PROLIA	Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza si barbati cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.	Finalizat
166	PANITUMUMAB	VECTIBIX	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care p rezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
167	DENOSUMAB	XGEVA	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivel coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.	Finalizat
168	ADALIMUMABUM	HUMIRA	Artrita juvenila idiopatica. Poliartrita reumatoida juvenila idiopatica.	Finalizat
169	DAKLATASVIR	DAKLINZA	Daklinza este indicat, in asociere cu alte medicamente, pentru tratamentul infectiei cronice cu virusul hepatic C (VHC) la adulti.	Finalizat
170	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu limfom Hodgkin (LH) CD30 +recidivat sau refractar: 1. dupa transplant de celule stem autologe (TCSA) sau 2. dupa cel putin doua tratamente anterioare, cand TCSA sau chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezinta o optiune de tratament.	Finalizat

171	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs) , recidivat sau refractar.	Finalizat
172	DASABUVIR	EXVIERA 250 mg	Exviera este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
173	OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRUM	VEKIRAX 12,5mg/ 75mg/ 50mg	Viekirax este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
174	SORAFENIBUM	NEXAVAR 200mg	SORAFENIBUM/Nexavar este indicat pentru tratamentul pacienților cu carcinom tiroidian diferentiat (papilar/folicular/cu celule Hurtle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod radioactiv.	Finalizat
175	RIOCIQUAT	ADEMPAS 0,5mg/ 1mg/ 105mg, 2mg, 205mg	Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Ademapas este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu clasa functionala II și III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Ademapas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II și III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv	Finalizat
176	SOFOSBUVIR	SOVALDI 400mg	SOVALDI este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul Hepatitei Cronice C (HCC) la adulti. Nu se recomanda administrarea de Sovaldi in monoterapie.	Finalizat
177	SIMEPREVIRUM	OLYSIO	OLYSIO, in asociere cu alte medicamente, est eindicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.	Finalizat
178	ETHIONAMIDUM	ETIONAMIDA Atb 250mg	Medicament tuberculostatic de linia a II a la pacientii cu rezistenta la medicamentele de linia I.	Finalizat
179	TELBIVUDINA	SEBIVO 600mg	Sebivo este indicat pentru tratamentul hepatitei cronice B la pacientii adulti cu boala hepatica compensata si semne de replicare virala, valoare plasmatica crescuta in mod repetat a alanin aminotransferazel (ALT) si cu semne histologice de inflamatie activa si/sau fibroza.	Finalizat
180	AFIBERCEPTUM	EYLEA 40mg/ml sol.inj	Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinata de edemul macular diabetic (EMD).	Finalizat
181	MACITENTANUM	OPSUMIT	Opsumit, administrat in monoterapie sau in asociere, este indicat pentru tratamentul pe termen lung al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacientii adulti aflatii in clasa functionala II sau III OMS	Finalizat
182	BEDAQUILINUM	SIRTURO	SIRTURO este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.	Finalizat
183	LEDIPASVIR/ SOFOSBUVIR	HARVONI 90mg/400mg	Tratamentul hepatitei C cronice la adulti	Finalizat
184	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu sindroame mielodisplazice (SMD) cu risc intermediar-2 și mare, conform Sistemului Internațional de Punctaj referitor la Prognostic (SIPP)	Finalizat
185	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) cu 10-29 % blasti medulari, fără boală mieloproliferativă	Finalizat
186	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30 % blasti și linii multiple de diferențiere a displaziei, conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)	Finalizat
187	LENALIDOMIDUM	REVLIMID	Revlimid este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
188	COMBINATII (ROSUVASTATINUM+ EZETINIBUM)	LIPOCOMB 10mg/10mg si 20mg/20mg	Lipocomb este indicat ca adjuvant al regimului alimentar în tratamentul hipercolesterolemiei (exceptând hipercolesterolemia heterozigotă familială) la pacienții adulți • care nu sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină în monoterapie; sau • ca terapie de substituție la pacienții controlați în mod adecvat cu substanțele individuale administrate concomitent, la aceleași concentrații ca și în combinația în doză fixă, dar administrate separat	Finalizat
189	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a soldului.	Finalizat
190	CANAGliflozinum	INVOKANA	Invokana este indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic fiind administrat ca: Monoterapie În cazul în care doar prin dietă și exerciții fizice nu se obține un control glicemic adecvat la pacienții la care utilizarea de metformin este inadecvată datorită intoleranței sau contraindicațiilor. Terapie adjuvantă Terapie adjuvantă la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
191	BOSUTINIB	BOSULIF	Bosulif este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie mieloida cronica cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) in faza cronica (FC), faza accelerata (FA) sau faza blastica (FB), tratati anterior cu unul sau mai multi inhibitori de tirozininkinaza si la care administrarea de imatinib, nilotinib si dasatinib nu este considerata o optiune terapeutica adecvata.	Finalizat
192	Bromura de Acildinium + Fumarat de Formoterol	DUAKLIR GENUAIR	Boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
193	CABAZITAXELUM	JEVTANA	JEVTANA este indicat, in asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostata metastazat hormono-rezistent, tratati anterior dupa o schema de tratament continand docetaxel.	Finalizat
194	AFIBERCEPTUM	ZALTRAP	ZALTRAP in asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic (CCRm), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de tratament pe baza de oxaliplatină.	Finalizat
195	OLAPARIBUM	LYNPARZA 50mg	LYNPARZA este indicat in monoterapie ca tratament de intretinere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad inalt recidivant cu mutatie BRCA (germinala si/sau somatica), neoplazie de trompa uterina sau neoplazie peritoneala primara, sensibile la medicamente pe baza de platina, cu raspuns (complet sau partial) la chimioterapie pe baza de platina.	Finalizat
196	GEFITINIBUM	IRESSA	IRESSA este indicata pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozininkinazel receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR_TK (linia I).	Finalizat
197	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si al emboliei pulmonare (EP), prevenirea trombozei venoase profunde si a emboliei pulmonare recurente la adulti.	Finalizat
198	RAMUCIRUMAB	CYRAMZA	Neoplasm gastric	Finalizat
199	METOPROLOL TARTRAT+ IVABRADINA	IMPLICOR	terapie de substituție pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienți adulți cu ritm sinusal normal, a căror afecțiune este deja controlată cu metoprolol și ivabradină administrate separat, în doze similare	Finalizat
200	IPILIMUMAB	YERVOY	Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezectabil sau metastatic) la pacienti adulti.	Finalizat

201	THALIDOMIDUM	THALIDOMIDE CELGENE	Thalidomide Celgene in asociere cu melfalan si prednison este indicat ca tratament de prima linie la pacientii cu mielom multiplu netratat, cu varsta ≥ 65 de ani sau care nu sunt eligibili pentru chimioterapie ce doze mari.	Finalizat
202	ABIRATERONUM	ZYTIGA	ZYTIGA este indicat în asociere cu prednison sau prednisonol în tratamentul neoplasmului de prostată metastatic rezistent la castrare, la bărbații adulți care sunt asimptomatici sau ușor simptomatici după eșecul terapiei de private de androgeni și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic	Finalizat
203	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA 140 mg	tratamentul pacienților adulți cu leucemie cronică (LLC) carora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau ca terapie de prima linie în prezenta deleției 17p sau mutatiei TP53 la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimioimunoterapie.	Finalizat
204	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA 140 mg	tratamentul pacienților cu limfom cu celule de manta (LCM) recidivant sau refractar.	Finalizat
205	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului în stadiu avansat (nerezectabil sau metastazat) la adulți.	Finalizat
206	BROMURA DE ACLIDINIUM + FUMARAT DE FORMOTEROL	BRIMICA GENUAIR	a tratament bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la adulții cu boală pulmonară cronică obstructivă (BPOC)	Finalizat
207	PAZOPANIBUM	VOTRIENT	indicat la adulți ca prima linie de tratament în carcinomul cu celule renale (CCR) în stadiu avansat și la pacienții la care s-a administrat anterior terapia cu citokine pentru boala în stadiu avansat.	Finalizat
208	PIRFENIDONUM	ESBRIET 267 mg	Esbriet este indicat la adulți pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice (FPI) ușoară până la moderată.	Finalizat
209	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	Xtandi este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostată în stadiu metastatic rezistent la castrare, la bărbați adulți cu simptomatologie absentă sau ușoară, după eșecul terapiei de deprivare androgenică, la care chimioterapia nu este ușoară încă indicată din punct de vedere clinic.	Finalizat
210	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	tratamentul melanomului avansat (nerezectabil sau metastatic) la pacienți adulți.	Finalizat
211	DARUNAVIRUM + COBICISTATUM	REZOLSTA 80mg/150mg	REZOLSTA este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1) la adulți, începând cu vârsta de 18 ani.	Finalizat
212	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienți adulți.	Finalizat
213	OBINUTUZUMABUM	GAZVYARO	în asociere cu clorambulcil este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior și cu comorbidități care nu permit administrarea unui tratament pe baza de fludarabina în doză completă.	Finalizat
214	VELAGLUCERASE	VPRIV	Terapia de substituție enzimatică (TSE) pe termen lung la pacienți cu tipul 1 de boala Gaucher.	Finalizat
215	TETRABENAZINUM	TETMODIS	Tratamentul tulburărilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington	Finalizat
216	DONEPEZILUM	NA	●bolii Alzheimer, forma ușoară sau moderată ●demenței vasculare (demența asociată cu bolile cerebrovasculare)	Finalizat
217	GALANTAMINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
218	MEMANTINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
219	RIVASTIGMINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
220	FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	ATIMOS 0,012mg	ATIMOS este indicat în tratamentul regulat al afecțiunilor obstructive reversibile ale căilor respiratorii la pacienți cu bronhopneumonie cronică obscură, unde este necesară terapia cu bronhodilatator.	Finalizat
221	VEMURAFENIBUM	ZELBORAF 240mg	VEMURAFENIB este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutația BRAF V600.	Finalizat
222	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	XTANDI este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostată în stadiu metastatic rezistent la castrare, la bărbați adulți a caror boală a evoluat în timpul sau după administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat
223	FLUDARABINUM (forma orală)	FLUDARABINA oral	●Tratamentul leucemiei limfocitare cronice cu celule B la pacienții cu rezervă medulară suficientă ●Tratamentul de primă linie numai la pacienții cu forma avansată a leucemiei limfocitare cronice cu celule B, stadiile Rai III/IV (stadiul Binet C) sau stadiile Rai I/II (stadiul Binet A/B) și care prezintă simptome ale bolii sau dovezi ale progresiei bolii	Finalizat
224	ROTIGOTINUM	NA	Parkinson	Finalizat
225	AGALSIDASUM ALFA	REPLAGAL	Terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiența de α-galactosidază A)	Finalizat
226	ATALUREN	TRANSLARNA	Tratamentul pacienților ambulatorii cu vârsta de 5 ani și peste cu distrofie musculară Duchenne determinată de o mutație de tip nonsense la nivelul genei distrofinei.	Finalizat
227	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50% din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.	Finalizat
228	PASIREOTIDUM	SIGNIFOR	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu acromegalie pentru care o intervenție chirurgicală nu constituie o opțiune sau care nu a avut rezultate curative și care nu sunt controlați corespunzător prin tratament cu alt analog al somatostatinei.	Finalizat
229	CARFILZOMIBUM	KYPROLIS	în combinație ori cu lenalidomida și cu dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.	Finalizat
230	NINTEDANIBUM	OFEV	la adulți pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice	Finalizat
231	ELBASVIR/ GRAZOPREVR	ZEPATIER	ZEPATIER este indicat în tratamentul hepatitei C cronice la adulți.	Finalizat
232	SECUKNUMAB	COSENTYX	Cosentyx este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică.	Finalizat
233	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decât cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local avansat sau metastazat, după tratamentul anterior cu chimioterapie, la adulți.	Finalizat
234	PERTUZUMABUM	PERJETA	PERJETA este indicat pentru utilizarea în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.	Finalizat
235	ATAZANAVIR + COBICISTAT	EVOTAZ	EVOTAZ este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul de tip 1 al imunodeficienței umane dobândite (HIV-1) la adulți fără mutații cunoscute asociate rezistenței la atazanavir .	Finalizat
236	INCATIBANT	FIRAZYR	Tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditar la adulți (cu deficit de inhibitor al C1-esterazei).	Finalizat
237	PONATINIB	ICLUSIG	1. leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică, în fază accelerată sau în fază blastică, care prezintă rezistență la dasatinib sau nilotinib, care prezintă intoleranță la dasatinib sau nilotinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I 2. leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+), care prezintă rezistență la dasatinib, care prezintă intoleranță la dasatinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I.	Finalizat
238	COMBINATII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)	EUCREAS 50mg/1000mg	tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat în tratamentul pacienților adulți care nu pot obține un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt tratați deja cu o asociere de vilagligtin și metformină sub formă de comprimate separate. - Eucreas este indicat în combinație cu o sulfoniluree (și anume terapie în combinație triplă) ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice la pacienții adulți, controlați necorespunzător cu metformină și o sulfoniluree. - Eucreas este indicat în terapie în combinație triplă cu insulina ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice pentru a îmbunătăți controlul glicemic la pacienți adulți când utilizarea insulinei în doză stabilă și metformina administrată în monoterapie nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
239	TRAMETINIB	MEKINIST	în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib, este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, cu mutație BRAF V600	Finalizat

240	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) și antecedente de exacerbari repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.	Finalizat
241	COMBINATII (TIOTROPIUM+OLODATEROLUM)	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 micrograme/2,5 micrograme	tratament bronhodilatator de întreținere, cu rol de ameliorare a simptomelor la pacienții adulți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
242	MECASERMIN	INCRELEX	tratamentul de lungă durată al deficitului de creștere la copii și adolescenți cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani cu deficit primar sever de factor de creștere, asemănător insulinei-tip 1 (DFCI)	Finalizat
243	DAPAGLIFLOZIN	FORXIGA	Diabet zaharat tip 2	Finalizat
244	PANOBINOSTAT	FARYDAK	mielom multiplu	Finalizat
245	TRASTUZUMAB EMTANSINE	KADCYLA	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2- pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
246	ERLOTINIBUM	TARCEVA	Neoplasm bronhopulmonar	Finalizat
247	PEMETREXEDUM	ALIMTA	Cancer pulmonar Mezoteliom pleural	Finalizat
248	SORAFENIBUM	NEXAVAR	Carcinom hepatocelular, renal, tiroidian	Finalizat
249	TRABECTEDINUM	YONDELIS	Sarcom de tesuturi moi Cancer ovarian	Finalizat
250	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	Cancer mamar	Finalizat
251	DECITABINUM	DACOGEN	Leucemie mieloida acuta	Finalizat
252	RITUXIMABUM	MABTHERA	Linfom	Finalizat
253	BEVACIZUMABUM	AVASTIN	Carcinom de colon, neoplasm mamar, neoplasm renal	Finalizat
254	CETUXIMABUM	ERBITUX	Cancer colorectal, cancer al capului și gâtului	Finalizat
255	PANITUMUMABUM	VECTIBIX	Neoplasm colorectal	Finalizat
256	RUXOLITINIBUM	JAKAVI	Splenomegalie, mielofibroză	Finalizat
257	TEMOZOLAMIDUM		Gliom, glioblastom	Finalizat
258	GEMCITABINUM		Neoplasm vezică urinară, pancreas, NSCLC, ovarian, mamar	Finalizat
259	PACLITAXELUM		Cancer mamar, ovarian, bronho-pulmonar	Finalizat
260	DOCETAXELUM		Cancer mamar, prostata, bronho-pulmonar	Finalizat
261	FILGRASTIMUM		Neutropenie	Finalizat
262	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
263	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
264	SAXAGLPTIN	ONGLYZA 5 mg comprimate filmate	indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulina (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
265	SAXAGLPTIN	ONGLYZA 5 mg comprimate filmate	indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic: în terapia orală triplă în asociere cu: metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
266	ELVITEGRAVIR / COBICISTAT / EMTRICITABINE / TENOFOVIR ALAFENAMIDE	GENVOYA	tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir.	Finalizat
267	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)	DESCOVY 200 mg/10 mg comprimate filmate	indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
268	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)	DESCOVY 200 mg/25mg comprimate filmate	indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
269	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	Finalizat
270	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx este indicat în tratamentul spondilitei anchilozante active la adulții care au răspuns necorespunzător la terapia convențională.	Finalizat
271	COMBINATII (FLUTICASONUM+FORMOTEROLUM)	FLUTIFORM	tratamentul de întreținere al astmului bronșic în cazul în care este indicată utilizarea unui medicament combinat (un corticosteroid inhalator și un β2 agonist cu durată lungă de acțiune): La pacienții la care nu se obține control adecvat cu corticosteroidi inhalatori și cu β2 agonști cu durată scurtă de acțiune, administrați la nevoie. Sau la pacienții la care s-a obținut deja control adecvat atât cu corticosteroidi inhalatori și cu β2 agonști cu durată lungă de acțiune.	Finalizat
272	OSIMERTINIB MESYLATE	TAGRISSO	tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat
273	DELANAMID	DELTIBA 50 MG	indicat pentru utilizare în cadrul unui regim terapeutic asociat adecvat pentru tuberculoza pulmonară plurirezistentă la medicamente la pacienți adulți atunci când un regim terapeutic eficient nu poate fi altfel constituit din motive de rezistență sau tolerabilitate	Finalizat
274	APIXABAN	ELUQUIS	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II)	Finalizat
275	NIVOLUMAB	OPDIVO	indicat ca monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal după terapie anterioară, la adulți.	Finalizat
276	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	indicat pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), local avansat sau metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament aprobat pentru aceste mutații înaintea administrării KEYTRUDA.	Finalizat
277	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al mielomului multiplu în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomidă sau bortezomib	Finalizat
278	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Ca monoterapie în limfomul non-Hodgkin latent , la pacienții cu progresie a bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă terapeutică care conține rituximab.	Finalizat
279	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al leucemiilor limfatice cronice (stadiul B sau C Binet) la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabină.	Finalizat

280	COMBINATII (SAXAGLIPTIN+DAPAGLIFOZINUM)	QTERN	Qtern, combinație în doză fixă de saxagliptin și dapagliflozin este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2: - pentru îmbunătățirea controlului glicemic atunci când metformin și/sau sulfoniluree (SU) și una din monocomponentele din Qtern nu asigură un control adecvat al glicemiei, - atunci când sunt deja tratați cu combinația liberă de dapagliflozin și saxagliptin	Finalizat
281	LANREOTIDUM	SOMATULINE AUTOGEL 120mg	Tratamentul tumorilor neuroendocrine gastroenteropancreatice (GEP-NETS) de gradul 1 și un subset al gradului 2 (indice Ki67 până la 10%) de origine mezenterică, pancreatică sau necunoscută (acolo unde a fost exclusă originea în hemicolonul stâng și rect), la pacienții adulți cu boală local avansată nerecuzabilă sau la cei cu boală metastatică	Finalizat
282	BLINATUMOMAB	BLINCYTO	tratamentul adulților cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia negativ	Finalizat
283	IDEBENONUM	RAXONE	tratamentul tulburărilor de vedere la pacienții adolescenți și adulți cu neuropatie optică ereditară Leber (LHON)	Finalizat
284	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.03% ung	Tratamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârsta peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroidii topici. Copii (cu vârsta peste 2 ani) Tratamentul dermatitelor atopice moderate până la severe la copiii care nu au răspuns adecvat la terapiile convenționale, cum sunt corticosteroidii topici.	Finalizat
285	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.1% ung	Tratamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârsta peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroidii topici	Finalizat
286	ALEMTUZUMAB	LEMTRADA	indicat la pacienți adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR), cu boală activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	Finalizat
287	CABAZITAXELUM	JEVTANA	În asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel	Finalizat
288	ABACAVIR SULFATE / DOLUTEGRAVIR SODIUM / LAMIVUDINE	TRIUMEQ	indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat
289	EMPAGLIFLOZIN	JARDIANCE	tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulți, ca: Monoterapie Atunci când numai dieta și exercițiul fizic nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminei este considerată inadecvată din cauza intoleranței. Terapie asociată suplimentară În asociere cu alte medicamente hipoglicemizante, incluzând insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei.)	Finalizat
290	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg	tratamentul antiretroviral combinat în tratarea adulților infectați cu VIH-1; antiretroviral pentru utilizare sistemică; antiretrovirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații	Finalizat
291	PALIPERIDONUM	Trevicta	injecție cu o administrare la 3 luni, este indicată în tratamentul de întreținere al schizofreniei la pacienții adulți care sunt stabiliizați clinic cu palmitat de paliperidonă injectabil cu o administrare lunară	Finalizat
292	TOCIZUMABUM	RoActemra	În asociere cu metotrexat (MTX), este indicat pentru: tratamentul pacienților adulți cu PR activă, moderată până la severă, care au avut fie un răspuns inadecvat, fie nu au tolerat tratamentul cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD) sau cu inhibitori ai factorului de necroză tumorală (TNF).La acești pacienți, RoActemra poate fi administrat ca monoterapie, în cazul intoleranței la MTX sau unde continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată. S-a demonstrat că RoActemra scade rata de progrese la leziunile articulare, evaluată radiologic și îmbunătățește funcția fizică atunci când este administrat în asociere cu metotrexat.	Finalizat
293	COMBINATII(BRINZOLAMIDUM+BRIMONIDINUM)	SIMBRINZA	Scăderea presiunii intraoculare (PIO) crescute, la pacienți adulți cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune oculară, la care monoterapia nu asigură o reducere suficientă a PIO	FINALIZAT
294	COMBINATII (SACUBITRILUM+VALSARTANUM)	ENTRESTO 24 mg/26 mg ENTRESTO 49 mg/51 mg mg ENTRESTO 97 mg/103 mg	pacienții adulți în tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejeție redusă	Finalizat
295	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA	ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu macroglobulinemie Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau ca terapie de primă linie la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimioimunoterapie.	Finalizat
296	TRASTUZUMABUM EMTANSINUM	KADCYLA	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
297	BELIMUMAB	BENLYSTA	tratament asociat la terapiile existente la pacienții adulți cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard	Finalizat
298	COMBINATII (AZECLASTINUM+FLUTICASONUM)	DYMISTA 137 micrograme/50 micrograme/doza	Ameliorarea simptomelor de rinită alergică sezonieră și perenă moderate până la severe dacă monoterapia cu antihistaminice intranasale sau glucocorticoizi nu este considerată suficientă.	Finalizat
299	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)	Dunotrisin	o combinație cu doză fixă de emtricitabină și succinat de tenofovir disoproxil. Este indicat în terapia antiretrovirală combinată pentru tratamentul adulților cu vârsta de 18 ani și peste, infectați cu HIV-1.	Finalizat
300	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului	Finalizat
301	Romiplostim	Nplate	Nplate este indicat pentru pacienții cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) cu vârsta de un an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroidi, imunoglobuline).	Finalizat
302	Osimertinibum	TAGRISSO 80 mg comprimate filmate	tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat
303	Elbasvir/grazoprevir	Zepatier	În tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adulți. Pentru activitatea specifică genotipului virusului hepatitic C (VHC)	RETRAS
304	Darunavir 800mg/cobicistat 150 mg	Rezolsta 800mg/150 mg	În asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1) la adulți, începând cu vârsta de 18 ani.	Finalizat
305	Ixekizumab	Taltz 80 mg soluție injectabilă în seringă preumplută	tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.	Finalizat
306	Ramucirumab	Cyamza 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	În asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat	Finalizat
307	RILPIVIRINUM	Edurant 25mg	În asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1≤ 100000 copii/mL	Finalizat
308	Secukinumabum	Cosentyx	În monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	FINALIZAT
309	Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat	Foster 100/6 mcg/doză	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS<50%din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu acțiune de lungă durată	Finalizat
310	Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat	Foster Nexthaler 200/6 mcg/doză	Tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu lungă durată de acțiune) este adecvată: - pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie - pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată lungă de acțiune	Finalizat

311	PERTUZUMABUM	PERJETA 420mg	indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-positiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.	Finalizat
312	LAPATINIBUM	TYVERB	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces: în asociere cu capecitabina, la pacienții cu neoplasm mamar avansat sau metastatic, progresiv în urma unor terapii anterioare, care trebuie să fi inclus antracicline și taxani și terapie cu trastuzumab, în context metastatic	Finalizat
313	BEVACIZUMAB	AVASTIN	1. Bevacizumab administrat în asociere cu carboplatină și paclitaxel este indicat ca tratament de primă linie al pacienților adulte cu neoplasm ovarian epitelial (stadiile FIGO (Federația Internațională de Ginecologie și Obstetrică) IIIB, IIIC și IV), al trompelor uterine sau cu neoplasm peritoneal primar în stadii avansate . 2. Bevacizumab, administrat în asociere cu carboplatină și gemcitabină , este indicat pentru tratamentul pacienților adulte la care s-a diagnosticat prima recidivă de neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, sensibile la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-a administrat anterior tratament cu bevacizumab sau alți inhibitori ai factorului de creștere a endoteliului vascular (FCEV) sau terapie țintă asupra receptorului FCEV . 3. Bevacizumab administrat în asociere cu paclitaxel, topotecan sau doxorubicină lipozomală polietilenglicată este indicat pentru tratamentul pacienților adulte cu neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, recurente, rezistente la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-au administrat mai mult de două scheme chimioterapice și care nu au fost tratate anterior cu bevacizumab sau cu alți inhibitori ai FCEV sau cu terapie țintă asupra receptorului FCEV	Finalizat
314	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	în asociere cu capecitabină sau 5-fluorouracil și cisplatină este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu adenocarcinom gastric metastazat HER2 pozitiv sau a joncțiunii gastroesofagiene, cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului pentru boala lor metastatică	Finalizat
315	PEMBROLIZUMABUM	KEYTRUDA 50mg	indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporțional (STP) ≥ 50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.	Finalizat
316	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINĂ /FUMARAT TENOFOVIR ALAFENAMIDA	GENVOYA	Tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir	Finalizat
317	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Artrită psoriazică Cimzia în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evoluției bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie în cazul intoleranței la MTX sau când continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată	Finalizat
318	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Spondilartrită axială severă, incluzând: Spondilita anchilozantă (SA) - Adulți cu spondilită anchilozantă activă severă care au un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS Spondilartrită axială fără dovadă radiografică de SA- Adulți cu spondilartrită axială activă severă fără dovadă radiografică de SA, dar cu semne obiective de inflamație manifestate prin proteina C reactivă (PCR) crescută și/sau rezonanță magnetică nucleară (RMN), care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS	Finalizat
319	DOLUTEGRAVIR+ABACA+VIR+LAMIVUDINUM	TRIUMEQ	indicat în tratamentul infecției cu Virusul imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat
320	DARATUMUMAB	DARZALEX	1) în monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și refractar, care au fost tratați anterior cu un inhibitor de proteazom și un agent imunomodulator și care au înregistrat progresia bolii sub ultimul tratament.; 2) în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
321	EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDĂ	DESCOVY 250mg/25 mg	Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
322	EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDĂ	DESCOVY 200mg/10 mg	în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
323	BARICITINIB	OLUMIANT	Tratamentul poliartritei reumatoide active moderat până la severă la pacienții adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală	Finalizat
324	DULAGLUTIDUM	TRULICITY	indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de: Monoterapie Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. Terapie combinată În combinație cu alte medicamente hipoglicemice, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
325	COMBINAȚII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)	SULIQUA	indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală	Finalizat
326	TAFLUPROSTUM	SAFLUTAN	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: o care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți o care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie o care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante. SAFLUTAN este indicat la adulți cu vârsta ≥18 ani.	Finalizat
327	CARFILZOMIB	KYPROLIS	în combinație ori cu lenalidomida și cu dexametazonă sau numai cu dexametazonă este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu (MM) la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.	Finalizat
328	ALIROCUMABUM	PRALUENT	indicat la adulți cu hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă și non-familială) sau cu dislipidemie mixtă, ca adjuvant la dietă: - în asociere cu o statină sau cu o statină împreună cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți la care nu s-au putut atinge valori țintă ale LDL-colesterolului cu o statină administrată în doza maximă tolerată, sau - singur sau în asociere cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți cu intoleranță la statine sau la care este contraindicată administrarea de statine.	Finalizat
329	ELTROMBOPAG	REVOLADE	indicat pentru tratamentul purpriei trombocitopenice imune (idioptice) (PTI) cronice la pacienții cu vârsta de 1 an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	Finalizat
330	IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA; CU ADMINISTRARE EXTRAVASCULARA	GAMMANORM 165 mg/mL	Terapie de substituție la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta între 0 și 18 ani) cu sindrom de imunodeficiență primară cum sunt: - agamaglobulinemie și hipogamaglobulinemie congenitale; - imunodeficiența comună variabilă (IDCV); - imunodeficiența severă combinată; - deficite de subclasa IgG cu infecții recurente;	Finalizat
331	Secukinumabum	Cosentyx	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever , la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Finalizat
332	USTEKINUMABUM	STELARA	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu psoriazis în plăci , forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen) și ultraviolete A)	FINALIZAT

333	Nivolumabum	Opdivo	În monoterapie este indicat pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic recidivat sau refractar după transplant autolog de celule stem (TACS) și tratament cu brentuximab vedotin la adulți	Finalizat
334	ELIGLUSTAT	CERDELGA	tratamentul de lungă durată la pacienții adulți cu boala Gaucher de tip 1 (BG1), care sunt metabolizatori lenți (ML), metabolizatori intermediari (MI) sau metabolizatori rapizi (MR) prin intermediul CYP2D6	Finalizat
335	VANDETANIB	CAPRELSA	tratamentul neoplasmului medular tiroidian (NMT) agresiv și simptomatic la pacienți cu forma de boală local avansată, inoperabilă sau cu forma de boală metastazată.	Finalizat
336	CRIZOTINIB	XALKORI	Xalkori este indicat pentru tratamentul de prima intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv)	FINALIZAT
337	RITUXIMAB	MABTHERA	Granulomatoză cu poliangită și poliangită microscopică În asociere cu glucocorticoizi este indicat pentru inducerea remisiunii la pacienții adulți cu granulomatoză cu poliangită Wegener GPA activă, severă și poliangită microscopică MPA	FINALIZAT
338	AFUBERCEPTUM	EYLEA	afectării acutității vizuale determinată de edemul macular secundar occludiei venei retinei (OVR de ram sau OVR centrală)	FINALIZAT
339	BRIVARACETAM	BRIVIACT	terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți și adolescenți, începând cu vârsta de 16 ani.	FINALIZAT
340	LIRAGLUTIDUM	VICTOZA	pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului	FINALIZAT
341	ALFA ELOSULFAZA	VIMIZIM	tratamentul mucopolizaharidozei tip IVA (sindromul Morquio A, MPS IVA) la pacienții de orice vârstă	FINALIZAT
342	TOFACITINIB	XELJANZ	• în asociere cu metotrexat (MTX) este indicat în tratamentul artritei reumatoide (AR) active, moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la, sau care nu tolerează unul sau mai multe medicamente antireumatice modificate ale bolii; • administrat ca monoterapie în caz de intoleranță la MTX sau atunci când tratamentul cu MTX nu este adecvat	Finalizat
343	ETIONAMIDUM	ETIONAMIDA 250 mg	Medicament tuberculostatic de linia a 2a la pacienții cu rezistența la medicamentele de linia 1	Finalizat
344	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă	Boala Crohn	Finalizat
345	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă	Colita Ulcerativă	Finalizat
346	COMBINATII (EFAVIRENZUM/ EMTRICITABINUM/ TENOFOVIRUM)	EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR disoproxil MYLAN 600 mg /200 mg /245 mg	infecția HIV	Finalizat
347	OMALIZUMAB	XOLAIR 150 mg	tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienți adulți și adolescenți (12 ani și peste aceasta vârstă) cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1	Finalizat
348	ETIONAMIDUM	NA	În combinație cu alte medicamente tuberculostatice ca medicament de linia a doua la pacienții cu Mycobacterium tuberculosis (MT) în condițiile în care s-a instalat rezistența la medicamentele de primă intenție (izoniazidă și rifampicină).	Finalizat
349	LEVOFLOXACINUM	NA	tratamentul infecțiilor bacteriene	Finalizat
350	CLOFAZIMUN	NA	TBC	Finalizat
351	LINEZOLID	NA	TBC	Finalizat
352	Combinatii (Rifampicina+Pirazinamida+Izoniazida)	NA	TBC	Finalizat
353	Combinatii (Amoxicilina+Acid clavulanic)	NA	TBC	Finalizat
354	Combinatii (Imipenem+Cilastatin)	NA	TBC	Finalizat
355	Rifamycin	NA	TBC	Finalizat
356	Combinatii(Rifampicin+Pirazinamid+Izoniazid +Etambutol)	NA	TBC	Finalizat
357	Natrii Cromoglicas		MASTOCITOZA	Finalizat
358	Palbociclib	IBRANCE 75 mg capsule IBRANCE 100 mg capsule IBRANCE 125 mg capsule	tratamentul cancerului mamar avansat local sau metastatic pozitiv pentru receptorul pentru hormoni (HR) i negativ pentru receptorul 2 pentru factorul uman de creștere epidermală (HER2): - în asociere cu un inhibitor de aromatază - în asociere cu fulvestrant la femeile cărora li s-a administrat tratament endocrin anterior La femeile în pre- sau perimenopauză, tratamentul endocrin trebuie combinat cu un agonist al hormonului de eliberare al hormonului luteinizant (LHRH).	Finalizat
359	BECLOMETASONE / FORMOTEROL / GLYCOPYRRONIUM BROMIDE	TRIMBOW 87/5/9 mg	BPOC	Finalizat
360	OLARATUMAB	LARTRUVO	În combinație cu doxorubicina pentru tratamentul pacienților adulți cu sarcom de țesuturi moi în stadii avansate care nu sunt eligibili pentru tratamentul curativ prin intervenție chirurgicală sau radioterapie și care nu au fost tratați anterior cu doxorubicină	Finalizat
361	VENETOCLAX	VENCLYXTO	1. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC) în prezența deleției 17p sau a mutației TP53 la pacienți adulți care nu sunt eligibili pentru sau au avut eșec la un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B. 2. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu LLC în absența deleției 17p sau a mutației TP53 care au avut eșec atât la chimioterapie și imunoterapie cât și la tratamentul cu un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B.	Finalizat
362	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS	tratamentul pacienților adulți cu limfom cutanat cu celule T CD30+ (LCCT) după cel puțin 1 tratament sistemic anterior	Finalizat
363	ARSENICUM TRIOXIDUM	TRISENOX 1mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii și consolidare la pacienții adulți care prezintă: ⊗ leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la intermediar, nou diagnosticată(număr de leucocite ≤10 x 103/μl) în asociere cu acidul all-trans retinoic (AATr) ⊗ leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară (tratamentul anterior trebuie să fi inclus un retinoid și chimioterapie) caracterizată prin prezența translocației t(15;17) și / sau prezența genei leucemiei promielocitare/receptorului-alfa al acidului retinoic (LPM/RAR-alfa). Nu a fost studiată rata de răspuns a altor subtipuri de leucemii acute mieloblastice la trioxidul de arsen.	Finalizat
364	LIPEGFILGRASTIMUM	LONQUEx 6 mg soluție injectabilă	Reducerea duratei neutropeniei și a apariției neutropeniei febrile la pacienți adulți tratați cu chimioterapie citotoxică pentru afecțiuni maligne (cu excepția leucemiei mieloid cronice și a sindroamelor mielodisplazice).	Finalizat
365	EVEROLIMUS	AFINITOR	tratamentul tumorilor neuroendocrine, nefuncționale, nerezeectabile sau metastatice, bine diferențiate (de gradul 1 sau gradul 2), de origine gastro-intestinală sau pulmonară, la adulți cu boală progresivă	Finalizat
366	NIVOLUMAB	OPDIVO 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul cancerului scuamos de cap și gât la adulți la care boala progresează în timpul sau după terapie pe bază de săruri de platină	Finalizat
367	COMBINATII (TRIFLURIDINUM+TIPIRACILUM)	LONSURF 15 mg/ 6,14 mg comprimate filmate LONSURF 20 mg/ 8,19 mg comprimate filmate	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (CCR –cancer colorectal), cărora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe bază de fluoropirimidină, oxaliplatină și irinotecan, tratamentele anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) și anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)	Finalizat
368	NUSINERSEN	SPINRAZA	tratamentul atrofiei musculare spinale 5q	Finalizat
369	COLISTIMETAT DE SODIU	COLOBREATHE 1662500 UI capsule cu pulbere de inhalat	Colobreathe este indicat în abordarea terapeutică a infecțiilor pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa, la pacienții cu fibroză chistică (FC), cu vârsta de cel puțin 6 ani	Finalizat
370	PERTUZUMABUM	PERJETA	Perjeta este indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică	Finalizat

371	DOLUTEGRAVIR	TIVICAY 10 mg, 25 mg	În asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.	Finalizat
372	DOLUTEGRAVIR	TIVICAY 50 mg	În asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.	Finalizat
373	CABOZANTINIB	CABOMETIX 40mg, 60mg	tratamentul carcinomului celular renal (CCR) în stadiu avansat, la adulți care au urmat anterior o terapie țintită asupra factorului de creștere al endotelului vascular (FCEV).	Finalizat
374	CERITINIB	ZYKADIA	a în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat (NSCLC), pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), tratați anterior cu crizotinib	Finalizat
375	AZACITIDINE	VIDAZA	tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice (TCSH), cu LAM cu > 30 % blasti medulari conform clasificării OMS	Finalizat
376	BEVACIZUMAB	AVASTIN	în asociere cu paclitaxel și cisplatină sau, în mod alternativ, cu paclitaxel și topotecan la paciențele cărora nu li se poate administra chimioterapie cu săruri de platină, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom de col uterin persistent, recurent sau metastazat	Finalizat
377	DIMETHYL FUMARATE	Tecfidera 120 mg capsule gastrorezistente Tecfidera 240 mg capsule gastrorezistente	Tecfidera este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă forma recurent/remisivă	Finalizat
378	OBINUTUZUMAB	GAZYVARO	Gazyvaro administrat în asociere cu bendamustină, urmat de tratament de întreținere cu Gazyvaro, este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfom folicular (LF) care nu au răspuns la tratament sau au prezentat progresia bolii în timpul sau în interval de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă de tratament care a inclus rituximab	Finalizat
379	PEGINTERFERON BETA 1A	PLEDIGRY	Plegidry este indicat la pacienții adulți pentru tratamentul sclerozei multiple recurent/remisive	Finalizat
380	COMBINATII (CARVEDILOLUM+IVABRADINUM)	CARIVALAN	1. tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienți cu boala coronariană 2. tratamentul insuficienței cardiace cronice (clasa II-IV NYHA) cu disfuncție	Finalizat
381	APREMILAST	OTEZLA	tratamentul psoriazisului în plăci cronic, moderat până la sever, la pacienții adulți care nu au răspuns sau cărora le este contraindicată ori prezintă intoleranță la altă terapie sistemică, inclusiv ciclosporină, metotrexat sau psoralen și raze ultraviolete A (PUVA)	Finalizat
382	APREMILAST	OTEZLA	administrat ca monoterapie sau în asociere cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active (APs) la pacienții adulți care au obținut un răspuns inadecvat sau au prezentat intoleranță la o terapie anterioară cu MARMB	Finalizat
383	ERIBULIN	HALAVEN	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar local în stadiu avansat sau metastatic, la care boala a progresat după cel puțin un regim chimioterapic pentru boală în stadiu avansat. Tratamentul anterior trebuia să includă o antraciclină și un taxan fie în context adjuvant, fie în context metastatic, cu excepția cazului în care pacienții nu îndeplineau criteriile pentru administrarea acestor medicamente	Finalizat
384	USTEKINUMAB	STELARA	tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai răspundă sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la antagoniști TNFα, sau aceste tratamente le sunt contraindicate din punct de vedere medical.	Finalizat
385	MIDOSTAURIN	RYDAPT	1) la pacienții adulți nou diagnosticați cu leucemie granulocitară acută (LGA), cu mutație FLT3 în asociere cu chimioterapia standard de inducție cu daunorubicină și citarabină și de consolidare cu doză mare de citarabină, iar la pacienții cu răspuns complet, ca tratament de întreținere cu Rydapt în monoterapie; 2) în tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă (MSA), mastocitoză sistemică cu neoplazie hematologică asociată (MS-NHA) sau leucemie cu celule de tip mastocit (LCM) în monoterapie	Finalizat
386	SILTUXIMABUM	SYLVANT	SYLVANT este indicat în tratamentul pacienților adulți cu boala Castleman multicentrică (BCM) fără infecție cu virusul imunodeficienței umane (HIV) și fără infecție cu virusul herpesic uman de tip 8 (VHU-8)	Finalizat
387	PANOBINOSTATUM	FARYDAK	Farydak, administrat în combinație cu bortezomib și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și/sau refractar cărora li s-a administrat cel puțin două scheme anterioare de tratament incluzând bortezomib și o substanță imunomodulatoare.	Finalizat
388	ATEZOLIZUMAB	TECENTRIQ	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină sau care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatină	Finalizat
389	EFTRENONACOG ALFA	ALPROLIX	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilie B (deficit congenital de factor IX).	Finalizat
390	ABIRATERONE	ZYTIGA	●tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbați adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy) ● tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la castrare (mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer), la bărbați adulți asimptomatici sau ușor simptomatici, după eșecul terapiei de deprivare androgenică și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic (vezi pct. 5.1)	finalizat
391	ATEZOLIZUMAB	TECENTRIQ	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul neoplasmului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie. Pacienților cu mutații activatoare ale EGFR sau mutații tumorale ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament specific, înaintea administrării Tecentriq	Finalizat
392	ALECTINIB	ALECENSA	indicat ca monoterapie pentru tratamentul de primă linie al pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, cu status pozitiv pentru kinaza din limfomul anaplastic (ALK). Alecensa este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu NSCLC avansat, cu status pozitiv ALK, tratați anterior cu crizotinib	Finalizat
393	RIBOCICLIB	KISQALI	În asociere cu un inhibitor de aromatază este indicat pentru tratamentul femeilor aflate la postmenopauză , cu cancer mamar, în stadiu avansat sau metastazat local , cu receptori hormonalni (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică (HER2), ca terapie hormonală inițială	Finalizat
394	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	În monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulți cărora li s-a administrat anterior chimioterapie care conține săruri de platină	Finalizat
395	IBRUTINIB	IMBRUVICA	În asociere cu bendamustină și rituximab (BR) în tratamentul pacienților adulți cu LLC cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară	Finalizat
396	OCRELIZUMAB	OCREVUS	Ocrevus este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu forme recurente de scleroză multiplă (SMR), cu boală activă definită prin caracteristici clinice și imagistice	Finalizat
397	DASATINIBUM	Sprycel	SPRYCEL este indicat pentru tratamentul copiilor și adolescenților: ▣ nou-diagnosticați cu LMC Ph+ în fază cronică (LMC Ph+FC) sau cu LMC Ph+FC cu rezistență sau intoleranță la terapii anterioare, inclusiv imatinib.	Finalizat
398	ATALUREN	Translarna	Translarna este indicat în tratamentul pacienților ambulatorii cu vârsta de 2 ani și peste cu distrofie musculară Duchenne determinată de o mutație de tip nonsens la nivelul genei distrofinei	Finalizat
399	EVOLOCUMAB	Repatha 140 mg	Se utilizează pentru reducerea nivelurilor de lipide din sânge la pacienți care suferă de hipercolesterolemie primară (niveluri ridicate de colesterol în sânge, provocate de o anomalie genetică), de hipercolesterolemie familială homozigotă (o formă severă de colesterol ridicat în sânge, moștenită de la ambii părinți) și de dislipidemie mixtă (niveluri anormale de diferite lipide, inclusiv colesterol). Medicamentul se utilizează și pentru reducerea riscului de probleme cardiace la pacienții cu ateroscleroză (pereți îngroșați ai arterelor) care au avut un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte probleme ale sistemului circulator (boală cardiacă aterosclerotică). Repatha se utilizează în asociere cu o statină, sau cu o statină și alte medicamente pentru scăderea nivelurilor de lipide. Repatha se poate utiliza și fără statină la pacienții care nu pot lua statine. La unii pacienți este necesară și o dietă slabă în grăsimi.	Finalizat

400	DARATUMUMAB	Darzalex	în asociere cu borteozomib, melfalan și prednison pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu nou diagnosticat și care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem	Finalizat
401	PEMBROLIZUMABUM	Keytruda	limfom Hodgkin clasic, o formă de cancer al limfocitelor (un tip de globule albe). Keytruda se utilizează numai după ce tratamentul cu brentuximab vedotin și transplantul autolog de celule stem (un tip de transplant utilizat pentru a înlocui măduva osoasă cu celulele stem ale pacientului) nu au dat rezultate, ori după ce tratamentul cu brentuximab vedotin nu a dat rezultate și nu este posibilă efectuarea unui transplant	Finalizat
402	REGORAFENIBUM	STIVARGA	Monoterapie pt tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular , care au fost tratați anterior cu sorafenib.	Finalizat
403	EMICIZUMAB	Hemlibra	tratament profilactic de rutină pentru prevenirea sângerărilor sau reducerea frecvenței episoadelor de sângerare la pacienți cu hemofilia A care prezintă inhibitor de factor VIII	Finalizat
404	INSULINA GLARGINE+LIXISENATIDUM	Suliqua	Suliqua este indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală	Finalizat
405	INSULINA DEGLUTEC	Tresiba	Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 1 an.	Finalizat
406	DABIGATRAN ETEXILAT	Pradaxa 110 mg Pradaxa 150 mg	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) ce prezintă unui sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârstă ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă, (NYHA2 II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	Finalizat
407	GOLIMUMABUM	Simponi	Colita ulcerativă	Finalizat
408	NETUPITANTUM+PALONOSTERONUM	Akynzeo	prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen accentuat ce conține cisplatină - prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen moderat.	Finalizat
409	TUROCTOCOG ALFA	Novoeight	Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).	Finalizat
410	PERTUZUMABUM	Perjeta	tratament neoadjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc înalt de recurență și tratament adjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER 2 pozitiv, în stadiu incipient, cu risc înalt de recurență	Finalizat
411	BAZOMIB	NINLARO 2,3 mg capsule NINLARO 3 mg capsule NINLARO 4 mg capsule	Ixazomib, în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu care au urmat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
412	AVELUMABUM	Bavencio	carcinom metastatic cu celulu Merkel	Finalizat
413	CLADRIBINUM	MAVENCLAD 10 mg comprimate	MAVENCLAD este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă (SM) recurentă foarte activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	Finalizat
414	DENOSUMAB	Prolia	tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauza cu risc crescut de fractura după tratamentul în inițiat cu bifosfonati sau care au intoleranță sau contraindicație la bifosfonati.	Finalizat
415	Cilostazol	Dilvas	claudicație intermitentă	în așteptare
416	LENALIDOMIDUM	LENALIDOMIDA ALVOGEN 10 mg, 25 mg, 15 mg, 5 mg	Lenalidomidă AlvoGen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem. Lenalidomidă AlvoGen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomidă AlvoGen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	Finalizat
416	Cerliponază alfa	Brineura 150 mg soluție perfuzabilă	tratamentul afecțiunii de lipofuscină ceroid neuronală de tip 2 (LCN2), cunoscută și sub denumirea de deficit de tripeptidă peptidază 1 (TPP1).	Finalizat
417	Velmanază alfa	Lamzedo 10 mg	Terapia de substituție enzimatică în tratamentul manifestărilor non-neurologice la pacienți cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată.	Finalizat
418	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXLAPREVIRUM	VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg	Vosevi este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitic C (VHC) la adulți	Finalizat
419	COMBINATII(SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM)	EPCLUSA 400mg/100mg	Epclusa este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulți	Finalizat
420	BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM	FOSTER NEXTHALER 100/6 micrograme pe doza	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.	în așteptare
421	Benralizumabum	Fasenra	Fasenra este indicat ca tratament de întreținere la pacienții adulți cu astm bronșic eozinofilic sever, care nu este controlat în mod adecvat prin administrarea inhalatorie a unei doze mari de corticosteroidi plus β-agoniști cu durată lungă de acțiune	Finalizat
	Empagliflozin	Jardiance	tratamentul adulților cu diabet de tip 2 insuficient controlat, ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic i ca monoterapie atunci cand metformina este considerata inadecvata din cauza intolerantei in plus fata de alte medicamente pentru tratamentul DZ	Finalizat
422	Pembrolizumab	KEYTRUDA	KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici(NSCLC, non-small cell lung carcinoma),metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1cu un scor tumoral proporțional (STP)≥50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.	Finalizat
423	Turoctocog alfa, factor de coagulare VIII	NovoEight *	Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).NovoEight poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.	Finalizat
424	Lenalidomidă	Lenalidomidum	Este indicat în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	Finalizat
425	Trametinib	Mekinist	administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib , este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic , cu mutație BRAF V600	Finalizat
426	Dabrafenib	Tafinlar	administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib , este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic , cu mutație BRAF V600	Finalizat
427	Propranololum	Hemangioli	Hemangiomi infantili	Finalizat
428	Burosumabum	CRYSVITA 10 mg	CRYSVITA este indicat pentru tratamentul hipofosfatemiei X-linkate (HXL), cu evidențe radiografice de boală osoasă, la copii cu vârsta de 1 an și peste și adolescenți al căror schelet este în creștere.	Finalizat
429	Lenalidomidă Sandoz	Lenalidomidum	Mielom multiplu Lenalidomidă AlvoGen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem. Lenalidomidă AlvoGen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomidă AlvoGen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
430	Icatibant	Firazyr	Firazyr este indicat pentru tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditar (AEE) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste cu deficit de inhibitor al CL-I esterazei.	Finalizat
431	Darvadstrocel	Alofisel	Alofisel este indicat pentru tratamentul fistulelor perianale complexe la pacienții adulți cu boala Crohn	Finalizat
432	Ruxolitinib	Jakavi	tratamentul pacienților adulți cu policitemia vera care prezintă rezistență sau intoleranță la hidroxiuree.	Finalizat
433	Combinatii Dagapiliflozin + Metformin	Xigduo	Xigduo este indicat ca tratament adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2; - la pacienții controlați inadecvat cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie - în asociere cu alte medicamente pentru scăderea glicemiei, inclusiv insulina, la pacienții controlați inadecvat cu metformin - pentru pacienții tratați deja cu asocierea dagapiliflozin și metformin sub forma de comprimate separate	Finalizat
434	CRIZOTINIB	XALKORI	tratamentul de prima intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv).	Finalizat

435	Guselkumab	Tremfya	Tremfya este indicat în tratamentul psoriazisului în placi, formele moderate până la severe, la pacienții care sunt eligibili pentru terapia sistemică.	Finalizat
436	combinatii darunavir+cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamida	Symtuza	Symtuza este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la adulți și adolescenți (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 40 kg)	Finalizat
437	Blinatumomab	Blincyto	monoterapie pentru tratamentul adulților cu LLA precursor de celula B, cu cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă, în prima sau a doua remisie completă cu boala minimă reziduală (minimal residual disease, MRD) mai mare sau egală cu 0,1%	Finalizat
438	Migalastat	GALAFOLD	Migalastat este indicat pentru tratamentul de lungă durată al adulților și adolescenților în vârstă de cel puțin 16 ani, cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficit de alfa-galactozidază A) și care prezintă o mutație sensibilă	Finalizat
439	Brentuximab Vedotin	ADCETRIS	Adcetris este indicat pentru pacienții adulți cu limfom Hodgkin (LH) CD30+ stadiu IV, netratat anterior, în asociere cu doxorubicină, vinblastină și dacarbazină (AVD)	Finalizat
440	Fampridinum	Fampyra	îmbunătățirea mersului la pacienții adulți cu scleroză multiplă care prezintă invaliditate (EDSS4-7)	Finalizat
441	Pomalidomida	IMNOVID	în asociere cu dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-a administrat cel puțin două regimuri terapeutice anterioare, incluzând lenalidomida și bortezomib și care au prezentat progresia bolii la ultimul tratament	Finalizat
442	Avelumabum	Bavencio	carcinom metastatic cu celule Merkel	Finalizat
443	Comb (Ledipasvirum+Sofosbuvirum)	Harvoni	tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și < 18 ani	Finalizat
444	Ixekizumabum	TALTZ	tratamentul artritei psoriazice active la adulți la care răspunsul terapeutic a fost inadecvat sau a demonstrat intoleranță după administrarea unuia sau a mai multor medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD)	Finalizat
445	Ixekizumabum	TALTZ	tratamentul psoriazisului în placi moderat până la sever la adulții care sunt eligibili pentru terapie sistemică și care prezintă pe langa diagnosticul principal psoriazis afectare articulară	Finalizat
446	Patisiran	ONPATTRO	tratamentul amiloidozei ereditare mediata de transtiretina (amiloidoza hATTR) la pacienții adulți cu polineuropatie de stadiu 1 sau stadiu 2	Finalizat
447	Nivolumab	OPDIVO	în monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastazat la care s-a efectuat rezecție completă	Finalizat
448	Pembrolizumabum	Keytruda	pacienți adulți cu carcinom pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small lung cancer) metastatic, scuamos, ale caror tumori nu prezintă mutații EGFR sau ALK pozitive și care pot fi tratați cu medicamentul Keytruda în asociere cu carboplatină și fie paclitaxel, fie nab-paclitaxel	Finalizat
449	Abemaciclibum	Verzenios	tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv și receptor pentru factorul de creștere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, în asociere cu fulvestrant ca tratament hormonal inițial sau la femei cărora li s-a administrat anterior tratament hormonal	Finalizat
450	Abemaciclibum	Verzenios	tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv și receptor pentru factorul de creștere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, în asociere cu inhibitor de aromatază ca tratament hormonal inițial sau la femei cărora li s-a administrat anterior tratamentul hormonal	Finalizat
451	Obinutuzumab	Gazyvaro	tratamentul pacienților cu limfom folicular în forma avansată, netratată anterior	Finalizat
452	VENETOCLAX	VENCLYXTO	Venclyxto administrat în asociere cu rituximab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) care au primit anterior cel puțin un tratament	Finalizat
453	Durvalumabum	Imfinzi	în monoterapie este indicat în tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat, inoperabil, pentru pacienți adulți ale caror tumori exprima PD-L1 la ≥1% dintre celule; e tumorale și a caror boala nu a progresat după radio-chimioterapie cu compusi pe baza de platină	Finalizat
454	TISAGENLECLEUCEL	KYMRIAH	tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe linii de terapie sistemică	Finalizat
455	TRAMETINIB	MEKINIST	Trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiu III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	Finalizat
456	DABRAFENIB	TAFINLAR	Dabrafenib în asociere cu trametinib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiu III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	Finalizat
457	TISAGENLECLEUCEL	KYMRIAH	tratamentul pacienților copii și adolescenți și pacienților adulți tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în remisie post-transplant sau în a doua sau a treia recidivă	Finalizat
458	Semaglutidum	Ozempic	Ozempic este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dieta și exerciții fizice: - sub forma de monoterapie atunci când administrarea de metformin este considerată inadecvată din cauza intoleranței sau a contraindicațiilor - în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat	Finalizat
459	Agalsidasum Alfa	Replagal	indicat pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiența de alfa-galactosidază A)	Finalizat
460	Irinotecan lipozomal	ONIVYDE 4,3 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Tratamentul adenocarcinomului pancreatic metastazat, în asociere cu 5-fluorouracil (5-FU) și leucovorin (LV), la pacienți adulți la care afecțiunea a progresat sub tratament pe bază de gemcitabină.	Finalizat
461	Sirolimus	Rapamune	Rapamune este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfangioleiomiomatoză sporadică, cu boală pulmonară moderată sau funcție pulmonară în declin	Finalizat
462	Dupilumab	Dupixent	Tratamentul dermatitei atopice forma moderată până la severă la pacienții adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Finalizat
463	Everolimus	Votubia	Tratamentul adjuvant al pacienților cu vârsta de 2 ani și peste această vârstă, ale caror convulsii referate, cu debut parțial, cu sau fără generalizare secundară, sunt asociate cu complexul sclerozei tuberoase (CST)	Finalizat
464	Apomorfium	APO-GO	trat. Fluctuilor motorii la pac cu b. Parkinson	Finalizat
465	Caplacizumab	Cablivi	Tratamentul adulților care manifestă un episod de purpură trombocitopenică trombocita dobândită (PTTd), în asociere cu plasmafereza și tratament imunosupresor	Finalizat
466	Pegaspargasm	ONCASPAR	indicat ca o componentă a terapiei combinate antineoplazice în leucemia limfoblastică acută (LAL) la copii și adolescenți de la naștere până la 18 ani și la pacienți adulți	Finalizat
467	Elmoroctocog alfa	Elocta	tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII). Elocta poate fi utilizat la toate grupele de vârstă	Finalizat
468	Comb (Bictegravir+Emtricitabina+Tenofovir alafenamida)	Biktarvy	tratamentul adulților infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fara evidente prezente sau anterioare de rezistență virală la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabina sau tenofovir	Finalizat
469	Insulinum degludec	Tresiba	tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 1 an	Finalizat
470	Rosuvastatina+perindopril+indapamida	Roxiper	tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale, și care prezintă și una dintre următoarele afecțiuni concomitente: hipercolesterolemie primară (tip Ila incluzând hipercolesterolemie familială heterozigotă), dislipidemia mixtă (tip Iib) sau hipercolesterolemie familială homozigotă	Finalizat
471	Pembrolizumabum	Keytruda	Introducere în compensare ambalaj nou	Finalizat
472	Lurasidona	Latuda	tratamentul este indicat pentru tratamentul schizofreniei la adulți cu vârsta de 18 ani sau mai mare	Finalizat
473	Sunitinib	Sutent	Sutent este indicat pentru tratamentul tumorilor neuroendocrine pancreatice (pNET) bine diferențiate, nerezeceabile sau metastatice, la adulți care au prezentat progresia bolii.	Finalizat
474	Lenalidomide Accord	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.	Finalizat
475	Lenalidomide Accord	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
476	Dinutuximab beta	Qarziba 4,5 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Qarziba este indicat pentru tratamentul neuroblastomului cu grad mare de risc la pacienții cu vârsta peste 12 luni, cărora li s-a administrat anterior chimioterapie de inducție și care au obținut cel puțin un răspuns parțial, urmat de terapie mieloablativă și transplant de celule stem, precum și la pacienții cu antecedente de neuroblastom recurent sau rezistent, cu sau fără boală reziduală. Înaintea tratamentului pentru neuroblastom recurent, orice boală activă care progresează trebuie stabilizată prin alte măsuri adecvate. În cazul pacienților cu antecedente de boală recurentă/rezistentă și al pacienților care nu au obținut un răspuns complet după terapia de primă linie, Qarziba trebuie administrat în asociere cu interleukină-2 (IL-2)	Finalizat

477	AFATINIBUM	GIOTRIF 20 mg comprimate filmate GIOTRIF 30 mg comprimate filmate GIOTRIF 40 mg comprimate filmate	GIOTRIF este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutație(i) activatoare a(le) EGFR, netratat anterior cu Receptorul Factorului de Creștere Epidermal (EGFR) TK	finalizat
478	DULAGLUTIDUM	TRULICITY	Trulicity este indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic sub formă de: Monoterapie Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. Terapie combinată În combinație cu alte medicamente hipoglicemice, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	finalizat
479	Olaparibum	Lynparza	Monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivat cu mutație BRCA (germinală și/sau somatică) neoplazie de trompa uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe baza de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapia pe baza de platină	Finalizat
480	Lenalidomidum	Lenalidomidă Alvogen	Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.	Finalizat
481	Lenalidomidum	Lenalidomidă Alvogen	Lenalidomida Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
482	Cresemba	Isavuconazolum	Cresemba este indicat la adulți pentru tratamentul mucormicozei la pacienții la care amfotericina B este inadecvată	finalizat
483	Cresemba	Isavuconazolum	Cresemba este indicat la adulți pentru tratamentul aspergilozei invazive	finalizat
484	Briviact	brivaracetam	indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 4 ani.	finalizat
485	Ivacaftor	Kalydeco	Kalydeco comprimate este indicat pentru tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC) cu vârsta de 6 ani și peste și cu greutatea de 25 kg sau mai mult, care prezintă una dintre următoarele mutații de sincronizare (clasa III) la nivelul genei CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N sau S549R	finalizat
486	Lenalidomidum	Lenalidomida Sandoz	indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	finalizat
487	Gefitinib	Gefitinib Glenmark	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici NSCLC avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprima mutații ale tirozininkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR_TK	Finalizat
488	Ticagrelorom	Brilique	Administrat în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), este indicat pentru prevenția evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți cu sindrom coronarian acut (angină instabilă, infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST [NSTEMI] sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST [STEMI]); pacienți tratați prin proceduri intervenționale percutane (PCI) numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)	Finalizat
489	Crizotinibum	Xalkori	În monoterapie este indicat pentru:Tratamentul adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv)	Finalizat
490	Nivolumab/ipilimumab	Opdivo/Yervoy	Opdivo în asociere cu ipilimumab este indicat pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat cu pronostic intermediar/nefavorabil, la adulți	Finalizat
491	Dolutegravir/Lamivudina	Dovato	tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV) tip 1 la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de minim 40 kg, fara rezistența documentată sau suspectată clinic la clasa inhibitorilor de integrază sau fata de lamivudina	Finalizat
492	Telotristat	Xermelo	indicat pentru tratamentul diareei din cadrul sindromului carcinoid, în combinație cu terapia cu analog de somatostatina (ASS), la adulții care nu sunt controlați în mod corespunzător prin terapia cu ASS>	finalizat
493	Lenalidomidum	Lenalidomida Glenmark	ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomida este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	finalizat
494	Dolutegravir/Rilpivirina	Juluca	indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) la adulți care prezintă supresie virologică (ARN HIV-1 <50 copii/ml) în prezența unui regim antiretroviral stabil timp de minimum șase luni, care nu au antecedente de eșec virologic și rezistență cunoscută sau susținută la inhibitori non-nucleozidici de reverstranscripază sau la inhibitori de integrază	Finalizat
495	Ramucirumabum	Cyramza	În monoterapie este indicat în tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular în stadiu avansat sau nerezeceabil cu o valoare a alfa feto proteinei serice (AFP) ≥ 400 ng/ml, care au fost tratați anterior cu sorafenib.	Finalizat
496	inhibitor de esteraza C1, umana	Cinryze	Tratamentul și prevenția pre-procedurală a episoadelor de angioedem la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 2 ani și peste) cu angioedem ereditar (AEE). Prevenția de rutină a episoadelor de angioedem la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 6 ani și peste) cu crize severe și recurente de angioedem ereditar (AEE), care prezintă intoleranță la tratamentele orale preventive sau sunt insuficient protejați de acestea, sau la pacienți a căror stare este inadecvat controlată prin tratamente de fază acută aplicate în mod repetat	Finalizat
497	inotuzumab ozogamicin	Besponsa	indicat ca monoterapie pentru tratamentul adulților cu leucemie acută limfoblastică recidivată sau refractară (LAL) cu precursori de celule B pozitive pentru CD22. Pentru pacienții adulți cu LAL cu precursori de celule B cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph+) recidivată sau refractară, la care tratamentul cu cel puțin un inhibitor de tirozin-kinază (ITK) să fi eșuat.	Finalizat
498	Mercaptamine (cysteamine bitartrate)	Procysbi	este indicat pentru tratamentul cistinozei nefropatice confirmate. Cisteamina reduce acumularea de cistină în unele celule (de exemplu leucocite, celule musculare și hepatice) la pacienții cu cistinoză nefropatică și întârzie dezvoltarea insuficienței renale, în cazul în care tratamentul este inițiat în primele faze ale bolii.	Finalizat
499	LETERMOVIRUM	PREVYMIS 240 mg	este indicat în tratamentul profilactic al reactivării infecției cu virusul citomegalic (CMV) și al bolii induse de virusul citomegalic la adulți CMV-seropozitivi [R+] la care s-a efectuat un transplant alogen de celule stem hematopoietice (TCSH).	Finalizat
500	Tofacitinib	Xeljanz	indicat în tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă (CU) activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns inadecvat, au pierdut răspunsul terapeutic sau nu au tolerat fie tratamentul convențional, fie un agent biologic	Finalizat
501	Tofacitinib	Xeljanz	în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice (APs) active la pacienții adulți care au avut un răspuns inadecvat, sau care nu au tolerat un tratament anterior cu un medicament antireumatic modificator al bolii (DMARD)	Finalizat
502	Glecaprevir/Pibrentasvir	Maviret	indicat pentru tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulți și la adolescenți cu vârsta de 12 ani până la	Finalizat
503	Simococog alfa	Nuwiq	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).	Finalizat
504	Atorvastatinum+Ezetimibum	Zentovar	Tratament adjuvant la regimul alimentar ca tratament de substituție pentru tratamentul adulților cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă sau homozigotă, familială și non-familială) sau hiperlipidemie mixtă deja controlată sub tratament cu atorvastatină și ezetimib administrate concomitent în aceleași doze	Finalizat
505	Brigatinibum	Aunbrig	este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar non-microcelular (CPNMC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), tratați anterior cu crizotinib.	Finalizat
506	Baricitinib	Olumiant 2 mg	indicat în tratamentul poliartritei reumatoide active moderată până la severă la pacienții adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumice modificatoare de boală . Olumiant poate fi administrat ca monoterapie sau în asociere cu metotrexat	Finalizat
507	Certolizumab pegol	Cimzia	psoriazis în placi	Finalizat
508	Lumacaftor/Ivacaftor	Orkambi	tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC), cu vârsta de 12 ani și peste, cu genotip homozigot pentru mutația F508del la nivelul genei CFTR	Finalizat
509	Pancreatinum	Kreon	Tratamentul insuficienței pancreatice exocrine	Finalizat

510	Secukinumab	Cosentyx	indicat în tratamentul spondilitei anchilozante active la adulții care nu au răspuns corespunzător la terapia convențională.	Finalizat
511	Cerliponasum Alfa	Brineura	Brineura este indicat pentru tratamentul afecțiunii de lipofuscină ceroidă neuronală de tip 2 (LCN2), cunoscută și sub denumirea de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1).	Finalizat
512	EDOXABANUM	Roteas 30 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți	Finalizat
513	EDOXABANUM	Roteas 60 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți	Finalizat
514	EDOXABANUM	Roteas 30 mg	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă ≥ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente.	Finalizat
515	EDOXABANUM	Roteas 60 mg	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă ≥ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente.	Finalizat
516	DORAVIRINUM	Pifeltro	Pifeltro este indicat, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență la compoziții din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (NNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)) în antecedente sau în prezent	Finalizat
517	DORAVIRINUM+LAMIVUDINUM+TENOFIVIRUM DISOPROXILUM	DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg	Delstrigo este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență în antecedente sau în prezent la compoziții din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (NNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)), lamivudină, sau tenofovir	Finalizat
518	LIRAGLUTIDUM	VICTOZA	Victoza este indicat pentru tratamentul adulților, adolescenților și copiilor cu vârsta de 10 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice: în asociere cu metformin și insulina	Finalizat
519	LENALIDOMIDUM	LENALIDOMIDA GLENMARK	Lenalidomidă Glenmark este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	finalizat
520	RISANKIZUMABUM	Skyrizi 75 mg soluție injectabilă în seringă preumplută	Skyrizi este indicat în tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Finalizat
522	PALIVIZUMABUM	Synagis	Synagis este indicat pentru prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare, determinate de virusul sincițial respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR: Copii născuți la 35 săptămâni de gestație sau mai puțin și cei cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR. Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni.	in asteptare
523	Abirateronum	Zytiga	este indicat în asociere cu prednison sau prednison în: tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy)	Finalizat
524	INHIBITOR DE ESTERAZA C1, UMANA	Berinert	Angioedem ereditar tip I și II (AAE) Tratamentul și procedura de prevenire prealabilă a episoadelor acute.	finalizat
525	Insulinum glarginum	Toujeo/Lantus	Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 6 ani.	Finalizat
526	PATISIRANUM	ONPATTRO	Onpattro este indicat pentru tratamentul amiloidozei ereditare mediată de transtiretină (amiloidoză hATTR) la pacienții adulți cu polineuropatie de stadiu 1 sau stadiu 2.	Finalizat
527	Eltrombopag	REVOLADE	Revolade este indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste, cu trombocitopenie imună primară (TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	finalizat
528	Rituximabum	Mabthera	MabThera, administrat în asociere cu glucocorticoizi, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu granulomatoză cu poliangită (Wegener) (GPA) activă, severă și poliangită microscopică (MPA).	finalizat
529	Cabozatinib	Cabometyx	indicat ca monoterapie pentru tratamentul carcinomului hepatocelular (CHC) la adulții care au fost tratați anterior cu sorafenib.	finalizat
530	Ustekinumab	Stelara	este indicat pentru tratamentul pacienților copii și adolescenți cu vârsta de 6 ani și peste, cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe, care nu obțin un control adecvat sau prezintă intoleranță la alte terapii sistemice sau fototerapii	finalizat
531	Daratumumab	Darzalex	În asociere cu lenalidomidă și dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu nou diagnosticat și care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem În asociere cu bortezomib, talidomidă și dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu nou diagnosticat și care sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem	Finalizat
532	Ibrutinib	Imbruvica	indicat ca monoterapie sau în asociere cu obinutuzumab în tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratați anterior IMBRUVICA în asociere cu rituximab este indicat în tratamentul pacienților adulți cu MW.	Finalizat
533	Ibrutinib	Imbruvica	Introducerea unei forme farmaceutice noi	Finalizat
534	Alirocumab	Praluent	Boală cardiovasculară aterosclerotică stabilită - Praluent este indicat la adulți cu boală cardiovasculară aterosclerotică stabilită pentru reducerea riscului cardiovascular prin scăderea valorilor LDL-colesterolului (LDL-C), ca tratament adjuvant la corectarea altor factori de risc: - în asociere cu statină administrată în doza maximă tolerată, împreună cu sau fără alte terapii hipolipemice sau, - singur sau în asociere cu alte terapii hipolipemice la pacienții care nu tolerează statinele sau la care este contraindicată administrarea de statine.	finalizat
535	Trastuzumab emtasine	Kadcyla	Cancer mamar incipient ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu cancer mamar HER2-pozitiv incipient, care prezintă boală invazivă reziduală, la nivel mamar și/sau	finalizat
536	Comb (insuline glargine + lixisenatidum)	Suliqua	indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 insuficient controlat, pentru a îmbunătăți controlul glicemic, ca adjuvant al dietei și exercițiului fizic, adăugat la metformina administrată în asociere cu sau fara inhibitori al co-transportorului 2 de sodiu-glucoza (SGLT-2)	Finalizat
537	Rurioctocog alfa pegol	Adynovi	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).	finalizat
538	Imunoglobulină umană normală	HyQvia	Terapie de substituție la adulți, adolescenți și copii (0-18 ani) în: @ Sindroame de imunodeficiență primară cu producere de anticorpi afectată	Finalizat
539	Eptacog alfa activat	NovoSeven	indicat pentru tratamentul episoadelor de sângerare și pentru prevenirea sângerării legate de proceduri invazive sau intervenții chirurgicale la următoarele grupuri de pacienți: • pacienți cu hemofilie ereditară și valori ale inhibitorilor factorilor de coagulare VIII sau IX cu titru > 5 unități Bethesda (UB) • pacienți cu hemofilie ereditară la care se așteaptă un răspuns anamnestic intens la administrarea de factor VIII sau IX • pacienți cu hemofilie dobândită • pacienți cu deficit congenital de factor VII	Finalizat
540	Teduglutidum	Revestive	indicat în tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste cu sindrom de intestin scurt (SIS). Pacienții trebuie să fie stabili după o perioadă de adaptare intestinală după chirurgie.	Finalizat
541	Somatropin	Genotropin	tratamentul tulburărilor de creștere la copii și adulți	in asteptare
542	Dapagliflozinum	Forxiga	ca tratament adjuvant (tripla terapie orală) asociat cu metformin și sulfoniluree	finalizat
543	Dupilumab	Dupixent	indicat la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, ca tratament adjuvant de întreținere pentru astm bronșic sever, însoțit de inflamație de tip 2 caracterizată prin eozinofilie și/sau valori crescute ale FeNO și inadecvat controlat cu doze medii până la mari de corticosteroizi inhalatori plus un alt medicament utilizat ca tratament de întreținere.	finalizat
544	Belimumabum	Benlysta	indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacienții cu vârsta de 5 ani și peste cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard	Finalizat

545	Triptorelinum	Diphereline	Tratamentul carcinomului de prostată metastazat. Endometrioză genitală și extragenitală Infertilitate la femei Tratament preoperator al fibromului uterin Cancer de sân	finalizat
546	Olaparibum	Lynparza	indicat în monoterapie la pacienții adulți cu mutații germinale ale genei BRCA1/2, cu neoplasm mamar în stadiu local avansat sau metastatic, HER2 negativ. Pacienții trebuiau să fi fost tratați anterior cu antraciclina și taxan în context (neo)adjuvant sau metastatic, cu excepția situației în care pacienții nu aveau indicație pentru aceste tratamente	Finalizat
547	Tocilizumab	RoActemra	adaugare forma farmaceutica intravenoasa	Finalizat
548	Ribociclib	Kisquali	tratamentul femeilor cu cancer mamar, în stadiu avansat local sau metastatic, cu receptori hormonali (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică (HER2), în asociere fulvestrant, ca terapie hormonală inițială, sau la femei cărora li s-a administrat terapie hormonală anterioară.	finalizat
549	Ustekinumab	Stelara	indicat în tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratament sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie au contraindicații medicale la aceste terapii	retras
550	Cemiplimabum	Libtayo	indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu carcinom cutanat cu celule scuamoase metastazat sau local avansat, care nu sunt candidați eligibili pentru intervenție chirurgicală în scop curativ sau radioterapie în scop curativ.	finalizat
551	Cladribina	Mavenclad	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă (SM) recurentă foarte activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	Finalizat
552	Polatuzumab Vedotin	Polivy	în asociere cu bendamustină și rituximab, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz cu celulă mare B (DLBCL) recidivat/refractor, care nu sunt candidați pentru transplantul de celule stem hematopoietice.	finalizat
553	Ruxolitinibum	Jakavi	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu policitemia vera care prezintă rezistență sau intoleranță la hidroxiuree.	Finalizat
554	Omalizumab	Xolair	indicat ca tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienții adulți și adolescenți (12 ani și peste această vârstă), cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1.	în așteptare
555	Empagliflozinum	Jardiance	în asociere cu insulina cu sau fara administrare concomitentă de metformina pentru tratamentul pacienților adulți cu diabet zaharat de tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic când acestea împreună cu dieta și exercitiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
556	Venetoclax	Venclyxto	administrat în asociere cu obinutuzumab este indicat în tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior	finalizat
557	Apalutamidum	Erleada	în tratamentul cancerului de prostată non-metastatic rezistent la castrare (nmCRPC, nonmetastatic castration-resistant prostate cancer) la bărbați adulți, care prezintă un risc crescut de a dezvolta boală metastatică	finalizat
558	Olaparibum	Lynparza	indicat în monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulate cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivat cu mutație BRCA (germinală și/sau somatică), neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe bază de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe bază de platină.	Finalizat
559	Semaglutidum	Rybelsus	indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2, insuficient controlat pentru îmbunătățirea controlului glicemic, ca terapie adăugată la dietă și exerciții fizice • sub formă de monoterapie atunci când administrarea de metformin este considerată inadecvată din cauza intoleranței sau contraindicațiilor • în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat.	finalizat
561	Nintedanibum	Ofev	indicat la adulți pentru tratamentul altor boli pulmonare interstițiale fibrozante cronice (BPI) cu fenotip progresiv	finalizat
562	Tildrakizumabum	Ilumetri	indicat pentru tratamentul adulților cu psoriazis în plăci moderat până la sever care sunt candidați pentru terapie sistemică.	Finalizat
563	Midostaurinum	Rydapt	în tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă (MSA), mastocitoză sistemică cu neoplazie hematologică asociată (MS-NHA) sau leucemie cu mastocite (LCM) în monoterapie.	Finalizat
564	Parathyroid hormone	Natpar	indicat ca tratament adăugat la pacienții adulți cu hipoparatiroidism cronic, care nu poate fi controlat în mod adecvat doar cu terapia standard.	finalizat
565	Gefitinib	Geftinib Alvogen	indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non-small cell lung cancer)), avansat locoregional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozininkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR-TK	finalizat
566	Atezolizumab	Tecentriq	în asociere cu carboplatină și etopozidă, este indicat pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extensiv (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC), la pacienții adulți	finalizat
567	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem.	Finalizat
568	Gefitinib	Geftinib Accord	în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat locoregional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozininkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR-TK	finalizat
569	Apomorfium	APO-GO	tratamentul fluctuațiilor motorii (fenomenul "on-off), la pacienții cu boala Parkinson, care nu sunt suficient de controlate de medicamente antiparkinsoniene administrate oral.	finalizat
570	Tolvaptan	Jinarc	indicat în încetinirea progresiei dezvoltării chisturilor și insuficienței renale în boala polichistică renală cu transmitere autozomal dominantă (BPKAD) la adulți cu insuficiență renală cronică (IRC) stadiul 1 până la 4 la inițierea tratamentului, cu dovezi de progresie rapidă a bolii	finalizat
571	Alemtuzumab	Lemtrada	indicat ca tratament unic modulator al evoluției bolii la adulți cu scleroză multiplă recurent remisivă foarte activă (SMRR) pentru următoarele grupe de pacienți: • Pacienți cu boală foarte activă în ciuda administrării unui ciclu complet și adecvat cu minimum un tratament modulator al evoluției bolii (DMT) sau • Pacienți cu scleroză multiplă recurent remisivă severă cu evoluție rapidă, definită pe baza următoarelor criterii: 2 sau mai multe recidive care produc invaliditate în decurs de un an, cu 1 sau mai multe leziuni hipercaptante de gadolinium la examinarea RMN cerebrală sau o creștere semnificativă a încărcării lezionale în secvența T2 comparativ cu o examinare RMN anterioară recentă.	în așteptare
572	Comb (Beclometazona + Formoterol)	Foster 100/6	Tratamentul simptomatic al pacienților cu bronhopneumopatie cronică obstructivă severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune/ soluție de inhalat	în așteptare
573	Comb (Beclometazona + Formoterol)	Foster 100/6	Tratamentul simptomatic al pacienților cu bronhopneumopatie cronică obstructivă severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune/ soluție de inhalat/ pulbere de inhalat	în așteptare
574	Osimertinibum	Tagrisso	adaugare concentratie noua	în așteptare
575	Denosumab	Xgeva	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractură patologică, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau intervenție chirurgicală la nivel osos) la adulți cu afecțiuni maligne în stadiu avansat, cu interesare osoasă	în așteptare
576	Dabrafenib	Tafinlar	Dabrafenib în asociere cu trametinib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă. Trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	finalizat
577	Eculizumab	Soliris	indicat pentru tratarea adulților și copiii cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN). Dovezi privind beneficiile clinice sunt demonstrate la pacienții cu hemoliză cu simptom(e) clinic(e) ce indică o activitate intensă a bolii, indiferent de antecedentele legate de transfuzii	în așteptare
578	Dabigatran etexilat	Pradaxa	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârstă ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă, (NYHA≥ II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	finalizat

579	Dipropionat de beclometazona anhidru/fumarat de formoterol dihidrat	Foster 100/6	indicat în tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2- adrenergic cu durată lungă de acțiune) este adecvată: - pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2- adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie sau - pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2- adrenergic cu durată lungă de acțiune.	în așteptare
580	Fingolimod	Gilenya	indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroză multiplă recidivantă/remitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți și pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 10 ani și peste: - Pacienți cu boală extrem de activă în ciuda administrării unei scheme complete și adecvate de tratament, cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții și informații privind perioadele de eliminare completă, vezi pct. 4.4 și 5.1). sau - Pacienți cu scleroză multiplă recidivantă/remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive disabilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	în așteptare
581	Fingolimod	Gilenya	indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroză multiplă recidivantă/remitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți și pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 10 ani și peste: - Pacienți cu boală extrem de activă în ciuda administrării unei scheme complete și adecvate de tratament, cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții și informații privind perioadele de eliminare completă, vezi pct. 4.4 și 5.1). sau - Pacienți cu scleroză multiplă recidivantă/remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive disabilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	în așteptare
582	Fingolimod	Gilenya	indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroză multiplă recidivantă/remitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți și pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 10 ani și peste: - Pacienți cu boală extrem de activă în ciuda administrării unei scheme complete și adecvate de tratament, cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții și informații privind perioadele de eliminare completă, vezi pct. 4.4 și 5.1). sau - Pacienți cu scleroză multiplă recidivantă/remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive disabilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	în așteptare
583	Ustekinumab	Stelara	indicat în tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai răspundă sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la antagoniștii TNF α , sau aceste tratamente le sunt contraindicate din punct de vedere medical.	în așteptare
584	Ustekinumab	Stelara	indicat în tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratament sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie au contraindicații medicale la aceste terapii	în așteptare
585	Atezolizumab	Tecentriq	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatină și ale căror tumori prezintă un nivel înalt de expresie a PD-L $\geq$ 5%	în așteptare
586	Eltrombopag	REVOLADE	indicat la pacienții adulți cu anemie aplastică severă dobândită (AAS), care au fost fie refractari la terapie imunosupresoare anterioară, fie tratați anterior în mod excesiv și care nu sunt eligibili pentru transplant de celule stem hematopoietice	în așteptare
587	Ustekinumab	Stelara	în monoterapie sau în asociere cu MTX este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu artrită psorizică activă care au avut un răspuns insuficient la tratamentul anterior cu medicamente antireumate non-biologice modificatoare ale evoluției bolii (MARMB)	în așteptare
588	Givosiran	Givlaari	indicat pentru tratamentul porfiriei hepatice acute (PHA) la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste.	în așteptare
589	Combinatii (Enalaprilum+Lercanidipinum)	Lercaril 10 mg /10 mg	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții a căror tensiune arterială nu este controlată în mod adecvat cu lercanidipină 10 mg, administrată în monoterapie.	în așteptare
590	Combinatii (Enalaprilum+Lercanidipinum)	Lercaril 20 mg /10 mg	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții a căror tensiune arterială nu este controlată în mod adecvat cu doza de enalapril de 20 mg, administrată în monoterapie.	în așteptare
591	Combinatii (Enalaprilum+Lercanidipinum)	Lercaril 20 mg /20 mg	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții adulți a căror tensiune arterială este controlată în mod adecvat cu asocierea enalapril 20 mg - lercanidipină 20 mg, substanțele active fiind administrate sub formă de comprimate separate.	în așteptare
592	Edoxabanum	Roteas 30 mg comprimate filmate	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți	în așteptare
593	Edoxabanum	Roteas 30 mg comprimate filmate	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă $\geq$ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente	în așteptare
594	Pembrolizumab	Keytruda	Indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiul III și extindere la nivelul ganglionilor limfatici, la care s-a efectuat rezecție completă	în așteptare
595	Tivozanib	Fotivda	indicat în tratamentul de primă linie la pacienții adulți cu carcinom renal (CR) (renal cell carcinoma RCC) în stadiu avansat și la pacienții adulți netratați anterior cu inhibitori ai căii VEGFR și mTOR, în caz de progresie a bolii după un tratament anterior cu citokine pentru RCC în stadiu avansat.	în așteptare
596	Lenalidomidum	Lenalidomida Sandoz	indicat în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu carora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior și pentru adulți cu mielom multiplu netratat anterior, care nu sunt eligibili pentru transplant	finalizat
597	Propranololum	Hemangiol 3,75 mg/ml soluție orală	Hemangiomi infantili	în așteptare
598	Atezolizumab	Tecentriq	În asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ (TNBC) nerezeceabil, local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, ale căror tumori prezintă o expresie a PD-L1 $\geq$ 1% și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică.	în așteptare
599	Infliximab	Remsuma	tratamentul bolii Crohn activă moderată până la severă, la pacienți adulți care nu au prezentat răspuns terapeutic în pofida efectuării unei cure terapeutice complete și adecvate cu un corticosteroid și/sau un imunosupresor; sau care nu tolerează sau prezintă contraindicații pentru astfel de terapii. • tratamentul bolii Crohn active, fistulizate, la pacienți adulți care nu au prezentat răspuns terapeutic în pofida efectuării unei cure terapeutice complete și adecvate cu tratament convențional (inclusiv antibiotice, drenaj și terapie imunosupresoare).	în așteptare
600	Infliximab	Remsuma	indicat pentru tratamentul colitei ulcerative active moderate până la severă la pacienți adulți care au prezentat răspuns terapeutic inadecvat la terapia convențională care include corticosteroizi și 6-mercaptopurină (6-MP) sau azatioprină (AZA), sau care nu tolerează sau prezintă contraindicații pentru astfel de terapii.	în așteptare
601	Tetrabenazina	Tetmodis	indicat pentru tratamentul tulburărilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington.	în așteptare
602	inhibitor al alfa1 proteinazei umane*	Respreeza	indicată în tratamentul de întreținere, pentru a încetini progresia emfizemului la adulți cu deficit sever documentat de inhibitor al alfa1 proteinazei (de exemplu genotipuri PIZZ, PiZ (null), Pi (null, null), PiSZ). Pacienții trebuie să urmeze un tratament optim farmacologic și nonfarmacologic și să prezinte semne de boală pulmonară progresivă (de exemplu valoare predictivă scăzută a 3 volumului expirator forțat pe secundă (VEMS1), afectarea capacității de mers pe jos sau creșterea numărului exacerbărilor), evaluate de către un cadru medical cu experiență în tratamentul deficitului de inhibitor al alfa1 proteinazei.	în așteptare
603	Comb (Irbesartan + Amlodipinum)	Apraxexo	indicat ca terapie de substituție pentru tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții adulți a căror tensiune arterială este deja controlată cu irbesartan și amlodipină administrate în asociere la aceleași doze ca și cele din medicamentul combinat.	în așteptare
604	Dupilumab	Dupixent	indicat pentru tratamentul dermatitei atopice forma moderată până la severă la pacienții adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	în așteptare
605	Pitolisantum	Wakix	indicat la adulți pentru tratamentul narcolepsiei cu sau fără cataplexie	în așteptare
606	Tafamidis	Vyndaque	Indicat pentru tratamentul amiloidozei cu transtiretina de tip salbatic sau ereditara la pacienții adulți cu cardiomiopatie	în așteptare
607	Pembrolizumab	Keytruda	indicat în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5-fluorouracil (5-FU) pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, metastatic sau recurent nerezeceabil, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS $\geq$ 1	în așteptare

608	Lanadelumabum	Takzhzyro	indicat pentru prevenirea de rutină a episoadelor recurente de angioedem ereditar (AEE) la pacienții cu vârsta de peste 12 ani.	in asteptare
609	Abirateronum	Zytiga	tratatamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică	in asteptare
610	Esketamina	Spravato	e indicat în asociere cu un SSRI sau un SNRI la adulții cu tulburare depresivă majoră rezistentă la tratament care nu au răspuns la cel puțin două tratamente diferite cu antidepressiv în episodul depresiv curent moderat până la sever	in asteptare
611	Dulaglutidum	Trulicity	MONOTERAPIE - când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienții pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. TERAPIE COMBINATĂ - în combinație cu alte medicamente hipoglicemice, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat.	in asteptare
612	Glyceroli Phenylbutyras	Ravicti	terapie adjuvantă pentru abordarea terapeutică cronică a pacienților cu tulburări ale ciclului ureei (TCU), inclusiv deficite de carbamil-fosfat-sintetază-I (CPS), ornitin-carbamiltransferază (OTC), argininosuccinat-sintetază (ASS), argininosuccinat-iliază (ASL), arginază I (ARG) și sindrom cu hiperornitinemie-hiperamoniemie-homocitrulinemie (HHH) cu deficit de ornitin-translocază, care nu pot fi controlate doar prin regim alimentar hipoproteic și/sau suplimentare a aminoacizilor	in asteptare
613	Tocilizumab	RoActemra	indicat pentru tratamentul arteritei cu celule gigante (ACG) la pacienții adulți.	in asteptare
614	Comb Rosuvastatinum + Ezetimibum	Suvezen	Hipercolesterolemie primară/Hipercolesterolemie familială forma homozigotă (HoFH) Suvezen este indicat în tratamentul hipercolesterolemiei primare (familială heterozigotă și nonfamilială) sau al hipercolesterolemiei familiale forma homozigotă, ca adjuvant la regimul alimentar, pentru înlocuirea tratamentului la pacienții adulți care sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină și ezetimib administrate în asociere, în aceleași doze cum există în combinația în doză fixă, dar administrate ca medicamente diferite. 2 Prevenirea evenimentelor cardiovasculare Suvezen este indicat ca tratament de substituție la pacienții adulți, care sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină și ezetimib administrate în asociere, dar ca medicamente separate, cu aceleași concentrații conținute în combinația în doză fixă, pentru a scădea riscul de apariție a evenimentelor cardiovasculare la pacienții cu boală coronariană (Coronary Heart Disease - CHD) și istoric de sindrom coronarian acut (SCA).	in asteptare
615	Diosminum	Detralex	Tratatamentul simptomelor legate de insuficiența veno-limfatică: - senzație de greutate la nivelul picioarelor; - durere; - sindromul picioarelor neliniștite. Tratatamentul simptomelor funcționale legate de criza hemoroidală.	in asteptare
616	Gilteritinib	Xospata	indicat pentru tratamentul în monoterapie al pacienților adulți cu leucemie mieloidă acută (LMA) refractară sau recidivantă cu mutație FLT3	in asteptare
617	Enzalutamidum	Xtandi	tratatamentul cancerului de prostata în stadiu metastatic la bărbați adulți cu simptomatologie absentă sau ușoară, după eșecul terapiei de deprivare androgenică, la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic ☐ tratamentul CPRC în stadiu metastatic, la bărbați adulți a căror boală a evoluat în timpul sau după administrarea terapiei cu docetaxel	in asteptare
618	Nonacog alpha (fact IX de coagulare)	BeneFix	Tratatamentul și profilaxia hemoragiei la pacienții cu hemofilia tip B (deficit congenital de factor IX). BeneFix poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.	in asteptare
619	Lorlatinibum	Lorviqua	administrat în monoterapie este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK) a căror boală a progresat după: ☐ alectinib sau ceritinib ca primă terapie cu inhibitor tirozin-kinazic (TKI) al ALK; sau ☐ crizotinib și cel puțin un alt ALK TKI.	in asteptare
620	Tofacitinib	Xeljanz	Tofacitinib în asociere cu metotrexat (MTX) este indicat în tratamentul poliartritei reumatoide (PR) active, moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la, sau care nu tolerează unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii. 3 Classified as public by the European Medicines Agency Tofacitinib poate fi administrat ca monoterapie în caz de intoleranță la MTX sau atunci când tratamentul cu MTX nu este adecvat	in asteptare
621	Denosumab	Prolia	Tratatamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză și la bărbații cu risc crescut de fracturi. La femeile în postmenopauză Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale și de șold.	in asteptare
622	Brolucizumab	Beovu	indicat la adulți pentru tratamentul degenerescenței maculare legată de vârstă (DMLV), forma neovasculară (umedă).	in asteptare
623	Upadacitinibum	Rinvoq	este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, moderate până la severe, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat sau prezintă intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală (MARMB). RINVOQ poate fi utilizat în monoterapie sau în asociere cu metotrexat.	in asteptare
624	Acidum Obeticholicum	Ocaliva	este indicat pentru tratamentul colangitei biliare primitive (cunoscută și sub denumirea de ciroză biliară primitivă) în combinație cu acidul ursodeoxicolic (UDCA) la adulți cu răspuns inadecvat la UDCA sau ca monoterapie la adulți care nu pot tolera UDCA.	in asteptare
625	Lumacaftorum+Ivacaftorum	Orkambi	este indicat pentru tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC) cu vârsta de 6 ani și peste, cu genotip homozigot pentru mutația F508del la nivelul genei numită „regulator de conductanță transmembranară al fibrozei chistice	finalizat
626	Enzalutamidum	Xtandi	este indicat pentru: tratamentul CPRC în stadiu metastatic la bărbați adulți cu simptomatologie absentă sau ușoară, după eșecul terapiei de deprivare androgenică, la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic	in asteptare
627	Atezolizumabum	Tecentriq	în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatină este indicat pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronho-pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC), fără celule scuamoase, metastazat, la pacienții adulți. La pacienții cu NSCLC ALK-pozitiv sau cu mutații EGFR, utilizarea Tecentriq în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatină este indicată numai după eșecul terapilor țintite corespunzătoare	in asteptare
628	Ketoconazolum	Ketoconazole HRA	indicat pentru tratamentul sindromului Cushing endogen la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani.	in asteptare
629	Luspatercept	Reblozyl	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii asociată cu beta-talasemie	in asteptare
630	Luspatercept	Reblozyl	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii ca urmare a sindroamelor mielodisplazice (SMD) cu risc foarte scăzut, scăzut și intermediar cu sideroblaști inelari, care au prezentat un răspuns nesatisfăcător la sau sunt ineligibili pentru tratamentul cu eritropoietină	in asteptare
631	Dupilumab	Dupixent	indicat pentru tratamentul dermatitei atopice forma moderată până la severă la adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	in asteptare
632	Avelumab	Bavencio	în asociere cu axitinib este indicat ca tratament de primă linie la pacienți adulți cu carcinom renal (CR) avansat	in asteptare
633	Durvalumab	Imfinzi	administrat concomitent cu etopozidă și carboplatină sau cisplatină este indicat în tratamentul de primă linie pentru pacienți adulți cu cancer bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extensiv (ES-SCLC)	in asteptare
634	Metreleptin	Myalepta	indicat ca adjuvant pe lângă regimul alimentar ca terapie de substituție pentru tratamentul complicațiilor cauzate de deficitul de leptină la pacienți cu lipodistrofie (LD): • cu LD parțială familială diagnosticată sau LD parțială dobândită (sindrom Barraquer-Simons), la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste	in asteptare
635	Metreleptin	Myalepta	indicat ca adjuvant pe lângă regimul alimentar ca terapie de substituție pentru tratamentul complicațiilor cauzate de deficitul de leptină la pacienți cu lipodistrofie (LD): • cu LD generalizată congenitală diagnosticată (sindrom Berardinelli-Seip) sau LD generalizată dobândită (sindrom Lawrence), confirmată, la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste 3	in asteptare
636	Metyparonum	Metopirone	abordarea terapeutică a sindromului Cushing	in asteptare
637	Guselkumab	Tremfya	singur sau în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la un tratament anterior cu medicament antireumatic modificator al bolii (DMARD)	in asteptare
638	Simoctocog Alfa	Nuwiq	Tratatamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).	in asteptare

639	Ustekinumabum	Stelara	tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratament sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie au contraindicații medicale la aceste terapii	în așteptare
640	Lenalidomida	Lenalidomida Alvogen	tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu	finalizat
641	Indacaterolum +Glicopironium Bromidum+Mometasonum	Enerzair Breezhaler 114 micrograme/46 micrograme/136 micrograme pulbere de inhalat capsule	tratamentul de întreținere al astmului la pacienții adulți care nu sunt controlați adecvat cu un tratament de întreținere combinat care constă în asocierea dintre un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune și o doză mare de corticosteroid în administrare inhalatorie, care au prezentat una sau mai multe exacerbări astmatice în anul anterior	în așteptare
642	Indacaterolum+Mometasonum	Aectura Breezhaler 125 micrograme/62,5 micrograme, pulbere de inhalat, capsule; Aectura Breezhaler 125micrograme/127,5 micrograme, pulbere de inhalat, capsule; Aectura Breezhaler 125 micrograme/260 micrograme, pulbere de inhalat, capsule	tratamentul de întreținere al astmului la pacienții adulți și copii cu vârsta de 12 ani și peste care nu sunt controlați adecvat cu terapie cu cortizoni în administrare inhalatorie și agonști cu durată scurtă de acțiune beta2-adrenergici cu administrare inhalatorie	în așteptare
643	Gemtuzumab ozogamicin	Mylotarg	indicat în asociere cu daunorubicină (DNR) și citarabină (AraC) pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 15 ani și peste, cu leucemie mieloidă acută (LMA), cu , CD33 pozitiv, de novo, netratată anterior, cu excepția leucemiei promielocitare acute (LPA)	în așteptare
644	Siponimod	Mayzent	indicat pentru tratarea pacienților adulți cu scleroză multiplă secundară progresivă (SPMS), cu boală activă evidențiată prin recidive sau caracteristici imagistice ale activității inflamatorii	în așteptare
645	Lanadelumabum	Takhzyro	prevenirea de rutină a episoadelor recurente de angioedem ereditar (AEE) la pacienții cu vârsta de peste 12 ani.	în așteptare
646	dipropionat de beclometazonă	Trimbow 87/5/9	Tratament de întreținere pentru astm bronșic, la adulții a căror afecțiune nu este controlată în mod adecvat cu o terapie de întreținere cu asocierea între un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune și un corticosteroid în doză medie, cu administrare inhalatorie, care au prezentat una sau mai multe exacerbări ale astmului bronșic în anul anterior	în așteptare
647	dipropionat de beclometazonă	Trimbow 87/5/9	Tratament de întreținere la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) moderată până la severă, care nu sunt tratați în mod adecvat cu ajutorul unei asocieri între un corticosteroid cu administrare inhalatorie și un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată sau cu o asociere dintre un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată și un antagonist muscarinic cu durată lungă de acțiune (pentru efectele asupra controlului simptomelor și prevenirea exacerbări	în așteptare
648	Treprostinil	Tresuvi	Tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) idiopatice sau ereditare, pentru a îmbunătăți toleranța la efort și simptomele bolii la pacienții incluși în clasa funcțională III, conform clasificării New York Heart Association (NYHA).	în așteptare
649	Bavencio	Avelumab	în asociere cu axitinib este indicat ca tratament de primă linie la pacienții adulți cu carcinom renal (CR) avansat	în așteptare
650	ibrutinibum	Imbruvica	LLC	în așteptare
651	Opium	Dropizol	indicat în tratamentul diareei severe, cum este diareea provocată de medicamente citostatice, radioterapie sau tumori neuroendocrine, în care administrarea altor tratamente antidiareice nu determină un efect suficient.	în așteptare
652	Eltrombopag	Revolade	indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste, cu trombocitopenie imună primară (TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	în așteptare
653	Ramucirumabum	Cyramza	în monoterapie este indicat în tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular în stadiu avansat sau nerezeceabil cu o valoare a alfa fetoproteinei serice (AFP) ≥ 400 ng/ml, care au fost tratați anterior cu sorafenib.	în așteptare
654	Ramucirumabum	Cyramza	în asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune Eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină. este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune Eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat	în așteptare
655	Ramucirumabum	Cyramza	în combinație cu erlotinib este indicat ca primă linie de tratament a pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici care prezintă mutații activatoare ale receptorului factorului de creștere epidermal (EGFR)	în așteptare
656	Olaparibum	Lynparza	în asociere cu bevacizumab este indicat ca tratament de întreținere la pacientele adulte cu carcinom ovarian epitelial de grad înalt în stadiu avansat (stadiile III și IV FIGO), neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară, care prezintă răspuns (complet sau parțial) după finalizarea primei linii de tratament cu chimioterapie pe bază de platină în combinație cu bevacizumab și tumori cu status pozitiv 21 pentru deficitul de recombinare omologă (DRO), definit fie ca mutație BRCA1/2 și/sau instabilitate genomică	în așteptare
657	Olaparibum	Lynparza	ca monoterapie în tratamentul de întreținere la pacientele adulte cu carcinom ovarian epitelial de grad înalt recidivat, neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară recidivată, sensibile la medicamente pe bază de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe bază de platină.	în așteptare
658	Combinatii (Insulinum Degludec + Liraglutidum)	Xultophy	indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, în vederea îmbunătățirii controlului glicemiei, ca tratament adăugat la regimul alimentar și exerciții fizice, în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat	în așteptare
659	Combinatii (Insulinum Degludec + Insulinum Aspart)	Ryzodeg	Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 2 ani.	în așteptare
660	Treprostinilum	Trepulmix	indicat în tratamentul pacienților adulți cu Clasa Funcțională (CF) III sau IV conform OMS și: – hipertensiune arterială pulmonară cronică tromboembolică (HTAPCT) inoperabilă sau – HTAPCT persistentă sau recurentă post-tratament chirurgical în vederea îmbunătățirii capacității de efort	în așteptare
661	Ixekizumabum	Taltz	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la copii începând cu vârsta de 6 ani și cu greutate corporală de minim 25 kg și la adolescenți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.	în așteptare
662	Ixekizumabum	Taltz	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu spondiloartrită axială non-radiografică, cu semne obiective de inflamație indicate de concentrațiile crescute de proteină C reactivă (PCR) și/sau de examenul imagistic prin rezonanță magnetică nucleară (RMN), al căror răspuns la tratamentul cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) a fost inadecvat	în așteptare
663	Galcanezumab	Emgality	indicat pentru profilaxia migrenei la adulții care au cel puțin 4 zile de migrenă pe lună.	în așteptare
664	Brigatinibum	Alunbrig	indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu CPNMC avansat, pozitiv pentru ALK, tratați anterior cu crizotinib.	în așteptare
665	Brigatinibum	Alunbrig	indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar non-microcelular (CPNMC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), care nu au fost tratați anterior cu un inhibitor de ALK.	în așteptare
666	Brentuximab vedotin	Adcetris	în asociere cu ciclofosamidă, doxorubicină și prednison (CHP) este indicat pentru 3 pacienți adulți cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs) netratat anterior	în așteptare
667	Vedolizumab	Entyvio	colita ulcerativă și boala Crohn	în așteptare
668	Dapagliflozin	Forxiga	indicat pentru tratamentul pacienților adulți simptomatici cu insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejeție redusă.	în așteptare
669	Combinatii(Formerolum+Glicopironium+B udesonidum)	Trixeo Aerosphere	este indicat ca tratament de întreținere la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) moderată până la severă, care nu sunt tratați în mod adecvat cu o asociere dintre un corticosteroid cu administrare inhalatorie și un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune sau cu o asociere dintre un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune și un antagonist muscarinic cu durată lungă de acțiune	în așteptare
670	Secukinumab	Cosentyx	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la copii și adolescenți, începând cu vârsta de 6 ani, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	în așteptare
671	Luspatercept	Reblozyl	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii asociată cu beta-talasemie	în așteptare
672	Luspatercept	Reblozyl	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii asociată cu beta-talasemie	în așteptare

673	Palivizumabum	Synagis	indicat pentru prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare, determinate de virusul sincițial respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR: • Copiii născuți la 35 săptămâni de gestație sau mai puțin și cei cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR. • Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni. • Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și cu boli cardiace congenitale semnificative din punct de vedere hemodinamic.	in asteptare
674	imunoglobulină umana normala	Hyqvia	Terapie de substituție la adulți, adolescenți și copii (0-18 ani) în: • Sindroame de imunodeficiență primară cu producere de anticorpi afectată (vezi pct. 4.4). • Imunodeficiențe secundare (IDS) la pacienții care suferă de infecții grave sau recurente, cu tratament antimicrobian ineficient și, fie cu insuficiență confirmată de anticorpi specifici (PSAF)*, fie cu un nivel de IgG seric de < 4 g/L. *PSAF = incapacitatea de a crește de cel puțin două ori titrul de anticorpi IgG la vaccinurile pneumococic polizaharidic și cu antigene polipeptidice	in asteptare
675	Benralizumabum	Fasenra	astm bronic	in asteptare
676	Mogamulizumab	Poteligeo	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu micozis fungoid (MF) sau sindrom Sézary (SS) cărora li s-a administrat anterior cel puțin o terapie sistemică.	in asteptare
677	Ertugliflozinum + Sitagliptinum	Steglujan	indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2, ca adjuvant la dietă și exercițiul fizic, pentru îmbunătățirea controlului glicemic: ï atunci când utilizarea metforminului și/sau a unei sulfoniluree (SU) și a uneia dintre substanțele active ale Steglujan nu asigură un control glicemic adecvat. ï la pacienții care sunt deja sub tratament cu asocierea dintre ertugliflozin și sitagliptin, sub formă de comprimate separate	in asteptare
678	Selexipagum	Upravi	indicat pentru tratamentul de lungă durată al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacienții adulți cu clasă funcțională (CF) OMS II–III fie ca tratament asociat la pacienții controlați insuficient cu un antagonist al receptorilor endotelinei (ARE) și/sau cu un inhibitor al fosfodiesterazei de tip 5 (PDE-5) fie în monoterapie la pacienții care nu sunt candidați pentru aceste tratamente	in asteptare
679	Glasdegib	Daurismo	indicat, în asociere cu citarabina în doză mică, pentru tratamentul leucemiei acute mieloidă (LAM) nou diagnosticate de novo sau secundară la pacienții adulți care nu sunt eligibili pentru chimioterapia de inducție standard.	in asteptare
680	Vedolizumabum	Entyvio	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală (TNFα). indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală (TNFα).	in asteptare
681	pertuzumab / trastuzumab	Phesgo	Cancer mamar incipient (CMI) indicat pentru utilizare în asociere cu chimioterapie pentru: • tratamentul neoadjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc crescut de recurență (vezi pct. 5.1) • tratamentul adjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER 2 pozitiv, în stadiu incipient, cu risc crescut de recurență (vezi pct. 5.1). Cancer mamar metastazat (CMM) Phesgo este indicat pentru utilizare în asociere cu docetaxel la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv metastazat sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.	in asteptare