

Nr crt	DCI	DC	INDICAȚIE	Stadiu
1	Regorafenibum	Stivarga	Tratamentul adulților cu neoplasm colorectal (NCR) metastatic cărora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe baza de fluoropirimidina, un tratament anti-VEGF și un tratament anti EGFR	Finalizat
2	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de monoterapie dacă dieta și exercitiile fizice nu asigură un control coresuscunător al glicemiei la pacienți la care utilizarea metforminului nu este adecvată din cauza intoleranței sau tratament adjuvant asociat în asociere cu alte medicamente care scad concentrația plasmatică de glucoză, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercitiile fizice, nu asigură un control glicemic coresuscunător.	Finalizat
3	Vildagliptinum	Galvus	Vildagliptin este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la adulți: În monoterapie - la pacienți cu control adecvat numai prin regim alimentar și exerciții și pentru care metformina nu este recomandată datorită contraindicațiilor sau intoleranței. Ca tratament oral dublu, în asociere cu - metformina, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerate de metformina în monoterapie, - o sulfoniluree, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerate de sulfoniluree și pentru care tratamentul cu metformina este recomandabil din cauza contraindicațiilor sau intoleranței, - o tiazolidindionă, la pacienții cu control glicemic insuficient și la care este indicată utilizarea unei tiazolidindione. Ca tratament oral triplu, în asociere cu - o sulfoniluree și o metformina când exercitiile fizice împreună cu tratamentul dual cu aceste medicamente nu asigură un control glicemic adecvat. Vildagliptin este, de asemenea, indicată pentru administrarea în asociere cu insulina (cu sau fără metformina) când regimul alimentar și exercitiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
4	Saxagliptinum	Onglyza 2,5mg și 5mg	Onglyza este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia asociere cu alte medicamente antidiabetice orale (ADO), dubla în asociere cu metformin, atunci când monoterapia cu metformin, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, o sulfoniluree, atunci când monoterapia cu sulfoniluree, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care administrarea de metformin este considerată inadecvată, o tiazolidindionă, atunci când monoterapia cu tiazolidindionă, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, la pacienții la care administrarea unei tiazolidindione este considerată adecvată, în terapia orală triplă în asociere cu metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
5	Ustekinumabum	Stelara	Stelara este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen și ultraviolete A).	Finalizat

6	Riociguat	Adempas	Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv.	Finalizat
7	Febuxostatium	Adenuric	Tratamentul Hiperuricemiei cronice in bolile in care depunerea de urati a avut deja loc (inclusiv toful gutos si/sau artrita gutoasa in antecedente sau in prezent). Adenuric este indicat pentru adulti.	Finalizat
8	Belimumab	Benlysta	Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacientii adulti cu lupus eritematos sistemis (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad inalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNc pozitivi si complement seric scazut) in ciuda terapiei standard.	Finalizat
9	Bromura de aclidinium	Bretaris Genuair 322micrograme	Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacientii adulti.	Finalizat
10	Certolizumab Pegol	Cimzia 200mg	Artrita psoriazica. Cimzia, in asociere cu MTX, este indicat in tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie in cazul intolerantei la metotrexat sau cand continuarea tratamentului cu metotrexat este inadecvata. Tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat.	Finalizat
11	Duodart (Dutasterida + Clorhidrat de Tamsulosin)	Duodart	Tratamentul simptomelor moderate pana la severe ale hiperplaziei benigne de prostata (HBP). Reducerea riscului de retentie acuta de urina (RAU) si a necesitatii interventiilor chirurgicale la pacientii cu simptome moderate pana la severe de HBP.	Finalizat
12	Degarelix	Firmagon	Firmagon este un antagonist al hormonului eliberator de gonadotrofina (GnRH) indicat pentru tratamentul pacientilor adulti de sex masculin cu cancer de prostata hormono-dependent in stadiu avansat.	Finalizat
13	Ulipristal Acetat	Esmya	Tratamentul preoperator al simptomelor moderate pana la severe ale fibroamelor uterine la femeile adulte aflate la varsta fertila.	Finalizat
14	Ethionamidum	Etionamida ATB	Medicament tuberculostatic de linia a II la pacientii cu rezistenta la medicatia antituberculoasa de linia I.	Finalizat

15	Carboximaltoza ferica	Ferinject	Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei asociate cu insuficienta renala cronica pentru pacientii in predializa.	Finalizat
16	Carboximaltoza ferica	Ferinject	Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei prin deficit de fier asociate bolilor inflamatorii intestinale.	Finalizat
17	Denosumab	Xgeva	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.	Finalizat
18	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie daca dieta si exercitiile fizice nu asigura un control coresunzator al glicemiei la pacienti la care utilizarea metforminului nu este adecvata din cauza intolerantei.	Finalizat
19	Dipropinat de beclometazona anhidru / fumarat de formoterol dihidrat	Foster	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la pacienti care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
20	Lantanum	Fosrenol	Fosrenol este indicat, de asemenea, pacienților adulți cu boală renală cronică , nedializați, având nivelul concentrației plasmatice de fosfat $\geq 1,78$ mmol/L, la care exclusiv dieta săracă în fosfat este insuficientă pentru a controla nivelul fosfaților.	Finalizat
21	Everolimus	Afinitor	Cancer mamar in stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenti, cu HER2/neu negativ, administrat in combinatie cu exemestane, la femeile in postmenopauza, fara boala viscerală simptomatica, dupa recurenta sau progresia bolii in urma administrarii unui inhibitor de aromataza non-steroidal.	Finalizat
22	Everolimus	Afinitor	Carcinom celular renal avansat, care au inregistrat progresie a bolii la sau in urma tratamentului cu terapie tintita asupra FCEV (factor de crestere endoteliala vasculara).	Finalizat
23	Eplerenona	Inspra	In asociere cu tratamentul standard optim pentru scaderea riscului mortalitatii si morbiditatii cardiovasculare la pacienti adulti cu insuficienta cardiaca (cronica) clasa II NYHA si disfunctie ventriculara stanga (FEVS $\leq 30\%$).	Finalizat
24	Canagliflozin	Invokana	Invokana este indicat la dulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic fiind administrat ca monoterapie (in cazul in care doar prin dieta si exercitii fizice nu se obtine un control glicemic adecvat la pacientii la care utilizarea de metformin este inadecvata datorita intolerantei sau contraindicatiilor) sau terapie adjuvanta (terapie adjuvanta la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci cand acestea, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control glicemic adecvat).	Finalizat
25	Everolimus	Afinitor	Tumori neuroendocrine, nerezectabile sau metastatice, bine sau moderat diferite, de origine pancreatica, la adulti cu boala progresiva.	Finalizat
26	Gefitinibum	Iressa	Iressa este indicata pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR TK (linia all-a).	Finalizat
27	Gefitinibum	Iressa	Tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC - non small cell lung cancer), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR_TK.	Finalizat
28	Alemtuzumab	Lemtrada	Pacientii adulti cu scleroza multipla recurent-remisiva (SMRR), cu boala activa, definita prin caracteristici clinice sau imagistic.	Finalizat
29	Minocyclinum	Minoz MR	Tratamentul acneei	Finalizat
30	Fotemustinum	Mustophoran	Melanom malign diseminat cu metastaze cerebrale	Finalizat
31	Rotigotinum	Neupro	Tratamentul simptomatic al sindromului picioarelor nelinistite idiopatic, moderat pana la sever	Finalizat
32	Nepafenac	Nevanac	Prevenirea si tratamentul durerilor si inflamatiilor postoperatorii asociate cu operatia de cataracta.	Finalizat
33	Simeprevirum	Olysio	Olysio, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.	Finalizat

34	Tapentadolum	Palexia	Palexia retard este indicat la adulti pentru abordarea terapeutica a durerilor cronice severe care pot fi tratate adecvat numai cu analgezice opioide.	Finalizat
35	Dabigatran Etexilat	Pradaxa	Preventia accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacienti adulti cu fibrilatie atriala non-valvulare (FANV) ce prezinta unul sau mai multi dintre urmatorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral, atac ischemic tranzitoriu (AIT), varsta ≥ 75 ani, insuficienta cardiaca (NYHA $\geq$ II), diabet zaharat, hipertensiune arteriala.	Finalizat
36	Perindopril argininum + Amlodipinum	Prestance	Hipertensiune arteriala	Finalizat
37	Perindopril argininum + Amlodipinum	Prestance	Boala coronariana stabila	Finalizat
38	Denosumab	Prolia	Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.	Finalizat
39	Furoat de fluticazona/vilanterol	Relvar Ellipta	Relvar Ellipta este indicat in tratamentul regulat la astmul bronic la adulti si adolescenti cu varsta de 12 ani si peste, la care este adecvata utilizarea unui medicament combinat (beta ₂ agonisti cu durata lunga de actiune si corticosteroizi cu administrare inhalatorie): Pacienti la care nu se obtine un control adecvat prin terapia cu corticosteroizi cu administrare inhalatorie si beta ₂ agonisti cu durata scurta de actiune cu administrare inhalatorie, utilizata la nevoie.	Finalizat
40	Fluticazona/ Vilanterol	Relvar Ellipta	Relvar Ellipta este indicat în tratamentul simptomatic al adulților cu BPOC cu VEMS <70% din valoarea predictibilă normală (post-bronhodilatator) și cu un istoric de exacerbări, în ciuda administrării regulate a unei terapii bronhodilatatoare.	Finalizat
41	Agalsidasum alfa	Replagal	Replagal este indicat pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiență de α -galactosidază A).	Finalizat
42	Eltrombopag olamina	Revolade	Revolade este indicat pentru tratamentul adulților cu infecție cu virusul hepatic C (VHC) pentru tratamentul trombocitopeniei, în situațiile în care gradul de trombocitopenie este factorul principal care împiedică inițierea sau limitează posibilitatea menținerii unei terapii optime pe baza de interferon.	Finalizat
43	Bendamustinum	Ribovact	Tratament de prima linie în Leucemia Limfatică Cronică (LLC), Binet stadiu B sau C, la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabina.	Finalizat
44	Bendamustinum	Ribovact	Tratament de prima linie în mielomul multiplu (MM), Durie-Salmon stadiu II cu progresie sau stadiu III, în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomida sau bortezomib.	Finalizat
45	Conestat Alfa	Ruconest	Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adulții cu angioedem ereditar (AEE) cauzat de deficitul de inhibitor al C1-esterazei.	Finalizat
46	Tafluprostum	Saflutan	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții adulți cu vârsta ≥ 18 ani cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: • care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți • care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie • care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante.	Finalizat
47	Nalmefen	Selincro	Reducerea consumului de alcool la pacienții adulți cu dependență de alcool și care au un risc crescut de consum de alcool, fara simptome somatice de sevraj si care nu necesita in mod imediat tratament detoxifiant	Finalizat
48	Bedaquilinum	Sirturo	Sirturo este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezidenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.	Finalizat
49	Ustekinumabum	Stelara	Stelara, in monoterapie sau in asociere cu MTX este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu artrita psoriazica activa care au avut un raspuns infuficient la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice non-biologice modificatoare ale evolutiei bolii (MARMB).	Finalizat
50	Lapatinib	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm mamar, ale caror tumori exprima HER2 (ErbB2) in exces in asociere cu trastuzumab, la pacientii cu boala metastatica cu receptori hormonal absentii, progresiva in urma unor terapii anterioare ce trastuzumab in combinatie cu chimioterapie.	Finalizat

51	Regorafenibum	Stivarga	Stivarga este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu tumori stromale gastro-intestinale (GIST- Gastrointestinal stromal tumor) nerezectabil sau metastatice care au progresat sau care nu au tolerat tratamentul anterior cu imatinib si sunitinib.	Finalizat
52	Oxycodonom/Naloxonom	Targin	Dureri severe, care pot fi tratate in mod adecvat numai cu analgezice opioide. Naloxona, antagonist opioid este adaugata pentru a contracara constipatia indusa de opioide prin antagonizarea actiunii oxicodei la nivelul receptorilor opioizi locali, in intestin.	Finalizat
53	Imunoglobulina Anti-Limfocite	Thymoglobuline	Tratamentul anemiei aplastice	Finalizat
54	Fesoterodina	Toviaz	Tratamentul simptomelor (polakiurie si/sau mictiuni imperioase si/sau incontinenta imperioasa) care pot surveni la pacientii adulti cu sindrom de vezica hiperactiva.	Finalizat
55	Atosiban	Tractocile	Tractocile este indicat pentru intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte cu: • contractii uterine regulate, cu durata de cel putin 30 secunde, cu o frecventa de ≥ 4 si 30 minute; • dilatație cervicala de 1 pana la 3 cm (0-3 cm la nulipare) si stergere a colului uterin de $\geq 50\%$; • varsta ≥ 18 ani; • varsta sarcinii cuprinsa intre 24 si 33 de saptamani complete; • frecventa normala a batailor cardiace fetale. Intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte.	Finalizat
56	Telmisartan+Amlodipna	Twynsta	Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale la adulti. Terapie de asociere. Indicata la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu amlodipina. Terapie de substitutie. Pacientilor adulti la care tensiunea arteriala esentiala este controlata adecvat si carora li se administreaza telmisartan si amlodipina sub forma de monoterapie li se pot administra in schimb comprimate de Twynsta care contin in compozitie aceleasi doze	Finalizat
57	Agomelatinum	Valdoxan	Tratamentul episoadelor depresive majore la adulti	Finalizat
58	Sildenafil	Urorec 4mg/8mg	Tratamentul semnelor si simptomelor hiperplaziei prostatice benigne (HPB) pentru grupurile speciale de pacienti, cu insuficienta renala si hepatica.	Finalizat
59	Cilostazol	Velyn	Claudicatie intermitenta fara semne de necroza a tesutului periferic (boala arteriala periferica stadiul II Fontaine)	Finalizat
60	Lacosamidum	Vimpat	Vimpat este indicat ca terapie adjuvanta in tratamentul crizelor convulsive partiale, cu sau fara generalizare secundara, la pacientii adulti si adolescenti (16-18 ani) cu epilepsie.	Finalizat
61	Paliperidonum Palmitat	Xeplion	XEPLION este indicat in tratamentul de intretinere al schizofreniei la apacientii adulti stabilizati cu paliperidona sau risperidona. La pacientii adulti selectati cu schizofrenie si care au raspuns anterior la administrarea orala a paliperidonei sau risperidonei, se poate administra XEPLION fara stabilizare anterioara cu un tratament pe cale orala daca simptomele psihotice sunt usoare pana la moderate si este necesar un tratament injectabil cu eliberare prelungita.	Finalizat
62	Trastuzumabum	Herceptin	Trastuzumabum (Herceptin) in asociere cu capecitabina sau 5-fluorouracil si cisplatina este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu adenocarcinom gastric metastatic HER2 pozitiv sau a jonctiunii gastroesofagiene, carora nu li s-a administrat anterior tratament impotriva cancerului pentru boala lor metastatica.	Finalizat
63	Vismodegib	Erivedge	Erivedge este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu: carcinom bazocelular metastatic simptomatic sau carcinom bazocelular avansat local, inadecvat pentru interventie chirurgicala sau radioterapie.	Finalizat
64	Abirateronum	Zytiga	Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti care sunt asimptomatici sau usor simptomatici dupa esecul terapiei de privare de androgeni si la care chimioterapia nu este inca indicata din punct de vedere clinic.	Finalizat
65	Furoat de fluticazona	Avamys	Avamys este indicat pentru tratamentul simptomelor rinitei alergice. Avamys este indicat la adulti, adolescenti si copii (cu varsta de 6 ani peste).	Finalizat
66	Bosutinib	Bosulif	Bosulif este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu leucemie mieloida cronica cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) in faza cronica (FC), faza accelerata (FA) sau faza blastica (FB), tratati anterior cu unul sau mai multi inhibitori de tirozinaza si la care administrarea de imatinib, nilotinib si dasatinib nu este considerata o optiune terapeutica adecvata.	Finalizat
67	Toxina botulinica	Dysport	Ca medicație adjuvantă fizioterapiei, pentru reducerea spasticității membrului superior, apărută ca urmare a unui accident vascular cerebral -prezentând astfel un beneficiu semnificativ pentru pacientul adult.	Finalizat
68	Dalteparin	Fragmin	Tratamentul de durata al tromboemboliei venoase simptomatice (TEV) pentru prevenirea recurentei TEV la pacientii cu cancer	Finalizat

69	Bevacizumabum	Avastin	Neoplasm ovarian epitelial, neoplasm de trompe uterine si neoplasm peritoneal primar.	Finalizat
70	Fenilbutirat de Sodiu	Ammonaps	Ammonaps este indicat ca adjuvant in tratamentul cronic al tulburarilor de ciclu ureic, incluzand deficienta de carbamil-fosfat-sinteza, ornitin-transcarbamilaza sau argininosuccinat-sinteza.	Finalizat
71	Ofatumumab	Arzerra	Arzerra, in asociere cu clorambucil sau bendamustina, este indicat in tratamentul pacientilor cu LLC care nu au primit tratament anterior si care nu sunt eligibili pentru tratamentul pe baza de fludarabina.	Finalizat
72	Teriflunomidum	Aubagio	Este indicat la adulti, pentru tratamentul pacientilor cu scleroza multipla recurent-remisiva.	Finalizat
73	Cabazitaxelum	Jevtana	Jevtana este indicat, in asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacientilor cu cancer de prostata metastazat hormono-rezistent, tratati anterior dupa o schema de tratament continand docetaxel.	Finalizat
74	Bilastinum	Borenar	Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice (sezoniere si perene).	Finalizat
75	Bilastinum	Borenar	Tratamentul simptomatic al urticariei.	Finalizat
76	Combinatii (Candesartan cilexetil+Amlodipin)	Caramlo	Terapie de substitutie la pacientii adulti cu hipertensiune arteriala esentiala a caror tensiune arteriala este controlata adecvat cu amlodipina si candesartan administrate concomitent in aceleasi doze	Finalizat
77	Bisoprololum + Amlodipinum	Concor AM	Concor AM este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale ca terapie de substitutie pentru pacientii la care s-au administrat separat medicamentele individuale in acelasi regim de dozaj ca si in combinatie.	Finalizat
78	Ivabradinum	Corlentor	Tratamentul insuficientei cardiace cronice. Ivabradina este indicata in insuficienta cardiaca cronica clasa II-IV NYHA cu disfunctie sistolica, la pacientii in ritm sinus al caror frecventa cardiaca este ≥ 75 bpm, in asociere cu terapia standard incluzand beta-blocante sau atunci cand tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat.	Finalizat
79	Toxina botulinica	Dysport	Torticlis spastic/distonie cervicala (adulti)	Finalizat
80	Toxina botulinica	Dysport	Paralizii spastice la copii cu varsta de doi ani sau peste, cu infirmitate motorie cerebrala cum este deformarea dinamica, datorata spasticitatii - picior equin	Finalizat
81	Lapatinibum	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm mamar, ale caror tumori exprima HER2 (ErbB2) in exces: in asociere cu trastuzumab, la pacientii cu boala metastatica cu receptori hormonalii absenti, progresiva in urma unor terapii anterioare cu trastuzumab in combinatie cu chimioterapie	Finalizat
82	Conestat alfa	Ruconest	Episoade acute de angioedem la adulti cu angioedem ereditar (aee) datorat deficitului de inhibitor al C1-esterazei	Finalizat
83	Dabigatran Etxilat	Pradaxa	Preventia primara a evenimentelor tromboembolice venoase la pacientii adulti care au suferit o interventie chirurgicala electiva de inlocuire completa de sold sau o interventie chirurgicala de inlocuire completa a genunchiului.	Finalizat
84	Afliberceptum	Zaltrap	Zaltrap in asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de tratament pe baza de oxaliplatin.	Finalizat
85	Candesartanum Cilexetil + HCT	Canzeno HCT 8mg/12.5mg	Tratamentul hipertensiunii esentiale insuficient controlata prin monoterapie cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.	Finalizat
86	Sitagliptinum + Metforminum	Janumet	Pentru pacientii adulti cu diabet zaharat de tip 2, Janumet este indicat: ●ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin in monoterapie sau la cei care au fost deja tratati cu asocierea dintre sitagliptin si metformin. ●sub forma de terapie tripla in asociere cu o sulfoniluree ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si o sulfoniluree. ● sub forma de terapie tripla, in asociere cu un agonist al receptorilor gama activati de proliferatorul peroxizomilor (PPAPy) (adica, o tiazolidindiona) ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si un agonist PPARy. ● sub forma de terapie adaugata tratamentului cu insulina (terapie tripla), ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii la care doza stabilita de insulina si metformin in monoterapie nu realizeaza un control glicemic adecvat.	Finalizat
87	Saxagliptinum + Metforminum	Komboglyze	Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu terapie combinata tripla (cu ADO)). Ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima tolerata de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat

88	Saxagliptinum	Onglyza 2,5mg si 5mg	Onglyza este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2, in scopul imbunatatirii controlului glicemic in terapia combinata, in asociere cu insulina (cu sau fara metformin), cand acest tratament, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
89	Epoetinum Zeta	Retacrit	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficientei renala cronica (IRC) la pacientii adulti, adolescenti si copii: - Tratamentul anemiei asociate cu insuficienta renala cronica la pacientii adulti, copii si adolescenti supusi hemodializei si la pacientii adulti supusi dializei peritoneale. - Tratamentul anemiei simptomatice severe de etiologie renala la pacientii adulti cu insuficienta renala care nu sunt inca supusi dializei.	Finalizat
90	Epoetinum Zeta	Retacrit	Retacrit poate fi folosit pentru cresterea disponibilului de sange autolog la pacientii incadrati intr-un program de pre-donare. Decizia utilizarii in aceasta indicatie trebuie cantarita si in functie de riscul raportat de evenimente tromboembolice. Tratamentul trebuie administrat numai pacientilor cu anemie moderata (fara deficit de fier) daca procedurile de conservare a sangelui nu sunt disponibile sau sunt insuficiente atunci cand interventiile chirurgicale electiv majore planificate necesita volume mari de sange (4 sau mai multe unitati de sange pentru femei sau 5 sau mai multe unitati pentru barbati).	Finalizat
91	Epoetinum Zeta	Retacrit	Tratamentul anemiei si reducerea nevoilor transfuzionale la pacienti adulti tratati prin chimioterapie pentru tumori solide, limfoame maligne sau mieloame multiple, si care prezinta risc la primirea transfuziei, dupa cum indica starea generala a pacientului (de exemplu: statusul cardiovascular, anemia preexistenta la inceputul tratamentului prin chimioterapie).	Finalizat
92	Epoetinum Zeta	Retacrit	Retacrit poate fi folosit pentru reducerea expunerii la transfuzii de sânge alogene la pacienții adulți fără deficit de fier, înaintea intervențiilor chirurgicale ortopedice electiv majore, care au un risc potențial crescut de a prezenta complicații ale transfuziei. Utilizarea trebuie limitată la pacienții cu anemie moderată (de exemplu Hb 10-13 g/dl) care nu sunt încadrați într-un program de pre-donare de sânge autolog și la care se așteaptă pierderi sânge moderate (900-1 800 ml).	Finalizat
93	Naproxenum + Esomeprazolum	Vimovo	Tratamentul simptomatic al osteoartritei, poliartritei reumatoide si spondilitei anchilozate la pacientii cu risc de aparitie a ulcerului gastric si/sau duodenal ca urmare a administrarii medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) si atunci cand tratamentul cu doze mai mici de naproxen sau alte AINS este considerat insuficient.	Finalizat
94	Candesartanum Cilexetil + HCT	Canzeno HCT 16mg/12.5mg	Tratamentul hipertensiunii esentiale insuficient controlata prin monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.	Finalizat
95	Rilpivirinum	Edurant	Edurant, in asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientei umane tip 1 (HIV-1) la pacientii adulti netratati anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o incarcatura virala ARN HIV-1≤100000 copii/ml.	Finalizat
96	Lantanum	Fosrenol	Fosrenol este indicat la pacienții adulți ca agent de fixare a fosfatului utilizat pentru controlul hiperfosfatemiei la pacienții cu insuficiență renală cronică supuși hemodializei sau dializei peritoneale continue ambulatorii (DPCA)	Finalizat
97	Fingolimod	Gilenya	Gilenya este indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroza multipla recidivanta-remitenta extrem de activa la urmatoarele grupe de pacienti adulti: - Pacienti cu activitate intensa a bolii in ciuda tratamentului cu cel putin un tratament de modificare a bolii (pentru exceptii in informatii privind perioadele de eliminare completa. Acesti pacienti pot fi definiti ca pacienti care nu au raspuns la un ciclu complet si adecvat (in mod normal, minim un an de tratament) cu cel putin un tratament de modificare a bolii. Pacientii trebuie sa fi avut minim 1 recidiva in anul anterior in timpul tratamentului sau sa aiba cel putin 9 leziuni T2-hiperintense la RMN-ul cranian sau minim 1 leziune ca captare de Gadolinium. Un astfel de pacient poate fi definit si ca pacient cu o rata nemodificata sau crescuta de recidiva sau cu recidive curente severe, comparativ cu anul anterior; sau, Pacienti cu scleroza multipla recidivanta-remitenta severa, cu evolutie rapida, definita de 2 sau mai multe recidive disabilitante intr-un an si 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o crestere semnificativa a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	Finalizat

98	Saxagliptinum + Metformin	Komboglyze 1000mg	Tratamentul adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2 inadecvat controlat cu doza maxima toleranta de metformin in monoterapie sau la cei care sunt deja tratati cu combinatia de saxagliptin si metformin sub forma de comprimate separate; de asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu insulina (de exemplu terapie combinata cu tripla), ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, cand insulina si metforminul nu asigura un control glicemic adecvat. De asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu terapie combinata tripla), ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima toleranta de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat
99	Bromura de aclidinium	Eklira Genuair 322micrograme	Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacientii adulti.	Finalizat
100	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Mircera	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficientei renale cronice (IRC) la pacienti adulti.	Finalizat
101	Glicopironium	Seebri Breezhaler	Tratament bronhodilatator de intretinere, pentru ameliorarea simptomelor la pacientii adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC)	Finalizat
102	Rivaroxaban	Xarelto	Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacientii adulti care sunt supusi unei interventii chirurgicale de electie pentru substitutia soldului sau genunchiului (proteza totala a soldului sau genunchiului).	Finalizat
103	Perindopril + Amlodipina	Amlessa	Hipertensiunea arteriala esentiala si/sau boala coronariana stabila.	Finalizat
104	Amlodipina + Valsartan +Hidroclorotiazida	Exforge HCT	Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale ca terapie de substitutie la pacientii adulti a caror tensiune arteriala este controlata adecvat prin combinatie cu amlodipina, valsartan si hidroclorotiazida (HCT), administrate fie ca trei formule cu un component, fie ca formule cu doua sau un component.	Finalizat
105	Golimumab	Simponi	Tratamentul spondilitei anchilozate (SA) active, aflata in stadii severe, la adulti care au avut un raspuns inadecvat la terapia conventionala.	Finalizat
106	Dolutegravir	Tivicay	Tivicay este indicat in asociere cu alte medicamente anti-retrovirale destinate tratamentului infectiei cu Virusul Imunodeficientiei Umane (Human Immunodeficiency Virus-HIV) la adulti si adolescenti cu varsta peste 12 ani.	Finalizat
107	Tenofovir disoproxil	Viread	Viread 245 mg comprimate filmate este indicat in tratamentul hepatitei B cronice la adulti cu: • boala hepatica compensata, cu dovezi de replicare virala activa, concentratie serica a alaninaminotransferazei (ALT/TGP) persistent crescuta si dovada histologica a inflamatiei active si/sau fibrozei. • dovezi privind prezenta virusului hepatic B rezistent la lamivudina. • boala hepatica decompensata.	Finalizat
108	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului sau genunchiului.	Finalizat
109	Brinzolamida/Timolol	Azarga	Scaderea presiunii intraoculare (PIO) la pacienti adulti cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune intraoculara la care monoterapia determina reducerea insuficienta a PIO.	Finalizat
110	Certolizumab Pegol	Cimzia	Artrita reumatoida. Cimzia, in asociere cu metotrexatul (MTX), este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide actice, moderata pana la severa, la pacientii adulti, atunci raspunsul la medicamentele antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, este inadecvat. Cimzia poate fi administrat in monoterapie in caz de intoleranta la metotrexat sau atunci cand tratamentul continuu cu metotrexat ets inadecvat. S-a demonstrat ca Cimzia reduce rata progresiei distructiei articulare avidentiata radiologic si amelioreaza functionalitatea articulare, atunci cand este administrat in asociere cu metotrexat.	Finalizat
111	Linagliptinum+Metforminum	Jentadueto	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 in combinatie cu o sulfoniluree (de exemplu tratament cu tripla combinatie) ca un adjuvant la dieta si exercitii fizice la pacientii adulti la care controlul glicemiei nu se realizeaza adecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina si sulfoniluree	Finalizat
112	Aprepitantum	Emend	Prevenirea senzatiei de greata si a varsaturilor acute si tardive asociate: •chimioterapiei anticanceroase pe baza de cisplatina, cu potential emetogen mare, la adulti. • chimioterapiei anticanceroase cu potential emetogen moderat, la adulti.	Finalizat
113	Afliberceptum	Eylea	Tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinate de edemul macular secundar ocluziei venei centrale a retinei (OVCR)	Finalizat

114	Dipropinat de beclometazona anhidru / fumarat de formoterol dihidrat	Foster	FOSTER este indicat in tratamentul de fond al astmului bronsic atunci cand utilizarea unei combinatii (glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune) este adecvata: ● pacienti care nu au raspuns corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata scurta de actiune administrat la nevoie sau ● pacienti care au raspuns deja corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune. A. Terapia de intretinere: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, care se poate asocia, la nevoie cu un bronhodilatator cu durata scurta de actiune. B. Terapia de intretinere si de ameliorare a simptomelor: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, si, la nevoie, pentru controlul simptomatologiei.	Finalizat
115	Telaprevirum	Incivo	Incivo, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, este indicat in tratamentul hepatitei cronice cu virus C, genotipul 1, la pacientii adulti cu boala hepatica compensata (inclusiv ciroza): - netratati anterior; - care au fost tratati anterior cu interferon alfa (pefilat sau nepefilat) in monoterapie sau in asociere cu ribavirina, inclusiv pacientii cu recadere, pacientii cu raspuns terapeutic partial sau pacientii care nu au raspuns la tratament.	Finalizat
116	Axitinibum	Inlyta	Inlyta eate indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu carcinom renal in stadiu avansat (CCR) dupa esecul tratamentului anterior cu sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.	Finalizat
117	Eltrombopag olamina	Revolade	Revolade este indicat pentru tratamentul adultilor cu purpura trombocitopenica imuna (idiopatica) (PTI) cronica splenectomizati care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline). Revolade poate fi luat in considerare in tratamentul de linia a doua a adultilor nesplenectomizati pentru care tratamentul chirurgical este contraindicat.	Finalizat
118	Bendamustinum	Ribovact	Ca monoterapie in limfomul non-Hodgkin indolent la pacientii cu progresia bolii in timpul sau in decurs de 6 luni dupa tratamentul cu rituximab sau cu o schema terapeutica ce contine rituximab.	Finalizat
119	Lapatinib	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu un inhibitor de aromatază la femeile cu boală metastatică cu receptori hormonalai prezenți, aflate în postmenopauză, pentru care chimioterapia nu este indicată în prezent.	Finalizat
120	Dabrafenib	Tafinlar	Dabrafenib este indicat ca monoterapie in tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
121	Apomorphinum	Dacepton	Tratamentul pentru inhibarea fluctuatiilor motorii la pacientii cu boala Parkinson, fluctuatii care persista chiar in conditiile administrarii unui tratament titrat individual cu Levodopa si/sau alti agonisti ai dopaminei	Finalizat
122	Golimumab	Simponi	Colita ulcerativă (CU) activa aflată în stadii moderate până la severe, la pacienții adulți care au prezentat un răspuns inadecvat la terapia conventională, incluzând corticosteroizi, 6-mercaptapurina (6-MP) sau azatioprina (AZA), ori care prezintă întoarelantă sau contraindicații pentru un astfel de tratament.	Finalizat
123	Linagliptinum	Trajenta 5 mg	Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatatii controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
124	Linagliptinum	Trajenta 5 mg	Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatatii controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu o sulfoniluree si metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic impreuna cu terapia asociata/duala a acestor doua medicamente nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
125	Panitumumab	Vectibix	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
126	Panitumumab	Vectibix	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
127	Boceprevirum	Victrelis	Victrelis este indicat in tratamentul hepatitei cronice virale tip C (HCC), genotipul 1, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, la pacientii adulti cu insuficienta hepatica compensata, la care nu s-a administrat tratament sau care nu au raspuns la tratamentele anterioare.	Finalizat
128	Pazopanib	Votrient	Votrient este indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul cu celule renale (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala in stadiu avansat.	Finalizat

129	Pazopanib	Votrient	Votrient este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu subtipuri selectate de sarcom de tesuturi moi (STM) aflat in stadiu avansat carora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatica sau la care boala a progresat in decurs de 12 luni dupa terapia (neo) adjuvanta. Eficacitatea si siguranta au fost stabilite doar pentru anumite subtipuri histologice tumorale de STM.	Finalizat
130	Crizotinib	Xalkori	Xalkori este indicat pentru tratamentul adultilor cu neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv).	Finalizat
131	Rivaroxaban	Xarelto	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si a emboliei pulmonare (EP), si prevenirea recurentei TVP si a EP la adulti.	Finalizat
132	Rivaroxaban	Xarelto	Prevenirea accidentului vascular cerebral si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara cu unul sau mai multi factori de risc, cum sunt insuficienta cardiaca congestiva, hipertensiunea arteriala, varsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu in antecedente.	Finalizat
133	Enzalutamida	Xtandi	Xtandi este indicat la barbatii adulti pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, a caror boala a evoluat in timpul, sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat
134	Certolizumab Pegol	Cimzia	Spondilartrita axiala. Cimzia este indicat in tratamentul pacientilor adulti cu spondilartrita axiala activa severa, incluzand: -Spondilita anchilozata (SA). Adulti cu spondilita anchilozata activa severa care au un raspuns inadecvat sau intoleranta la antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). - Spondilartrita axiala fara dovada radiografica de SA. Adulti cu spondilartrita axiala activa severa fara dovada radiografica de SA, dar cu semne obiective de inflamatie manifestate prin proteina C reactiva (PCR) crescuta si/sau rezonanta magnetica nucleara (RMN), care au avut un raspuns inadecvat sau intoleranta la AINS.	Finalizat
135	Ticagrelor	Brilique	Ticagrelor, administrat in asociere cu acid acetilsalicilic, este indicat pentru preventia evenimentelor aterotrombotice la pacientii adulti cu sindrom coronarian acut (SCA) (angina instabila, infarct miocardic fara supradenivelare de segment ST sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST) atat pacientii tratati medical cat si cei tratati prin interventie coronariana percutanata (PCI) sau by-pass coronarian (CABG).	Finalizat
136	Prasugrelum	Efient	Prevenirea evenimentelor atero-trombotice la pacienti cu sindrom coronarian acut (adica, angina instabila, infarct miocardic fara supra-denivelare de segment ST [UA/NSTEMI], infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST [STEMI]) ce sufera o interventie coronariana per-cutanata (PTCA) primara sau amanata.	Finalizat
137	Golimumab	Simponi 50mg	Golimumab administrat singur sau in asociere cu MTX, este recomandat in tratamentul artritei psoriazice active si progresive, la adultii la care raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificate de boli (MARMB) a fost inadecvat. S-a demonstrat ca Simponi determina scaderea progresiei afectarii articulatilor extremitatilor, masurata prin metode radiologice, la pacienti cu subtipurile poliarticulare simetrice ale afectiunii si amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat
138	Paliperidonum	Invega	Invega este indicat in tratamentul schizofreniei la adulti si adolescenti cu varsta de 15 ani si peste. Invega este indicat pentru tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburarile schizoafective la adulti. Nu a fost demonstrat efectul asupra simptomelor depresive.	Finalizat
139	Abataceptum	Orencia (Jia)	Artrita idiopatica juvenila poliarticulara. Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul artritei idiopatice juvenile (AIJ) poliarticulare active, forma moderata pana la severa, la copii si adolescenti cu varsta de 6 ani si peste, care au raspuns insuficient la alte MAMB, inclusiv cel putin un inhibitor TNF.	Finalizat
140	Ingenoli Mebutas	Picato	Tratamentul cutanat al Keratozei actinice non-hipertrofie non-hipercheratozice la adulti la nivelul trunchiului si extremitatilor.	Finalizat
141	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 20mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
142	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 40mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
143	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 40mg/10mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat

144	Golimumab	Simponi 50mg	Golimumab, in asociere cu metotrexat (MTX), este recomandat in: ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii moderate pana la severe, la adulti la care raspunsul la tratamentul cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, a fost inadecvat. ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii severe, la adultii care nu au fost tratati anterior cu MTX. S-a demonstrat faptul ca Golimumab, in combinatie c u MTX, reduce rata de progresie a leziunilor distructive de la nivel articular, conform determinarilor radiologice si ca amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat
145	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA≥II).	Finalizat
146	Indacaterolum	Onbrez Breezhaler	Onbrez Breezhaler este indicat pentru tratamentul bronhodilatator de intretinere al obstructiei cailor respiratorii la pacienti adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC).	Finalizat
147	Abataceptum	Orencia (1st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorala (TNF)-alfa.	Finalizat
148	Vildagliptinum + Metforminum	Eucreas	Eucreas este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat on tratamentul pacientilor adulti care nu pot obtine un control glicemic suficient la doza maxima tolerata de metformina administrata oral in monoterapie sau care sunt tratati deja cu o asociere de vildagliptin si metformina sub o forma de comprimate separate. - Eucreas este indicat in combinatie cu o sulfoniluree (si anume terapie in combinatie tripla) ca terapie adjuvanta la regimul alimentar si exercitiile fizice la pacientii adulti, controlati necorespunzator cu metformina si o sulfoniluree. - Eucreas este indicat in terapie in combinatie tripla cu insulina ca terapie adjuvanata la regimul alimentar si exercitiile fizice pentru a imbunatati controlul glicemic la pacienti adulti cand utilizarea insulinei in doza stabila si metformina administrata in monoterapie nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat
149	Afatinibum	Giotrif	Afatinib este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacientilor netratati anterior ce Receptori ai Factorului de Crestere Epidermal (EGFR) TKI cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutatie(i) activatoare a(le) EGFR.	Finalizat
150	Afliberceptum	Eylea	Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul degenerescentei maculare legata de varsta (DMLV) forma neovasculara (umeda).	Finalizat
151	Linagliptinum+Metforminum	Jentadueto	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 ca un adjuvant al dietei si exercitiului fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti controlati inadecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina sau la pacientii carora deja li s-a administrat tratament combinat cu linagliptin si metformina	Finalizat
152	Lixisenatidum	LYXUMIA	Lyxumia este indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 în asociere cu medicamente hipoglicemizante, administrate pe cale orală, și/sau cu insulină bazală, în vederea obținerii controlului glicemic atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei	Finalizat
153	Abataceptum	Orencia (2st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorala (TNF)-alfa.	Finalizat
154	Tocilizumabum	RoActemra	Tratamentul pacientilor adulti cu poliartrita reumatoida activa, moderata pana la severa si pacientilor cu varsta de 2 ani si peste, cu artrita idiopatica juvenila, forma sistematica activa si cu poliartrita idiopatica juvenila.	Finalizat
155	Ipilimumab	Yervoy	Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezecabil sau metastatic) la pacientii adulti.	Finalizat
156	Vemurafenibum	Zelboraf	Vemurafenibum este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
157	Abirateronum	Zytiga	Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbatii adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei scheme chimioterapeutice pe baza de docetaxel.	Finalizat

158	METHOTREXATUM	METHOTREXAT EBEWE	Forme severe de psoriazis, in special psoriazisul tip placa, care nu pot fi tratate eficient cu terapie conventionala cum ar fi fototerapia, PUVA si retinoizii si psoriazis sever care afecteaza articulatiile (artrita psoriazica)	Finalizat
159	SILIBINUM	SILIMARINA BIOFARM	Hepatoprotector utilizat ca adjuvant în diferite afecțiuni hepatice cronice incluzând hepatita etanolică	Finalizat
160	INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM	ULTIBRO BREEZHALER 85 micrograme/43 micrograme	Ultibro Breezhaler este indicat în tratamentul bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
161	Perindopril Arginina + Indapamida + Amlodipina	TRIPLIXAM	Hipertensiunea arteriala esentiala la pacienti a caror afectiune este deja controlata cu combinatia in doza fixa perindopril/indapamida si amlodipina administrate concomitent, in aceleasi doze.	Finalizat
162	OFLOXACINUM	UNIFLOX	Infectii bacteriene	Finalizat
163	BRIMONIDINUM	BRIMONAL	Glaucom	Finalizat
164	AGOMELATINUM	VALDOXAN	Tratamentul episoadelor depresive majore	Finalizat
165	DENOSUMAB	PROLIA	Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza si barbatii cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.	Finalizat
166	PANITUMUMAB	VECTIBIX	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat
167	DENOSUMAB	XGEVA	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.	Finalizat
168	ADALIMUMABUM	HUMIRA	Artrita juvenila idiopatica. Poliartrita reumatoida juvenila idiopatica.	Finalizat
169	DACLATASVIR	DAKLINZA	Daklinza este indicat, in asociere cu alte medicamente, pentru tratamentul infectiei cronice cu virusul hepatic C (VHC) la adulti.	Finalizat
170	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu limfom Hodgkin (LH) CD30 +recidivat sau refractar: 1. dupa transplant de celule stem autologe (TCSA) sau 2. dupa cel putin doua tratamente anterioare, cand TCSA sau chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezinta o optiune de tratament.	Finalizat
171	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs), recidivat sau refractar.	Finalizat
172	DASABUVIR	EXVIERA 250 mg	Exviera este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
173	OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONAVIRUM	VIEKIRAX 12,5mg/ 75mg/ 50mg	Viekirax este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
174	SORAFENIBUM	NEXAVAR 200mg	SORAFENIBUM/Nexavar este indicat pentru tratamentul pacientilor cu carcinom tiroidian diferentiat (papilar/folicular/cu celule Hurthle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod radioactiv.	Finalizat
175	RIOCIGUAT	ADEMPAS 0,5mg/ 1mg/ 105mg, 2mg, 205mg	Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv	Finalizat
176	SOFOSBUVIR	SOVALDI 400mg	SOVALDI este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul Hepatitei Cronice C (HCC) la adulti. Nu se recomanda administrarea de Sovaldi in monoterapie.	Finalizat
177	SIMEPREVIRUM	OLYSIO	OLYSIO, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.	Finalizat
178	ETHIONAMIDUM	ETIONAMIDA Atb 250mg	Medicament tuberculostatic de linia a II a la pacientii cu rezistenta la medicamentele de linia I.	Finalizat

179	TELBIVUDINA	SEBIVO 600mg	Sebivo este indicat pentru tratamentul hepatitei cronice B la pacienții adulți cu boala hepatică compensată și semne de replicare virală, valoare plasmatică crescută în mod repetat a alanin aminotransferazei (ALT) și cu semne histologice de inflamtație activă și/sau fibroză.	Finalizat
180	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40mg/ml sol.inj	Eylea este indicat la adulți pentru tratamentul afectării acuității vizuale determinată de edemul macular diabetic (EMD).	Finalizat
181	MACITENTANUM	OPSUMIT	Opsumit, administrat în monoterapie sau în asociere, este indicat pentru tratamentul pe termen lung al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacienții adulți aflați în clasa funcțională II sau III OMS	Finalizat
182	BEDAQUILINUM	SIRTURO	SIRTURO este indicat la adulți ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzător pentru tuberculoza pulmonară multi-drog rezistentă (MDR-TB) atunci când un tratament eficient nu poate fi altfel alcătuit din motive de rezistență sau tolerabilitate.	Finalizat
183	LEDIPASVIR/ SOFOSBUVIR	HARVONI 90mg/400mg	Tratamentul hepatitei C cronice la adulți	Finalizat
184	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu sindroame mielodisplazice (SMD) cu risc intermediar-2 și mare, conform Sistemului Internațional de Punctaj referitor la Prognostic (SIPP)	Finalizat
185	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) cu 10-29 % blasti medulari, fără boală mieloproliferativă	Finalizat
186	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30 % blasti și linii multiple de diferențiere a displaziei, conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)	Finalizat
187	LENALIDOMIDUM	REVLIMID	Revlimid este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
188	COMBINATII (ROSUVASTATINUM+ EZETINIBUM)	LIPOCOMB 10mg/10mg și 20mg/20mg	Lipocomb este indicat ca adjuvant al regimului alimentar în tratamentul hipercolesterolemiei (exceptând hipercolesterolemia heterozigotă familială) la pacienții adulți - care nu sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină în monoterapie; sau - ca terapie de substituție la pacienții controlați în mod adecvat cu substanțele individuale administrate concomitent, la aceleași concentrații ca și în combinația în doză fixă, dar administrate separat	Finalizat
189	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a soldului.	Finalizat
190	CANAGLIFLOZINUM	INVOKANA	Invokana este indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic fiind administrat ca: Monoterapie În cazul în care doar prin dietă și exerciții fizice nu se obține un control glicemic adecvat la pacienții la care utilizarea de metformin este inadecvată datorită intoleranței sau contraindicațiilor. Terapie adjuvantă Terapie adjuvantă la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
191	BOSUTINIB	BOSULIF	Bosulif este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) în faza cronică (FC), faza accelerată (FA) sau faza blastica (FB), tratați anterior cu unul sau mai mulți inhibitori de tirozinază și la care administrarea de imatinib, nilotinib și dasatinib nu este considerată o opțiune terapeutică adecvată.	Finalizat
192	Bromura de Aclidinium + Fumarat de Formoterol	DUAKLIR GENUAIR	Boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat

193	CABAZITAXELUM	JEVTANA	JEVTANA este indicat, in asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacientilor cu cancer de prostata metastazat hormono-rezistent, tratati anterior dupa o schema de tratament continand docetaxel.	Finalizat
194	AFLIBERCEPTUM	ZALTRAP	ZALTRAP in asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic (CCRm), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de tratament pe baza de oxaliplatina.	Finalizat
195	OLAPARIBUM	LYNPARZA 50mg	LYNPARZA este indicat in monoterapie ca tratament de intretinere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad inalt recidivant cu mutatie BRCA (germinala si/sau somatica), neoplazie de trompa uterina sau neoplazie peritoneala primara, sensibile la medicamente pe baza de platina, cu raspuns (complet sau partial) la chimioterapia pe baza de platina.	Finalizat
196	GEFITINIBUM	IRESSA	IRESSA este indicata pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR_TK (linia I).	Finalizat
197	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si al emboliei pulmonare (EP), prevenirea trombozei venoase profunde si a emboliei pulmonare recurente la adulti.	Finalizat
198	RAMUCIRUMAB	CYRAMZA	Neoplasm gastric	Finalizat
199	METOPROLOL TARTRAT+ IVABRADINA	IMPLICOR	terapie de substitutie pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienti adulti cu ritm sinusal normal, a caror afectiune este deja controlata cu metoprolol si ivabradina administrate separat, in doze similare	Finalizat
200	IPILIMUMAB	YERVOY	Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezectabil sau metastatic) la pacientii adulti.	Finalizat
201	THALIDOMIDUM	THALIDOMIDE CELGENE	Thalidomide Celgene in asociere cu melfalan si prednison este indicat ca tratament de prima linie la pacientii cu mielom multiplu netratat, cu varsta ≥ 65 de ani sau care nu sunt eligibili pentru chimioterapie ce doze mari.	Finalizat
202	ABIRATERONUM	ZYTIGA	ZYTIGA este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti care sunt asimptomatici sau usor simptomatici dupa esecul terapiei de privare de androgeni si la care chimioterapia nu este inca indicata din punct de vedere clinic	Finalizat
203	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA 140 mg	tratamentul pacientilor adulti cu leucemie cronica (LLC) carora li s-a administrat cel putin o terapie anterioara sau ca terapie de prima linie in prezenta deletiei 17p sau mutatiei TP53 la pacientii care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.	Finalizat
204	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA 140 mg	tratamentul pacientilor cu limfom cu celule de manta (LCM) recidivant sau refractar.	Finalizat
205	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat in monoterapie pentru tratamentul melanomului in stadiu avansat (nerezectabil sau metastazat) la adulti.	Finalizat
206	BROMURA DE ACLIDINIUM + FUMARAT DE FORMOTEROL	BRIMICA GENUAIR	a tratament bronhodilatator de intretinere pentru ameliorarea simptomelor la adulti cu boala pulmonara cronica obstructiva (BPOC)	Finalizat
207	PAZOPANIBUM	VOTRIENT	indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul cu celule renale (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a administrat anterior terapia cu citokine pentru boala in stadiu avansat.	Finalizat
208	PIRFENIDONUM	ESBRIET 267 mg	Esbriet este indicat la adulti pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice (FPI) usoare pana la moderate.	Finalizat
209	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	Xtandi este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti cu simptomatologie absenta sau usoara, dupa esecul terapiei de deprivare androgenica, la care chimioterapia nu este usoara inca indicata din punct de vedere clinic.	Finalizat
210	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	tratamentul melanomului avansat (nerezectabil sau metastatic) la pacienti adulti.	Finalizat
211	DARUNAVIRUM + COBICISTATUM	REZOLSTA 80mg/150mg	REZOLSTA este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientiei umane (HIV-1) la adulti, incepand cu varsta de 18 ani.	Finalizat
212	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	indicat in monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienti adulti.	Finalizat
213	OBINUTUZUMABUM	GAZYVARO	in asociere cu clorambucil este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu leucemie limfocitara cronica (LLC) netratata anterior si cu comorbiditati care nu permit administrarea unui tratament pe baza de fludarabina in doza completa.	Finalizat

214	VELAGLUCERASE	VPRIV	Terapia de substitutie enzimatica (TSE) pe termen lung la pacienti cu tipul 1 de boala Gaucher.	Finalizat
215	TETRABENAZINUM	TETMODIS	Tratamentul tulbur[riilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington	Finalizat
216	DONEPEZILUM	NA	●bolii Alzheimer, forma ușoară sau moderată ● demenței vasculare (demența asociată cu bolile cerebrovasculare)	Finalizat
217	GALANTAMINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
218	MEMANTINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
219	RIVASTIGMINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
220	FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	ATIMOS 0,012mg	ATIMOS este indicat in tratamentul regulat al afectiunilor abstractive reversibile ale cailor respiratorii la pacienti cu bronhopneumonie cronica obscura, unde este necesara terapia cu bronhodilatator.	Finalizat
221	VEMURAFENIBUM	ZELBORAF 240mg	VEMURAFENIB este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
222	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	XTANDI este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat
223	FLUDARABINUM (forma orala)	FLUDARABINA oral	●Tratamentul leucemiei limfocitare cronice cu celule B la pacienții cu rezervă medulară suficientă ●Tratamentul de primă linie numai la pacienții cu forma avansată a leucemiei limfocitare cronice cu celule B, stadiile Rai III/IV (stadiul Binet C) sau stadiile Rai I/II (stadiul Binet A/B) și care prezintă simptome ale bolii sau dovezi ale progresiei bolii	Finalizat
224	ROTIGOTINUM	NA	Parkinson	Finalizat
225	AGALSIDASUM ALFA	REPLAGAL	Terapia de substitutie enzimatica pe termen lung la pacienti cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienta de α -galactosidaza A)	Finalizat
226	ATALUREN	TRANSLARNA	Tratamentul pacientilor ambulatorii cu varsta de 5 ani si peste cu distrofie musculara Duchenne determinata de o mutatie de tip nonsens la nivelul genei distofinei.	Finalizat
227	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
228	PASIREOTIDUM	SIGNIFOR	indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu acromegalie pentru care o interventie chirurgicala nu constituie o optiune sau care nu a avut rezultate curative si care nu sunt controlati corespunzator prin tratament cu alt analog al somatostatinei.	Finalizat
229	CARFILZOMIBUM	KYPROLIS	in combinatie ori cu lenalidomida si cu dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu la care s-a administrat cel putin o terapie anterioara.	Finalizat
230	NINTEDANIBUM	OFEV	la adulti pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice	Finalizat
231	ELBASVIR/ GRAZOPREVIR	ZEPATIER	ZEPATIER este indicat in tratamentul hepatitei C cronice la adulti.	Finalizat
232	SECUKINUMAB	COSENTYX	Cosentyx este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică.	Finalizat
233	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decat cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local avansat sau metastazat, dupa tratamentul anterior cu chimioterapie, la adulti.	Finalizat
234	PERTUZUMABUM	PERJETA	PERJETA este indicat pentru utilizarea in asociere cu trastuzumab si docetaxel la pacientii adulti cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatica.	Finalizat
235	ATAZANAVIR + COBICISTAT	EVOTAZ	EVOTAZ este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infectiei cu virusul de tip 1 al imunodeficientei umane dobandite (HIV-1) la adulti fara mutatii cunoscute asociate rezistentei la atazanavir .	Finalizat
236	INCATIBANT	FIRAZYR	Tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditat la adulti (cu deficit de inhibitor al C1-esterazei).	Finalizat

237	PONATINIB	ICLUSIG	1. leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică, în fază accelerată sau în fază blastică, care prezintă rezistență la dasatinib sau nilotinib, care prezintă intoleranță la dasatinib sau nilotinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I 2. leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+), care prezintă rezistență la dasatinib, care prezintă intoleranță la dasatinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I.	Finalizat
238	COMBINATII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)	EUCREAS 50mg/1000mg	tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat în tratamentul pacienților adulți care nu pot obține un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt tratați deja cu o asociere de vildagliptin și metformină sub formă de comprimate separate. - Eucreas este indicat în combinație cu o sulfoniluree (și anume terapie în combinație triplă) ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice la pacienții adulți, controlați necorespunzător cu metformină și o sulfoniluree. - Eucreas este indicat în terapie în combinație triplă cu insulină ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice pentru a îmbunătăți controlul glicemic la pacienți adulți când utilizarea insulinei în doză stabilă și metformina administrată în monoterapie nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
239	TRAMETINIB	MEKINIST	în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib, este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, cu mutație BRAF V600	Finalizat
240	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbări repetate la pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
241	COMBINATII (TIOTROPIUM+OLODATERO LUM)	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 micrograme/2,5 micrograme	tratament bronhodilatator de întreținere, cu rol de ameliorare a simptomelor la pacienții adulți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
242	MECASERMIN	INCRELEX	tratamentul de lungă durată al deficitului de creștere la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani cu deficit primar sever de factor de creștere, asemănător insulinei-tip 1 (DFCI)	Finalizat
243	DAPAGLIFLOZIN	FORXIGA	Diabet zaharat tip 2	Finalizat
244	PANOBINOSTAT	FARYDAK	mielom multiplu	Finalizat
245	TRASTUZUMAB EMTANSINE	KADCYLA	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
246	ERLOTINIBUM	TARCEVA	Neoplasm bronhopulmonar	Finalizat
247	PEMETREXEDUM	ALIMTA	Cancer pulmonar Mezotelion pleural	Finalizat
248	SORAFENIBUM	NEXAVAR	Carcinom hepatocelular, renal, tiroidian	Finalizat
249	TRABECTEDINUM	YONDELIS	Sarcom de țesuturi moi Cancer ovarian	Finalizat
250	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	Cancer mamar	Finalizat
251	DECITABINUM	DACOGEN	Leucemie mieloida acuta	Finalizat
252	RITUXIMABUM	MABTHERA	Linfom	Finalizat
253	BEVACIZUMABUM	AVASTIN	Carcinom de colon, neoplasm mamar, neoplasm renal	Finalizat
254	CETUXIMABUM	ERBITUX	Cancer colorectal, cancer al capului si gatului	Finalizat
255	PANITUMUMABUM	VECTIBIX	Neoplasm colorectal	Finalizat
256	RUXOLITINIBUM	JAKAVI	Splnomegalie, mielofibroză	Finalizat
257	TEMOZOLAMIDUM		Gliom, glioblastom	Finalizat

258	GEMCITABINUM		Neoplasm vezică urinară, pancreas, NSCLC, ovarian, mamar	Finalizat
259	PACLITAXELUM		Cancer mamar, ovarian, bronho-pulmonar	Finalizat
260	DOCETAXELUM		Cancer mamar, prostata, bronho-pulmonar	Finalizat
261	FILGRASTIMUM		Neutropenie	Finalizat
262	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
263	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
264	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA 5 mg comprimate filmate	indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulină (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
265	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA 5 mg comprimate filmate	indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic: în terapia orală triplă în asociere cu: metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
266	ELVITEGRAVIR / COBICISTAT / EMTRICITABINE / TENOFOVIR ALAFENAMIDE	GENVOYA	tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir.	Finalizat
267	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOF OVIRUM)	DESCOVY 200 mg/10 mg comprimate filmate	indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
268	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOF OVIRUM)	DESCOVY 200 mg/25mg comprimate filmate	indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
269	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	Finalizat
270	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx este indicat în tratamentul spondilitei anchilozante active la adulții care au răspuns necorespunzător la terapia convențională.	Finalizat
271	COMBINATII (FLUTICASONUM+FORMOT EROLUM)	FLUTIFORM	tratamentul de întreținere al astmului bronșic în cazul în care este indicată utilizarea unui medicament combinat (un corticosteroid inhalator și un β2 agonist cu durată lungă de acțiune): La pacienții la care nu se obține control adecvat cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agoniști cu durată scurtă de acțiune, administrați la nevoie. Sau La pacienții la care s-a obținut deja control adecvat atât cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agoniști cu durată lungă de acțiune.	Finalizat
272	OSIMERTINIB MESYLATE	TAGRISSO	tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat
273	DELAMANID	DELTIBA 50 MG	indicat pentru utilizare în cadrul unui regim terapeutic asociat adecvat pentru tuberculoza pulmonară plurirezistentă la medicamente la pacienți adulți atunci când un regim terapeutic eficient nu poate fi altfel constituit din motive de rezistență sau tolerabilitate	Finalizat
274	APIXABAN	ELIQUIS	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II)	Finalizat
275	NIVOLUMAB	OPDIVO	indicat ca monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal după terapie anterioară, la adulți.	Finalizat

276	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	indicat pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), local avansat sau metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament aprobat pentru aceste mutații înaintea administrării KEYTRUDA.	Finalizat
277	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al mielomului multiplu în asociere cu prednison, la pacienți cu vârstă peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomidă sau bortezomib	Finalizat
278	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Ca monoterapie în limfomul non-Hodgkin latent , la pacienții cu progresie a bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă terapeutică care conține rituximab.	Finalizat
279	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al leucemiei limfatice cronice (stadiul B sau C Binet) la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabină.	Finalizat
280	COMBINATII (SAXAGLIPTIN+DAPAGLIFLO ZINUM)	QTERN	Qtern, combinație în doză fixă de saxagliptin și dapagliflozin este indicat la pacienții adulți cu vârstă de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2: - pentru îmbunătățirea controlului glicemic atunci când metformin și/sau sulfoniluree (SU) și una din monocomponentele din Qtern nu asigură un control adecvat al glicemiei, - atunci când sunt deja tratați cu combinația liberă de dapagliflozin și saxagliptin	Finalizat
281	LANREOTIDUM	SOMATULINE AUTOGEL 120mg	Tratamentul tumorilor neuroendocrine gastroenteropancreatice (GEP-NETs) de gradul 1 și un subset al gradului 2 (indice Ki67 până la 10%) de origine mezenterică, pancreatică sau necunoscută (acolo unde a fost exclusă originea în hemicolonul stang și rect), la pacienții adulți cu boală local avansată nerezecabilă sau la cei cu boală metastatică	Finalizat
282	BLINATUMOMAB	BLINCYTO	tratamentul adulților cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia negativ	Finalizat
283	IDEBENONUM	RAXONE	tratamentul tulburărilor de vedere la pacienții adolescenți și adulți cu neuropatie optică ereditară Leber (LHON)	Finalizat
284	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.03% ung	Tratamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârstă peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici. Copii (cu vârstă peste 2 ani) Tratamentul dermatitelor atopice moderate până la severe la copiii care nu au răspuns adecvat la terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici.	Finalizat
285	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.1% ung	Tratamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârstă peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici	Finalizat
286	ALEMTUZUMAB	LEMTRADA	indicat la pacienți adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR), cu boală activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	Finalizat
287	CABAZITAXELUM	JEVTANA	în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel	Finalizat
288	ABACAVIR SULFATE / DOLUTEGRAVIR SODIUM / LAMIVUDINE	TRIUMEQ	indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârstă peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat
289	EMPAGLIFLOZIN	JARDIANCE	tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulți, ca: Monoterapie Atunci când numai dieta și exercițiul fizic nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminei este considerată inadecvată din cauza intoleranței. Terapie asociată suplimentară În asociere cu alte medicamente hipoglicemizante, incluzând insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei)	Finalizat
290	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg	tratamentul antiretroviral combinat în tratarea adulților infectați cu VIH-1; antiretroviral pentru utilizare sistemică; antiretrovirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații	Finalizat

291	PALIPERIDONUM	Trevicta	injecție cu o administrare la 3 luni, este indicată în tratamentul de întreținere al schizofreniei la pacienții adulți care sunt stabiliizați clinic cu palmitat de paliperidonă injectabil cu o administrare lunară	Finalizat
292	TOCILIZUMABUM	RoActemra	în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat pentru: tratamentul pacienților adulți cu PR activă, moderată până la severă, care au avut fie un răspuns inadecvat, fie nu au tolerat tratamentul cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD) sau cu inhibitori ai factorului de necroză tumorală (TNF).La acești pacienți, RoActemra poate fi administrat ca monoterapie, în cazul intoleranței la MTX sau unde continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată. S-a demonstrat că RoActemra scade rata de progresie a leziunilor articulare, evaluată radiologic și îmbunătățește funcția fizică atunci când este administrat în asociere cu metotrexat.	Finalizat
293	COMBINAȚII(BRINZOLAMIDUM+BRIMONIDINUM)	SIMBRINZA	Scăderea presiunii intraoculare (PIO) crescute, la pacienți adulți cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune oculară, la care monoterapia nu asigură o reducere suficientă a PIO	FINALIZAT
294	COMBINAȚII (SACUBITRILUM+VALSARTANUM)	ENTRESTO 24 mg/26 mg ENTRESTO 49 mg/51 mg mg ENTRESTO 97 mg/103 mg	pacienții adulți în tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejeecție redusă	Finalizat
295	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA	ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu macroglobulinemie Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau ca terapie de primă linie la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.	Finalizat
296	TRASTUZUMABUM EMTANSINUM	KADCYLA	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
297	BELIMUMAB	BENLYSTA	tratament asociat la terapiile existente la pacienții adulți cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard	Finalizat
298	COMBINAȚII (AZECLASTINUM+FLUTICASONUM)	DYMISTA 137 micrograme/50 micrograme/doza	Ameliorarea simptomelor de rinită alergică sezonieră și perenă moderate până la severe dacă monoterapia cu antihistaminice intranasale sau glucocorticoizi nu este considerată suficientă.	Finalizat
299	COMBINAȚII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)	Dunotrisin	o combinație cu doză fixă de emtricitabină și succinat de tenofovir disoproxil. Este indicat în terapia antiretrovirală combinată pentru tratamentul adulților cu vârsta de 18 ani și peste, infectați cu HIV-1.	Finalizat
300	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului	Finalizat
301	Romiplostim	Nplate	Nplate este indicat pentru pacienții cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) cu vârsta de un an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline).	Finalizat
302	Osimertinibum	TAGRISSO 80 mg comprimate filmate	tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat
303	Elbasvir/grazoprevir	Zepatier	în tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adulți. Pentru activitatea specifică genotipului virusului hepatitic C (VHC)	RETRAS
304	Darunavir 800mg/cobicistat 150 mg	Rezolsta 800mg/150 mg	în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1) la adulți, începând cu vârsta de 18 ani.	Finalizat
305	Ixekizumab	Taltz 80 mg soluție injectabilă în seringă preumplută	tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.	Finalizat

306	Ramucirumab	Cyramza 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	în asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat	Finalizat
307	RILPIVIRINUM	Edurant 25mg	în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1 ≤ 100000 copii/ml.	Finalizat
308	Secukinumabum	Cosentyx	în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	FINALIZAT
309	Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat	Foster 100/6 mcg/doză	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS<50%din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu acțiune de lungă durată	Finalizat
310	Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat	Foster Nexthaler 200/6 mcg/doză	Tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu lungă durată de acțiune) este adecvată: - pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie - pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată lungă de acțiune	Finalizat
311	PERTUZUMABUM	PERJETA 420mg	indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.	Finalizat
312	LAPATINIBUM	TYVERB	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces: □ în asociere cu capecitabina, la pacienții cu neoplasm mamar avansat sau metastatic, progresiv în urma unor terapii anterioare, care trebuie să fi inclus antracicline și taxani și terapie cu trastuzumab, în context metastatic	Finalizat
313	BEVACIZUMAB	AVASTIN	1. Bevacizumab administrat în asociere cu carboplatină și paclitaxel este indicat ca tratament de primă linie al pacientelor adulte cu neoplasm ovarian epitelial (stadiile FIGO (Federația Internațională de Ginecologie și Obstetrică) IIIB, IIIC și IV), al trompelor uterine sau cu neoplasm peritoneal primar în stadii avansate. 2. Bevacizumab, administrat în asociere cu carboplatină și gemcitabină , este indicat pentru tratamentul pacientelor adulte la care s-a diagnosticat prima recidivă de neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, sensibile la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-a administrat anterior tratament cu bevacizumab sau alți inhibitori ai factorului de creștere a endoteliului vascular (FCEV) sau terapie țintă asupra receptorului FCEV 3. Bevacizumab administrat în asociere cu paclitaxel, topotecan sau doxorubicină lipozomală polietilenglicată este indicat pentru tratamentul pacientelor adulte cu neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, recurente, rezistente la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-au administrat mai mult de două scheme chimioterapice și care nu au fost tratate anterior cu bevacizumab sau cu alți inhibitori ai FCEV sau cu terapie țintă asupra receptorului FCEV	Finalizat
314	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	în asociere cu capecitabină sau 5-fluorouracil și cisplatină este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu adenocarcinom gastric metastazat HER2 pozitiv sau a joncțiunii gastroesofagiene, cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului pentru boala lor metastatică	Finalizat

315	PEMBROLIZUMABUM	KEYTRUDA 50mg	indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporțional (STP) ≥ 50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.	Finalizat
316	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/ EMTRICITABINĂ/FUMARAT TENOFIVIR ALAFENAMIDA	GENVOYA	Tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir	Finalizat
317	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Artrită psoriazică Cimzia în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evoluției bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie în cazul intoleranței la MTX sau când continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată	Finalizat
318	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Spondilartrită axială severă, incluzând: Spondilita anchilozantă (SA) - Adulți cu spondilită anchilozantă activă severă care au un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS Spondilartrită axială fără dovadă radiografică de SA- Adulți cu spondilartrită axială activă severă fără dovadă radiografică de SA, dar cu semne obiective de inflamație manifestate prin proteina C reactivă (PCR) crescută și/sau rezonanță magnetică nucleară (RMN), care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS	Finalizat
319	DOLUTEGRAVIR+ABACAARI R+LAMIVUDINUM	TRIUMEQ	indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat
320	DARATUMUMAB	DARZALEX	1) în monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și refractar, care au fost tratați anterior cu un inhibitor de proteazom și un agent imunomodulator și care au înregistrat progresia bolii sub ultimul tratament. ; 2) în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
321	EMTRICITABINA/TENOFOVIR R ALAFENAMIDĂ	DESCOVY 250mg/25 mg	Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
322	EMTRICITABINA/TENOFOVIR R ALAFENAMIDĂ	DESCOVY 200mg/10 mg	în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
323	BARICITINIB	OLUMIANT	Tratamentul poliartritei reumatoide active moderat până la severă la pacienții adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală	Finalizat
324	DULAGLUTIDUM	TRULICITY	indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de: Monoterapie Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. Terapie combinată În combinație cu alte medicamente hipoglicemice, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
325	COMBINATII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)	SULIQUA	indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală	Finalizat

326	TAFLUPROSTUM	SAFLUTAN	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: o care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți o care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie o care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante. SAFLUTAN este indicat la adulți cu vârsta ≥18 ani.	Finalizat
327	CARFILZOMIB	KYPROLIS	in combinatie ori cu lenalidomida si cu dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu (MM) la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioara.	Finalizat
328	ALIROCUMABUM	PRALUENT	indicat la adulți cu hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă și non-familială) sau cu dislipidemie mixtă, ca adjuvant la dietă: - în asociere cu o statină sau cu o statină împreună cu alte terapii hipolipemice la pacienți la care nu s-au putut atinge valori țintă ale LDL-colesterolului cu o statină administrată în doza maximă tolerată, sau - singur sau în asociere cu alte terapii hipolipemice la pacienți cu intoleranță la statine sau la care este contraindicată administrarea de statine.	Finalizat
329	ELTROMBOPAG	REVOLADE	indicat pentru tratamentul purperei trombocitopenice imune (idiopatice) (PTI) cronice la pacienții cu vârsta de 1 an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	Finalizat
330	IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA, CU ADMINISTRARE EXTRAVASCULARA	GAMMANORM 165 mg/mL	Terapie de substitutie la adulti, adolescenti si copii (cu varsta intre 0 si 18 ani) cu sindroame de imunodeficienta primara cum sunt: -agamaglobulinemie si hipogamaglobulinemie congenitale; -imunodeficienta comuna variabila (IDCV); -imunodeficienta severa combinata; -deficite de subclasa IgG cu infectii recurente;	Finalizat
331	Secukinumabum	Cosentyx	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever , la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Finalizat
332	USTEKINUMABUM	STELARA	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu psoriazis în plăci , forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen și ultraviolete A)	FINALIZAT
333	Nivolumabum	Opdivo	în monoterapie este indicat pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic recidivat sau refractar după transplant autolog de celule stem (TACS) și tratament cu brentuximab vedotin la adulți	Finalizat
334	ELIGLUSTAT	CERDELGA	tratamentul de lungă durată la pacienții adulți cu boala Gaucher de tip 1 (BG1), care sunt metabolizatori lenți (ML), metabolizatori intermediari (MI) sau metabolizatori rapizi (MR) prin intermediul CYP2D6	Finalizat
335	VANDETANIB	CAPRELSA	tratamentul neoplasmului medular tiroidian (NMT) agresiv și simptomatic la pacienți cu forma de boală local avansată, inoperabilă sau cu forma de boală metastazată.	Finalizat
336	CRIZOTINIB	XALKORI	Xalkori este indicat pentru tratamentul de prima intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv)	FINALIZAT
337	RITUXIMAB	MABTHERA	Granulomatoză cu poliangeită și poliangeită microscopică în asociere cu glucocorticoizi este indicat pentru inducerea remisiunii la pacienții adulți cu granulomatoză cu poliangeită Wegener GPA activă, severă și poliangeită microscopică MPA	FINALIZAT
338	AFLIBERCEPTUM	EYLEA	afectării acuității vizuale determinată de edemul macular secundar occluziei venei retinei (OVR de ram sau OVR centrală)	FINALIZAT
339	BRIVARACETAM	BRIVIACT	terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți și adolescenți, începând cu vârsta de 16 ani.	FINALIZAT
340	LIRAGLUTIDUM	VICTOZA	pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului	FINALIZAT
341	ALFA ELOSULFAZA	VIMIZIM	tratamentul mucopolizaharidozei tip IVA (sindromul Morquio A, MPS IVA) la pacienții de orice vârstă	FINALIZAT
342	TOFACITINIB	XELJANZ	• în asociere cu metotrexat (MTX) este indicat în tratamentul artritei reumatoide (AR) active, moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la, sau care nu tolerează unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii; •administrat ca monoterapie în caz de intoleranță la MTX sau atunci când tratamentul cu MTX nu este adecvat	Finalizat
343	ETIONAMIDUM	ETIONAMIDA 250 mg	Medicament tuberculostatic de linia a 2a la pacienții cu rezistența la medicamentele de linia 1	Finalizat

344	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă	Boala Crohn	Finalizat
345	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă	Colita Ulcerativă	Finalizat
346	COMBINATII (EFAVIRENZUM/ EMTRICITABINUM/ TENOFOVIRUM)	EFAVIRENZ/EMTRICITABI NA/TENOFOVIR disoproxil MYLAN 600 mg /200 mg /245 mg	infecția HIV	Finalizat
347	OMALIZUMAB	XOLAIR 150 mg	tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienți adulți și adolescenți (12 ani și peste această vârstă) cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1	Finalizat
348	ETIONAMIDUM	NA	în combinație cu alte medicamente tuberculostatice ca medicament de linia a doua la pacienții cu Mycobacterium tuberculosis (MT) în condițiile în care s-a instalat rezistența la medicamentele de primă intenție (izoniazidă și rifampicină).	Finalizat
349	LEVOFLOXACINUM	NA	tratamentul infecțiilor bacteriene	Finalizat
350	CLOFAZIMUN	NA	TBC	Finalizat
351	LINEZOLID	NA	TBC	Finalizat
352	Combinatii (Rifampicina+Pirazinamida+I zoniazida)	NA	TBC	Finalizat
353	Combinatii (Amoxicilina+Acid clavulanic)	NA	TBC	Finalizat
354	Combinatii (Imipenem+Cilastatin)	NA	TBC	Finalizat
355	Rifamycin	NA	TBC	Finalizat
356	Combinatii(Rifampicin+Pirazinamid+Izoniazid+Etambutol)	NA	TBC	Finalizat
357	Natrii Cromoglicas		MASTOCITOZA	Finalizat
358	Palbociclib	IBRANCE 75 mg capsule IBRANCE 100 mg capsule IBRANCE 125 mg capsule	tratamentul cancerului mamar avansat local sau metastatic pozitiv pentru receptorul pentru hormoni (HR) i negativ pentru receptorul 2 pentru factorul uman de creștere epidermală (HER2): - în asociere cu un inhibitor de aromatază - în asociere cu fulvestrant la femeile cărora li s-a administrat tratament endocrin anterior La femeile în pre- sau perimenopauză, tratamentul endocrin trebuie combinat cu un agonist al hormonului de eliberare al hormonului luteinizant (LHRH).	Finalizat
359	BECLOMETASONE / FORMOTEROL / GLYCOPYRRONIUM BROMIDE	TRIMBOW 87/5/9 mg	BPOC	Finalizat
360	OLARATUMAB	LARTRUVO	în combinație cu doxorubicina pentru tratamentul pacienților adulți cu sarcom de țesuturi moi în stadii avansate care nu sunt eligibili pentru tratamentul curativ prin intervenție chirurgicală sau radioterapie și care nu au fost tratați anterior cu doxorubicină	Finalizat
361	VENETOCLAX	VENCLYXTO	1. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC) în prezența deleției 17p sau a mutației TP53 la pacienți adulți care nu sunt eligibili pentru sau au avut eșec la un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B. 2. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu LLC în absența deleției 17p sau a mutației TP53 care au avut eșec atât la chimioterapie și imunoterapie cât și la tratamentul cu un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B.	Finalizat
362	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS	tratamentul pacienților adulți cu limfom cutanat cu celule T CD30+ (LCCT) după cel puțin 1 tratament sistemic anterior	Finalizat

363	ARSENICUM TRIOXIDUM	TRISENOX 1mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii și consolidare la pacienții adulți care prezintă: ☑ leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la intermediar, nou diagnosticată (număr de leucocite $\leq 10 \times 10^3/\mu\text{l}$) în asociere cu acidul all-trans retinoic (AATR) ☑ leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară (tratamentul anterior trebuie să fi inclus un retinoid și chimioterapie) caracterizată prin prezența translocăției t(15;17) și / sau prezența genei leucemiei promielocitare/receptorului-alfa al acidului retinoic (LPM/RAR-alfa). Nu a fost studiată rata de răspuns a altor subtipuri de leucemii acute mieloblastice la trioxidul de arsen.	in asteptare
364	LIPEGFILGRASTIMUM	LONQUEx 6 mg soluție injectabilă	Reducerea duratei neutropeniei și a apariției neutropeniei febrile la pacienții adulți tratați cu chimioterapie citotoxică pentru afecțiuni maligne (cu excepția leucemiei mieloide cronice și a sindroamelor mielodisplazice).	in asteptare
365	EVEROLIMUS	AFINITOR	tratamentul tumorilor neuroendocrine, nefuncționale, nerezectabile sau metastatice, bine diferențiate (de gradul 1 sau gradul 2), de origine gastro-intestinală sau pulmonară, la adulți cu boală progresivă	in asteptare
366	NIVOLUMAB	OPDIVO 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul cancerului scuamos de cap și gât la adulți la care boala progresează în timpul sau după terapie pe bază de săruri de platină	Finalizat
367	COMBINATII (TRIFLURIDINUM+TIPIRACILUM)	LONSURF 15 mg/ 6,14 mg comprimate filmate LONSURF 20 mg/ 8,19 mg comprimate filmate	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (CCR –cancer colorectal), cărora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe bază de fluoropirimidină, oxaliplatină și irinotecan, tratamentele anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) și anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)	Finalizat
368	NUSINERSEN	SPINRAZA	tratamentul atrofiei musculare spinale 5q	Finalizat
369	COLISTIMETAT DE SODIU	COLOBREATHE 1662500 UI capsule cu pulbere de inhalat	Colobreathe este indicat în abordarea terapeutică a infecțiilor pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa, la pacienții cu fibroză chistică (FC), cu vârsta de cel puțin 6 ani	in asteptare
370	PERTUZUMABUM	PERJETA	Perjeta este indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică	Finalizat
371	DOLUTEGRAVIR	TIVICAY 10 mg, 25 mg	în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.	Finalizat
372	DOLUTEGRAVIR	TIVICAY 50 mg	în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.	Finalizat
373	CABOZANTINIB	CABOMETYX 40mg, 60mg	tratamentul carcinomului celular renal (CCR) în stadiu avansat, la adulți care au urmat anterior o terapie țintită asupra factorului de creștere al endoteliului vascular (FCEV).	Finalizat
374	CERITINIB	ZYKADIA	a în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat (NSCLC), pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), tratați anterior cu crizotinib	Finalizat
375	AZACITIDINE	VIDAZA	tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice (TCSH), cu LAM cu > 30 % blasti medulari conform clasificării OMS	in asteptare
376	BEVACIZUMAB	AVASTIN	în asociere cu paclitaxel și cisplatină sau, în mod alternativ, cu paclitaxel și topotecan la pacientele cărora nu li se poate administra chimioterapie cu săruri de platină, este indicat pentru tratamentul pacientelor adulte cu carcinom de col uterin persistent, recurent sau metastazat	in asteptare
377	DIMETHYL FUMARATE	Tecfidera 120 mg capsule gastrorezistente Tecfidera 240 mg capsule gastrorezistente	Tecfidera este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă forma recurentremisivă	in asteptare

378	OBINUTUZUMAB	GAZYVARO	Gazyvaro administrat în asociere cu bendamustină, urmat de tratament de întreținere cu Gazyvaro, este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfom folicular (LF) care nu au răspuns la tratament sau au prezentat progresia bolii în timpul sau în interval de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă de tratament care a inclus rituximab	Finalizat
379	PEGINTERFERON BETA 1A	PLEDIGRY	Plegidry este indicat la pacienții adulți pentru tratamentul sclerozei multiple recurent remisive	in asteptare
380	COMBINATII (CARVEDILOLUM+IVABRADINUM)	CARIVALAN	1. tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienți cu boală coronariană 2. tratamentul insuficienței cardiace cronice (clasa II-IV NYHA) cu disfuncție sistolică	in asteptare
381	APREMILAST	OTEZLA	tratamentul psoriazisului în plăci cronic, moderat până la sever, la pacienții adulți care nu au răspuns sau cărora le este contraindicată ori prezintă intoleranță la altă terapie sistemică, inclusiv ciclosporină, metotrexat sau psoralen și raze ultraviolete A (PUVA	in asteptare
382	APREMILAST	OTEZLA	administrat ca monoterapie sau în asociere cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active (APs) la pacienții adulți care au obținut un răspuns inadecvat sau au prezentat intoleranță la o terapie anterioară cu MARMB	in asteptare
383	ERIBULIN	HALAVEN	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar local în stadiu avansat sau metastatic, la care boala a progresat după cel puțin un regim chimioterapic pentru boală în stadiu avansat. Tratamentul anterior trebuia să includă o antraciclină și un taxan fie în context adjuvant, fie în context metastatic, cu excepția cazului în care pacienții nu îndeplineau criteriile pentru administrarea acestor medicamente	Finalizat
384	USTEKINUMAB	STELARA	tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai răspundă sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la antagoniști TNFα, sau aceste tratamente le sunt contraindicate din punct de vedere medical.	in asteptare
385	MIDOSTAURIN	RYDAPT	1) la pacienții adulți nou diagnosticați cu leucemie granulocitară acută (LGA), cu mutație FLT3 în asociere cu chimioterapia standard de inducție cu daunorubicină și citarabină și de consolidare cu doză mare de citarabină, iar la pacienții cu răspuns complet, ca tratament de întreținere cu Rydapt în monoterapie; 2) în tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă (MSA), mastocitoză sistemică cu neoplazie hematologică asociată (MS-NHA) sau leucemie cu celule de tip mastocit (LCM) în monoterapie	Finalizat
386	SILTUXIMABUM	SYLVANT	SYLVANT este indicat în tratamentul pacienților adulți cu boala Castleman multicentrică (BCM) fără infecție cu virusul imunodeficienței umane (HIV) și fără infecție cu virusul herpetic uman de tip 8 (VHU-8)	Finalizat
387	PANOBINOSTATUM	FARYDAK	Farydak, administrat în combinație cu bortezomib și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și/sau refractar cărora li s-au administrat cel puțin două scheme anterioare de tratament incluzând bortezomib și o substanță imunomodulatoare.	Finalizat
388	ATEZOLIZUMAB	TECENTRIQ	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină sau care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatină	in asteptare
389	EFTRENONACOG ALFA	ALPROLIX	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilia B (deficit congenital de factor IX).	Finalizat
390	ABIRATERONE	ZYTIGA	●tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy) ● tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la castrare (mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer), la bărbații adulți asimptomatici sau ușor simptomatici, după eșecul terapiei de deprivare androgenică și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic (vezi pct. 5.1)	in asteptare
391	ATEZOLIZUMAB	TECENTRIQ	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul neoplasmului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie. Pacienților cu mutații activatoare ale EGFR sau mutații tumorale ALK pozitive trebuie, deasemenea, să li se fi administrat tratament specific, înaintea administrării Tecentriq	in asteptare

392	ALECTINIB	ALECENSA	indicat ca monoterapie pentru tratamentul de primă linie al pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, cu status pozitiv pentru kinaza din limfomul anaplastic (ALK). Alecensa este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu NSCLC avansat, cu status pozitiv ALK, tratați anterior cu crizotinib	Finalizat
393	RIBOCICLIB	KISQALI	în asociere cu un inhibitor de aromatază este indicat pentru tratamentul femeilor aflate la postmenopauză, cu cancer mamar, în stadiu avansat sau metastazat local , cu receptori hormonalni (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică (HER2), ca terapie hormonală inițială	Finalizat
394	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulți cărora li s-a administrat anterior chimioterapie care conține săruri de platină	in asteptare
395	IBRUTINIB	IMBRUVICA	în asociere cu bendamustină și rituximab (BR) în tratamentul pacienților adulți cu LLC cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară	Finalizat
396	OCRELIZUMAB	OCREVUS	Ocrevus este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu forme recurente de scleroză multiplă (SMR), cu boală activă definită prin caracteristici clinice și imagistice	Finalizat
397	DASATINIBUM	Sprycel	SPRYCEL este indicat pentru tratamentul copiilor și adolescenților: ■ nou-diagnosticați cu LMC Ph+ în fază cronică (LMC Ph+FC) sau cu LMC Ph+FC cu rezistență sau intoleranță la terapii anterioare, inclusiv imatinib.	Finalizat
398	ATALUREN	Translarna	Translarna este indicat în tratamentul pacienților ambulatorii cu vârsta de 2 ani și peste cu distrofie musculară Duchenne determinată de o mutație de tip nonsens la nivelul genei distrofinei	Finalizat
399	EVOLOCUMAB	Repatha 140 mg	Se utilizează pentru reducerea nivelurilor de lipide din sânge la pacienți care suferă de hipercolesterolemie primară (niveluri ridicate de colesterol în sânge, provocate de o anomalie genetică), de hipercolesterolemie familială homozigotă (o formă severă de colesterol ridicat în sânge, moștenită de la ambii părinți) și de dislipidemie mixtă (niveluri anormale de diferite lipide, inclusiv colesterol). Medicamentul se utilizează și pentru reducerea riscului de probleme cardiace la pacienții cu ateroscleroză (pereți îngroșați ai arterelor) care au avut un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte probleme ale sistemului circulator (boală cardiacă aterosclerotică). Repatha se utilizează în asociere cu o statină, sau cu o statină și alte medicamente pentru scăderea nivelurilor de lipide. Repatha se poate utiliza și fără statină la pacienții care nu pot lua statine. La unii pacienți este necesară și o dietă slabă în grăsimi.	in asteptare
400	PEMBROLIZUMABUM	Keytruda	limfom Hodgkin clasic, o formă de cancer al limfocitelor (un tip de globule albe). Keytruda se utilizează numai după ce tratamentul cu brentuximab vedotin și transplantul autolog de celule stem (un tip de transplant utilizat pentru a înlocui măduva osoasă cu celulele stem ale pacientului) nu au dat rezultate, ori după ce tratamentul cu brentuximab vedotin nu a dat rezultate și nu este posibilă efectuarea unui transplant	in asteptare
401	REGORAFENIBUM	STIVARGA	Monoterapie pt tratamentul pacientilor adulti cu carcinom hepatocelular , care au fost tratati anterior cu sorafenib.	Finalizat
402	EMICIZUMAB	Hemlibra	tratament profilactic de rutină pentru prevenirea sângerărilor sau reducerea frecvenței episoadelor de sângerare la pacienți cu hemofilie A care prezintă inhibitor de factor VIII	in asteptare
403	INSULINA GLARGINE+LIXISENATID	Suliqua	Suliqua este indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală	Finalizat
404	INSULINA DEGLUTEC	Tresiba	Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 1 an.	Finalizat
405	DABIGATRAN ETEXILAT	Pradaxa 110 mg Pradaxa 150 mg	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârsta ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă, (NYHA≥ II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	in asteptare
406	GOLIMUMABUM	Simponi	Colita ulcerativa	in asteptare
407	CAPECITABINE+PALONOSTERON	Akynzeo	prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen accentuat ce conține cisplatină - prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen moderat.	in asteptare

408	TUROCTOCOG ALFA	Novoeight	Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).	Finalizat
409	PERTUZUMABUM	Perjeta	tratament neoadjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc înalt de recurență și tratament adjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER 2 pozitiv, în stadiu incipient, cu risc înalt de recurență	in asteptare
410	BAZOMIB	NINLARO 2,3 mg capsule NINLARO 3 mg capsule NINLARO 4 mg capsule	Ixazomib, în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu care au urmat cel puțin un tratament anterior.	in asteptare
411	AVELUMABUM	Bavencio	carcinom metastatic cu celulu Merkel	in asteptare
412	CLADRIBINUM	MAVENCLAD 10 mg comprimate	MAVENCLAD este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă (SM) recurentă foarte activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	in asteptare
413	DENOSUMAB	Prolia	tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză cu risc crescut de fractura după tratamentul inițiat cu bifosfonati sau care au intoleranță sau contraindicație la bifosfonati.	in asteptare
414	LENALIDOMIDUM	LENALIDOMIDA ALVOGEN 10 mg, 25 mg, 15 mg, 5 mg	Lenalidomidă Alvogen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem. Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomidă Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	Finalizat
415	Cerliponază alfa	Brineura 150 mg soluție perfuzabilă	tratamentul afecțiunii de lipofuscină ceroidă neuronală de tip 2 (LCN2), cunoscută și sub denumirea de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1).	Finalizat
416	Velmanază alfa	Lamzed 10 mg	Terapia de substituție enzimatică în tratamentul manifestărilor non-neurologice la pacienți cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată.	Finalizat
417	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg	Vosevi este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitic C (VHC) la adulți	Finalizat
418	COMBINATII(SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM)	EPCLUSA 400mg/100mg	Epclusa este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulți	Finalizat
419	BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM	FOSTER NEXTHALER 100/6 micrograme pe doză	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.	in asteptare
420	Benralizumabum	Fasenra	Fasenra este indicat ca tratament de întreținere la pacienții adulți cu astm bronșic eozinofilic sever, care nu este controlat în mod adecvat prin administrarea inhalatorie a unei doze mari de corticosteroizi plus β-agoniști cu durată lungă de acțiune	in asteptare
421	Pembrolizumab	KEYTRUDA	KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici(NSCLC, non-small cell lung carcinoma),metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1cu un scor tumoral proporțional (STP)≥50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.	Finalizat
422	Turoctocog alfa, factor de coagulare VIII	NovoEight ®	Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).NovoEight poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.	Finalizat
423	Lenalidomidă	Lenalidomidum	Este indicat în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	Finalizat
424	Trametinib	Mekinist	administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib , este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic , cu mutație BRAF V600	in asteptare
425	Dabrafenib	Tafinlar	administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib , este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic , cu mutație BRAF V600	in asteptare
426	Propranololum	Hemangioli	Hemangiomi infantili	in asteptare

427	Burosumabum	CRYSVITA 10 mg	CRYSVITA este indicat pentru tratamentul hipofosfatemiei X-linkate (HXL), cu evidențe radiografice de boală osoasă, la copii cu vârsta de 1 an și peste și adolescenți al căror schelet este în creștere.	Finalizat
428	Lenalidomidă Sandoz	Lenalidomidum	Mielom multiplu Lenalidomidă Alvogen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem. Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomidă Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
429	Icatibant	Firazyr	Firazyr este indicat pentru tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditar (AEE) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste cu deficit de inhibitor al C1-esterazei.	Finalizat
430	Darvadstrocel	Alofisel	Alofisel este indicat pentru tratamentul fistulelor perianale complexe la pacienții adulți cu boala Crohn	Finalizat
431	Ruxolitinib	Jakavi	tratamentul pacienților adulți cu policitemia vera care prezintă rezistență sau intoleranță la hidroxiuree.	în așteptare
432	Combinatii Dapagliflozin + Metformin	Xigduo	Xigduo este indicat ca tratament adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2; - la pacienții controlați inadecvat cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie - în asociere cu alte medicamente pentru scăderea glicemiei, inclusiv insulina, la pacienții controlați inadecvat cu metformin - pentru pacienții tratați deja cu asocierea dapagliflozin și metformin sub formă de comprimate separate	în așteptare
433	CRIZOTINIB	XALKORI	tratamentul de primă intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv).	Finalizat
434	Guselkumab	Tremfya	Tremfya este indicat în tratamentul psoriazisului în plăci, formele moderate până la severe, la pacienții care sunt eligibili pentru terapia sistemică.	în așteptare
435	combinatii darunavir+cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamida	Symtuza	Symtuza este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la adulți și adolescenți (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 40 kg)	în așteptare
436	Blinatumomab	Blinicyto	monoterapie pentru tratamentul adulților cu LLA precursor de celulă B, cu cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă, în primă sau a doua remisie completă cu boala minimă reziduală (minimal residual disease, MRD) mai mare sau egală cu 0,1%	în așteptare
437	Migalastat	GALAFOLD	Migalastat este indicat pentru tratamentul de lungă durată al adulților și adolescenților în vârstă de cel puțin 16 ani, cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficit de alfa-galactozidază A) și care prezintă o mutație sensibilă	Finalizat
438	Brentuximab Vedotin	ADCETRIS	Adcetris este indicat pentru pacienții adulți cu limfom Hodgkin (LH) CD30+ stadiu IV, netratat anterior, în asociere cu doxorubicină, vinblastină și dacarbazină (AVD)	Finalizat
439	Fampridinum	Fampyra	îmbunătățirea mersului la pacienții adulți cu scleroză multiplă care prezintă invaliditate (EDSS4-7)	în așteptare
440	Pomalidomida	IMNOVID	în asociere cu dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-a administrat cel puțin două regimuri terapeutice anterioare, incluzând lenalidomidă și bortezomib și care au prezentat progresia bolii la ultimul tratament	Finalizat
441	Avelumabum	Bavencio	carcinom metastatic cu celule Merkel	Finalizat
442	Nilotinib	Tasigna	copii și adolescenți cu LGC, cu cromozom Philadelphia, în fază cronică, care prezintă rezistență sau intoleranță la terapia inițială care a inclus imatinib	în așteptare
443	Comb (Ledipasvirum+Sofosbuvirum)	Harvoni	tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și < 18 ani	Finalizat
444	Ixekizumabum	TALTZ	tratamentul artritei psoriazice active la adulți la care răspunsul terapeutic a fost inadecvat sau a demonstrat intoleranță după administrarea unuia sau a mai multor medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD)	în așteptare

445	Ixekizumabum	TALTZ	tratamentul psoriazisului in placi moderat pana la sever la adultii care sunt eligibili pentru terapie sistemica si care prezinta pe langa diagnosticul principal psoriazis afectare articulara	in asteptare
446	Patisiran	ONPATTRO	tratamentul amiloidozei ereditare mediata de transtiretina (amiloidoza hATTR) la pacientii adulti cu polineuropatie de stadiu 1 sau stadiu 2	in asteptare
447	Nivolumab	OPDIVO	in monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastazat la care s-a efectuat rezectie completa	Finalizat
448	Pembrolizumabum	Keytruda	pacienti adulti cu carcinom pulmonar, altul decat cel cu celule mici (NSCLC, non-small lung cancer) metastatic, scuamos, ale caror tumori nu prezinta mutatii EGFR sau ALK pozitive si care pot fi tratati cu medicamentul Keytruda in asociere cu carboplatina si fie paclitaxel, fie nab-paclitaxel	in asteptare
449	Abemaciclibum	Verzenios	trat femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv si receptor pentru factorul de crestere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, in asociere cu fulvestrant ca tratament hormonal initial sau la femei carora li s-a administrat anterior tratament hormonal	in asteptare
450	Abemaciclibum	Verzenios	tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv si receptor pentru factorul de crestere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, in asociere cu inhibitor de aromataza ca tratament hormonal initial sau la femei carora li s-a administrat anterior tratamentului hormonal	in asteptare
451	Obinutuzumab	Gazyvaro	tratamentul pacientilor cu limfom folicular in forma avansata ,netratati anterior	Finalizat
452	VENETOCLAX	VENCLYXTO	Venclyxto administrat în asociere cu rituximab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) care au primit anterior cel puțin un tratament.	Finalizat
453	Durvalumabum	Imfinzi	in monoterapie este indicat in tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) local avansat, inoperabil, pentru pacienti adulti ale caror tumori exprima PD-L1 la ≥1% dintre celulele tumorale si a caror boala nu a progresat dupa radio-chimioterapie cu compusi pe baza de platina	in asteptare
454	TISAGENLECLEUCEL	KYMRIAH	tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe linii de terapie sistemică	in asteptare
455	TRAMETINIB	MEKINIST	Trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	in asteptare
456	DABRAFENIB	TAFINLAR	Dabrafenib în asociere cu trametinib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	in asteptare
457	TISAGENLECLEUCEL	KYMRIAH	tratamentul pacienților copii și adolescenți și pacienților adulți tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în remisie post-transplant sau în a doua sau a treia recidivă	in asteptare
458	Semaglutidum	Ozempic	Ozempic este indicat pentru tratamentul adultilor cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dieta si exercitii fizice: - sub forma de monoterapie atunci cand administrarea de metformin este considerata inadecvata din cauza intolerantei sau a contraindicatiilor - in asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat	in asteptare
459	Agalsidasum Alfa	Replagal	indicat pentru terapia de substitutie enzimatica pe termen lung la pacienti cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienta de alfa-galactosidaza A)	in asteptare
460	Irinotecan lipozomal	ONIVYDE 4,3 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Tratamentul adenocarcinomului pancreatic metastazat, în asociere cu 5-fluorouracil (5-FU) și leucovorin (LV), la pacienți adulți la care afecțiunea a progresat sub tratament pe bază de gemcitabină.	in asteptare
461	Sirolimus	Rapamune	Rapamune este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfangioleiomiomatoză sporadică, cu boală pulmonară moderată sau funcție pulmonară în declin	in asteptare
462	Dupilumab	Dupixent	Tratamentul dermatitei atopice forma moderata pana la severa la pacienii adulti care sunt candidati pentru terapie sistemica	in asteptare
463	Everolimus	Votubia	Tratamentul adjuvant al pacientilor cu varsta de 2 ani si peste aceasta varsta, ale caror convulsii referactare, cu debut partial, cu sau fara generalizare secundara, sunt asociate cu complexul sclerozei tuberoase(CST)	Finalizat
464	Apomorfium	APO-GO	trat. Fluctutilor motorii la pac. cu b. Parkinson	in asteptare
465	Caplacizumab	Cablivi	Tratamentul adultilor care manifesta un episod de purpura trombocitopenica trombotica dobandita (PTTd), in asociere cu plasmafereza si tratament imunosupresor	in asteptare

466	Pegaspargasum	ONCASPAR	indicat ca o componenta a terapiei combinate antineoplazice in leucemia limfoblastica acuta (LAL) la copii si adolescenti de la nastere pana la 18 ani si la pacienti adulti	in asteptare
467	Elmorotocog alfa	Elocta	tratamentul si profilaxia hemoragiilor la pacientii cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII). Elocta poate fi utilizat la toate grupele de varsta	in asteptare
468	Comb (Bictegravir+Emtricitabina+Tenofovir alafenamida)	Biktarvy	tratamentul adultilor infectati cu virusul imunodeficientei umane de tip 1 (HIV-1) fara evidente prezente sau anterioare de rezistenta virala la clasa inhibitorilor integrazei , emtricitabina sau tenofovir	in asteptare
469	Insulinum degludec	Tresiba	tratamentul diabetului zaharat la adulti,adolescenti si copii de la varsta de 1 an	Finalizat
470	Rosuvastatina+perindopril+indapamida	Roxiper	tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale, și care prezintă și una dintre următoarele afecțiuni concomitente: hipercolesterolemie primară (tip IIa incluzând hipercolesterolemie familială heterozigotă), dislipidemia mixtă (tip IIB) sau hipercolesterolemie familială homozigotă	in asteptare
471	Pembrolizumabum	Keytruda	Introducere in compensare ambalaj nou	in asteptare
472	Daratumomab	Darzalex	in asociere cu bortezomib, melfalan si prednison pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu nou diagnosticat si care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem	in asteptare
473	Lurasidona	Latuda	tratamentul este indicat pentru tratamentul schizofreniei la adulti cu varsta de 18 ani sau mai mare	in asteptare
474	Sunitinib	Sutent	Sutent este indicat pentru tratamentul tumorilor neuroendocrine pancreatice (pNET) bine diferențiate, nerezecabile sau metastatice, la adulți care au prezentat progresia bolii.	in asteptare
475	Lenalidomide Accord	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.	in asteptare
476	Lenalidomide Accord	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	in asteptare
477	Perjeta	Pertuzumabum	Cancer mamar incipient Perjeta este indicat în asociere cu trastuzumab și chimioterapie pentru: • tratament neoadjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc înalt de recurență • tratament adjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER 2 pozitiv, în stadiu incipient, cu risc înalt de recurență	in asteptare
478	Dinutuximab beta	Qarziba 4,5 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Qarziba este indicat pentru tratamentul neuroblastomului cu grad mare de risc la pacienții cu vârsta peste 12 luni, cărora li s-a administrat anterior chimioterapie de inducție și care au obținut cel puțin un răspuns parțial, urmat de terapie mieloablativă și transplant de celule stem, precum și la pacienții cu antecedente de neuroblastom recurent sau rezistent, cu sau fără boală reziduală. Înaintea tratamentului pentru neuroblastom recurent, orice boală activă care progresează trebuie stabilizată prin alte măsuri adecvate. În cazul pacienților cu antecedente de boală recurentă/rezistentă și al pacienților care nu au obținut un răspuns complet după terapia de primă linie, Qarziba trebuie administrat în asociere cu interleukină-2 (IL-2)	in asteptare
479	AFATINIBUM	GIOTRIF 20 mg comprimate filmate GIOTRIF 30 mg comprimate filmate GIOTRIF 40 mg comprimate filmate	GIOTRIF este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutație(i) activatoare a(le) EGFR, netratați anterior cu Receptorul Factorului de Creștere Epidermal (EGFR) TK	in asteptare
480	DULAGLUTIDUM	TRULICITY	Trulicity este indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic sub formă de: Monoterapie Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. Terapie combinată În combinație cu alte medicamente hipoglicemizante, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	in asteptare

481	Olaparibum	Lynparza	Monoterapie ca tratament de intretinere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad inalt recidivat cu mutatie BRCA (germinala si/sau somatica) neoplazie de trompa uterina sau neoplazie peritoneala primara, sensibile la medicamente pe baza de platina, cu raspuns (complet sau partial) la chimioterapie pe baza de platina)	in asteptare
482	Lenalidomidum	Lenalidomidă Alvogen	Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.	in asteptare
483	Lenalidomidum	Lenalidomidă Alvogen	Lenalidomida Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	in asteptare
484	Cresemba	Isavuconazolum	Cresemba este indicat la adulti pentru tratamentul mucormicozei la pacientii la care amfotericina B este inadecvata	in asteptare
485	Cresemba	Isavuconazolum	Cresemba este indicat la adulti pentru tratamentul aspergilozei invazive	in asteptare
486	Ivacaftor	Kalydeco	Kalydeco comprimate este indicat pentru tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC) cu vârsta de 6 ani și peste și cu greutatea de 25 kg sau mai mult, care prezintă una dintre următoarele mutații de sincronizare (clasa III) la nivelul genei CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N sau S549R	in asteptare
487	Lenalidomidum	Lenalidomida Sandoz	indicat, in asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu carora li s-a administrat cel putin un tratament anterior	in asteptare