

| Nr crt | DCI             | DC                   | INDICAȚIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stadiu    |
|--------|-----------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1      | Regorafenibum   | Stivarga             | Tratamentul adulților cu neoplasm colorectal (NCR) metastatic carora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe baza de fluoropirimidina, un tratament anti-VEGF și un tratament anti EGFR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 2      | Dapagliflozinum | Forxiga              | Forxiga este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie dacă dieta și exercitiile fizice nu asigură un control corespunzător al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminului nu este adecvată din cauza intoleranței sau tratament adjuvant asociat în asociere cu alte medicamente care scad concentrația plasmatică de glucoză, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercitiile fizice, nu asigură un control glicemic corespunzător.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 3      | Vildagliptinum  | Galvus               | Vildagliptin este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la adulți: În monoterapie - la pacienții cu control adecvat numai prin regim alimentar și exerciții și pentru care metformina nu este recomandată datorită contraindicațiilor sau intoleranței. Ca tratament oral dublu, în asociere cu - metformina, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerată de metformina în monoterapie, - o sulfoniluree, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerată de sulfoniluree și pentru care tratamentul cu metformina este recomandabil din cauza contraindicațiilor sau intoleranței, - o tiazolidindionă, la pacienții cu control glicemic insuficient și la care este indicată utilizarea unei tiazolidindione. Ca tratament oral triplu, în asociere cu - o sulfoniluree și o metformina când exercitiile fizice împreună cu tratamentul dual cu aceste medicamente nu asigură un control glicemic adecvat. Vildagliptin este, de asemenea, indicată pentru administrarea în asociere cu insulina (cu sau fără metformina) când regimul alimentar și exercitiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat. | Finalizat |
| 4      | Saxagliptinum   | Onglyza 2,5mg și 5mg | Onglyza este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia asociere cu alte medicamente antidiabetice orale (ADO), dubla în asociere cu metformin, atunci când monoterapia cu metformin, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, o sulfoniluree, atunci când monoterapia cu sulfoniluree, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care administrarea de metformin este considerată inadecvată, o tiazolidindionă, atunci când monoterapia cu tiazolidindionă, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, la pacienții la care administrarea unei tiazolidindione este considerată adecvată, în terapia orală triplă în asociere cu metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 5      | Ustekinumabum   | Stelara              | Stelara este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu <b>psoriazis</b> în placi, forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen și ultraviolete A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 6      | Riociguat       | Adempas              | Hipertensiune pulmonară cronică tromboembolică (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu clasa funcțională II și III conform clasificării OMS cu: -HAPCTE inoperabilă, -HAPCTE persistentă sau recurentă după un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacității de efort fizic. Hipertensiune arterială pulmonară (HAP). Adempas, în monoterapie sau în combinație cu antagoniști ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu hipertensiune arterială pulmonară (HAP) cu clasa funcțională II și III conform clasificării OMS pentru ameliorarea capacității de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrată la pacienți cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatică sau ereditară sau HAP asociată cu o boală a țesutului conjunctiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 7      | Febuxostatium   | Adenuric             | Tratamentul Hiperuricemiei cronice în bolile în care depunerea de urati a avut deja loc (inclusiv toful gutos și/sau artrita gutosă în antecedente sau în prezent). Adenuric este indicat pentru adulți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 8      | Belimumab       | Benlysta             | Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacienții adulți cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |

|    |                                                                      |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |
|----|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 9  | Bromura de acildinium                                                | Bretaris Genuair 322micrograme | Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacientii adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 10 | Certolizumab Pegol                                                   | Cimzia 200mg                   | Artrita psoriazica. Cimzia, in asociere cu MTX, este indicat in tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie in cazul intolerantei la metotrexat sau cand continuarea tratamentului cu metotrexat este inadecvata. Tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat.                       | Finalizat |
| 11 | Duodart (Dutasterida + Clorhidrat de Tamsulosin)                     | Duodart                        | Tratamentul simptomelor moderate pana la severe ale hiperplaziei benigne de prostata (HBP). Reducerea riscului de retentie acuta de urina (RAU) si a necesitatii interventiilor chirurgicale la pacientii cu simptome moderate pana la severe de HBP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 12 | Degarelix                                                            | Firmagon                       | Firmagon este un antagonist al hormonului eliberator de gonadotrofina (GnRH) indicat pentru tratamentul pacientilor adulti de sex masculin cu cancer de prostata hormono-dependent in stadiu avansat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 13 | Ulipristal Acetat                                                    | Esmya                          | Tratamentul preoperator al simptomelor moderate pana la severe ale fibroamelor uterine la femeile adulte aflate la varsta fertila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 14 | Ethionamidum                                                         | Etionamida ATB                 | Medicament tuberculostatic de linia a II la pacientii cu rezistenta la medicatia antituberculoasa de linia I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 15 | Carboximaltoza ferica                                                | Ferinject                      | Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei asociate cu insuficienta renala cronica pentru pacientii in predializa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 16 | Carboximaltoza ferica                                                | Ferinject                      | Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei prin deficit de fier asociate bolilor inflamatorii intestinale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 17 | Denosumab                                                            | Xgeva                          | Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 18 | Dapagliflozinum                                                      | Forxiga                        | Forxiga este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie daca dieta si exercitiile fizice nu asigura un control corespunzator al glicemiei la pacientii la care utilizarea metforminului nu este adecvata din cauza intolerantei.                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 19 | Dipropinat de beclometazona anhidru / fumarat de formoterol dihidrat | Foster                         | BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la pacienti care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 20 | Lantanum                                                             | Fosrenol                       | Fosrenol este indicat, de asemenea, pacienților adulți cu <b>boală renală cronică</b> , nedializați, având nivelul concentrației plasmatic de fosfat $\geq 1,78$ mmol/L, la care exclusiv dieta săracă în fosfat este insuficientă pentru a controla nivelul fosfaților.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 21 | Everolimus                                                           | Afinitor                       | Cancer mamar in stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenti, cu HER2/neu negativ, administrat in combinatie cu exemestane, la femeile in postmenopauza, fara boala viscerală simptomatica, dupa recurenta sau progresia bolii in urma administrarii unui inhibitor de aromataza non-steroidal.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 22 | Everolimus                                                           | Afinitor                       | Carcinom celular renal avansat, care au inregistrat progresie a bolii la sau in urma tratamentului cu terapie tintita asupra FCEV (factor de crestere endoteliala vasculara).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 23 | Eplerenona                                                           | Inspra                         | In asociere cu tratamentul standard optim pentru scaderea riscului mortalitatii si morbiditatii cardiovasculare la pacienti adulti cu insuficienta cardiaca (cronica) clasa II NYHA si disfunctie ventriculara stanga (FEVS $\leq 30\%$ ).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 24 | Canagliflozin                                                        | Invokana                       | Invokana este indicat la dulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic fiind administrat ca monoterapie (in cazul in care doar prin dieta si exercitii fizice nu se obtine un control glicemic adecvat la pacientii la care utilizarea de metformin este inadecvata datorita intolerantei sau contraindicatiilor) sau terapie adjuvanta (terapie adjuvanta la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci cand acestea, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control glicemic adecvat). | Finalizat |
| 25 | Everolimus                                                           | Afinitor                       | Tumori neuroendocrine, nerezectabile sau metastatice, bine sau moderat diferentiate, de origine pancreatică, la adulti cu boala progresiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 26 | Gefitinibum                                                          | Iressa                         | Iressa este indicata pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozininkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR TK (linia all-a).                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 27 | Gefitinibum                                                          | Iressa                         | Tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC -non small cell lung cancer ), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozininkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR TK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 28 | Alemtuzumab                                                          | Lemtrada                       | Pacientii adulti cu scleroza multipla recurent-remisiva (SMRR), cu boala activa, definita prin caracteristici clinice sau imagistic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 29 | Minocyclinum                                                         | Minoz MR                       | Tratamentul acneei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |

|    |                                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |
|----|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 30 | Fotemustinum                        | Mustophoran    | Melanom malign diseminat cu metastaze cerebrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 31 | Rotigotinum                         | Neupro         | Tratamentul simptomatic al sindromului picioarelor nelinistite idiopatic, moderat pana la sever                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 32 | Nepafenac                           | Nevanac        | Prevenirea si tratamentul durerilor si inflamatiilor postoperatorii asociate cu operatia de cataracta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 33 | Simeprevirum                        | Olysio         | Olysio, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 34 | Tapentadolum                        | Palexia        | Palexia retard este indicat la adulti pentru abordarea terapeutica a durerilor cronice severe care pot fi tratate adecvat numai cu analgezice opioide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 35 | Dabigatran Etxilat                  | Pradaxa        | Preventia accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacienti adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara (FANV) ce prezinta unul sau mai multi dintre urmatoarii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral, atac ischemic tranzitoriu (AIT), varsta ≥75 ani, insuficienta cardiaca (NYHA≥ II), diabet zaharat, hipertensiune arteriala.                                                                                                                                     | Finalizat |
| 36 | Perindopril argininum + Amlodipinum | Prestance      | Hipertensiune arteriala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 37 | Perindopril argininum + Amlodipinum | Prestance      | Boala coronariana stabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 38 | Denosumab                           | Prolia         | Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 39 | Furoat de fluticazona/vilanterol    | Relvar Ellipta | Relvar Ellipta este indicat in tratamentul regulat la astmul bronic la adulti si adolescenti cu varsta de 12 ani si peste, la care este adecvata utilizarea unui medicament combinat (beta <sub>2</sub> agonisti cu durata lunga de actiune si corticosteroidi cu administrare inhalatorie): Pacienti la care nu se obtine un control adecvat prin terapia cu corticosteroidi cu administrare inhalatorie si beta <sub>2</sub> agonisti cu durata scurta de actiune cu administrare inhalatorie, utilizata la nevoie. | Finalizat |
| 40 | Fluticazona/ Vilanterol             | Relvar Ellipta | Relvar Ellipta este indicat in tratamentul simptomatic al adultilor cu BPOC cu VEMS <70% din valoarea predictibila normala (post-bronhodilatator) si cu un istoric de exacerbări, in ciuda administrării regulate a unei terapii bronhodilatatoare.                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 41 | Agalsidasum alfa                    | Replagal       | Replagal este indicat pentru terapia de substitutie enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiență de α-galactosidază A).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 42 | Eltrombopag olamina                 | Revolade       | Revolade este indicat pentru tratamentul adultilor cu infectie cu virusul hepatic C (VHC) pentru tratamentul trombocitopeniei, in situatiile in care gradul de trombocitopenie este factorul principal care impiedica initierea sau limiteaza posibilitatea mentinerii unei terapii optime pe baza de interferon.                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 43 | Bendamustinum                       | Ribovact       | Tratament de prima linie in Leucemia Limfatica Cronica(LLC), Binet stadiul B sau C, la pacientii la care nu este indicata chimioterapia care contine fludarabina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 44 | Bendamustinum                       | Ribovact       | Tratament de prima linie in mielomul multiplu(MM), Durie-Salmon stadiul II cu progresie sau stadiul III, in asociere cu prednison, la pacienti cu varsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem si care prezinta neuropatie clinica in momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomida sau bortezomib.                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 45 | Conestat Alfa                       | Ruconest       | Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adultii cu angioedem ereditar (AEE) cauzat de deficitul de inhibitor al C1-esterazei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 46 | Tafloprostum                        | Saflutan       | Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții adulti cu varsta ≥ 18 ani cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară.<br>Ca monoterapie la pacienții:<br>• care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți<br>• care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie<br>• care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie<br>Ca adjuvant in tratamentul cu beta-blocante.                                                | Finalizat |
| 47 | Nalmefen                            | Selincro       | Reducerea consumului de alcool la pacientii adulti cu dependenta de alcool si care au un risc crescut de consum de alcool, fara simptome somatice de sevraj si care nu necesita in mod imediat tratament detoxifiant                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 48 | Bedaquilinum                        | Sirturo        | Sirturo este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 49 | Ustekinumabum                       | Stelara        | Stelara, in monoterapie sau in asociere cu MTX este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu artrita psoriazica activa care au avut un raspuns insuficient la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice non-biologice modificatoare ale evolutiei bolii (MARMB).                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 50 | Lapatinib                           | Tyverb         | Tyverb este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm mamar, ale caror tumori exprima HER2 (ErbB2) in exces in asociere cu trastuzumab, la pacientii cu boala metastatica cu receptori hormonalni absenti, progresiva in urma unor terapii anterioare ce trastuzumab in combinatie cu chimioterapie.                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 51 | Regorafenibum                       | Stivarga       | Stivarga este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu tumori stromale gastro-intestinale (GIST- Gastrointestinal stromal tumor) nerezectabil sau metastatice care au progresat sau care nu au tolerat tratamentul anterior cu imatinib si sunitinib.                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 52 | Oxiconomum/Naloxonom                | Targin         | Dureri severe, care pot fi tratate in mod adecvat numai cu analgezice opioide. Naloxona, antagonist opioid este adaugata pentru a contracara constipatia indusa de opioide prin antagonizarea actiunii oxicononei la nivelul receptorilor opioizi locali, in intestin.                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 53 | Imunoglobulina Anti-Limfocite       | Thymoglobuline | Tratamentul anemiei aplastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 54 | Fesoterodina                        | Toviaz         | Tratamentul simptomelor (polakiurie si/sau mictuni imperioase si/sau incontinenta imperioasa) care pot surveni la pacientii adulti cu sindrom de vezica hiperactiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 55 | Atosiban                            | Tractocile     | Tractocile este indicat pentru intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte cu: • contractii uterine regulate, cu durata de cel putin 30 secunde, cu o frecventa de ≥ 4 si 30 minute; • dilatatie cervicala de 1 pana la 3 cm (0-3 cm la nulpare) si stergere a colului uterin de ≥ 50%; • varsta ≥18 ani; • varsta sarcinii cuprinsa intre 24 si 33 de saptamani complete; • frecventa normala a batailor cardiace fetale. Intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte.         | Finalizat |
| 56 | Telmisartan+Amlodipna               | Twynsta        | Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale la adulti. Terapie de asociere. Indicata la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu amlodipina. Terapie de substitutie. Pacientilor adulti la care tensiunea arteriala esentiala este controlata adecvat si carora li se administreaza telmisartan si amlodipina sub forma de monoterapie li se pot administra in schimb comprimate de Twynsta care contin in compozitie aceleasi doze                                                      | Finalizat |
| 57 | Agomelatinum                        | Valdoxan       | Tratamentul episoadelor depresive majore la adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 58 | Silodosin                           | Urorec 4mg/8mg | Tratamentul semnelor si simptomelor hiperplaziei prostatice benigne (HPB) pentru grupurile speciale de pacienti, cu insuficienta renala si hepatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |

|    |                                              |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----|----------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 59 | Cilostazol                                   | Velyn                  | Claudicație intermitentă fără semne de necroză a țesutului periferic (boala arterială periferică stadiul II Fontaine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 60 | Lacosamidum                                  | Vimpat                 | Vimpat este indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienții adulți și adolescenți (16-18 ani) cu epilepsie.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 61 | Paliperidonom Palmitat                       | Xeplion                | XEPLION este indicat în tratamentul de întreținere al schizofreniei la apacienții adulți stabiliți cu paliperidona sau risperidona. La pacienții adulți selectați cu schizofrenie și care au răspuns anterior la administrarea orală a paliperidonei sau risperidonei, se poate administra XEPLION fără stabilizare anterioară cu un tratament pe cale orală dacă simptomele psihotice sunt ușoare până la moderate și este necesar un tratament injectabil cu eliberare prelungită. | Finalizat |
| 62 | Trastuzumabum                                | Herceptin              | Trastuzumabum (Herceptin) în asociere cu capecitabina sau 5-fluorouracil și cisplatina este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu adenocarcinom gastric metastatic HER2 pozitiv sau a joncțiunii gastroesofagiene, cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului pentru boala lor metastatică.                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 63 | Vismodegib                                   | Erivedge               | Erivedge este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu: carcinom bazocelular metastatic simptomatic sau carcinom bazocelular avansat local, inadecvat pentru intervenție chirurgicală sau radioterapie.                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 64 | Abirateronum                                 | Zytiga                 | Zytiga este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în tratamentul neoplasmului de prostată metastatic rezistent la castrare, la bărbații adulți care sunt asimptomatici sau ușor simptomatici după eșecul terapiei de privare de androgeni și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic.                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 65 | Furoat de fluticazona                        | Avamys                 | Avamys este indicat pentru tratamentul simptomelor rinitei alergice. Avamys este indicat la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 6 ani peste).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 66 | Bosutinib                                    | Bosulif                | Bosulif este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) în faza cronică (FC), faza accelerată (FA) sau faza blastică (FB), tratați anterior cu unul sau mai mulți inhibitori de tirozinază și la care administrarea de imatinib, nilotinib și dasatinib nu este considerată o opțiune terapeutică adecvată.                                                                                               | Finalizat |
| 67 | Toxina botulinică                            | Dysport                | Ca medicație adjuvantă fizioterapiei, pentru reducerea spasticității membrului superior, apărută ca urmare a unui accident vascular cerebral -prezentând astfel un beneficiu semnificativ pentru pacientul adult.                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 68 | Dalteparin                                   | Fragmin                | Tratamentul de durată al tromboemboliei venoase simptomatice (TEV) pentru prevenirea recurenței TEV la pacienții cu cancer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 69 | Bevacizumabum                                | Avastin                | Neoplasm ovarian epitelial, neoplasm de trompe uterine și neoplasm peritoneal primar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 70 | Fenilbutirat de Sodiu                        | Ammonaps               | Ammonaps este indicat ca adjuvant în tratamentul cronic al tulburărilor de ciclu ureic, incluzând deficiența de carbamil-fosfat-sintetază, ornitin-transcarbamilază sau argininosuccinat-sintetază.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 71 | Ofatumumab                                   | Arzerra                | Arzerra, în asociere cu clorambucil sau bendamustina, este indicat în tratamentul pacienților cu LLC care nu au primit tratament anterior și care nu sunt eligibili pentru tratamentul pe baza de fludarabina.                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 72 | Teriflunomidum                               | Aubagio                | Este indicat la adulți, pentru tratamentul pacienților cu scleroză multiplă recurent-remisivă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 73 | Cabazitaxelum                                | Jevtana                | Jevtana este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostată metastatic hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament continuând docetaxel.                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 74 | Bilastinum                                   | Borenar                | Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice (sezoniere și perene).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 75 | Bilastinum                                   | Borenar                | Tratamentul simptomatic al urticariei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 76 | Combinații (Candesartan cilexetil+Amlodipin) | Caramlo                | Terapie de substituție la pacienții adulți cu hipertensiune arterială esențială a căror tensiune arterială este controlată adecvat cu amlodipină și candesartan administrate concomitent în aceleași doze                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 77 | Bisoprololum + Amlodipinum                   | Concor AM              | Concor AM este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale ca terapie de substituție pentru pacienții la care s-au administrat separat medicamentele individuale în același regim de dozaj ca și în combinație.                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 78 | Ivabradinum                                  | Corlontor              | Tratamentul insuficienței cardiace cronice. Ivabradina este indicată în insuficiența cardiacă cronică clasa II-IV NYHA cu disfuncție sistolică, la pacienți în ritm sinus și a căror frecvență cardiacă este ≥ 75 bpm, în asociere cu terapia standard incluzând beta-blocante sau atunci când tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat.                                                                                                                  | Finalizat |
| 79 | Toxina botulinică                            | Dysport                | Torticolis spastic/distonie cervicală (adulți)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 80 | Toxina botulinică                            | Dysport                | Paralizii spastice la copii cu vârsta de doi ani sau peste, cu infirmitate motorie cerebrală cum este deformarea dinamică, datorată spasticității - picior equin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 81 | Lapatinibum                                  | Tyverb                 | Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu trastuzumab, la pacienții cu boală metastatică cu receptori hormonali absenți, progresivă în urma unor terapii anterioare cu trastuzumab în combinație cu chimioterapie                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 82 | Conestat alfa                                | Ruconest               | Episoade acute de angioedem la adulți cu angioedem ereditar (aee) datorat deficitului de inhibitor al C1-esterazei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 83 | Dabigatran Etxilat                           | Pradaxa                | Prevenția primară a evenimentelor tromboembolice venoase la pacienții adulți care au suferit o intervenție chirurgicală electivă de înlocuire completă de sold sau o intervenție chirurgicală de înlocuire completă a genunchiului.                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 84 | Afliberceptum                                | Zaltrap                | Zaltrap în asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulți cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat după o schemă de tratament pe baza de oxaliplatină.                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 85 | Candesartanum Cilexetil + HCT                | Canzeno HCT 8mg/12.5mg | Tratamentul hipertensiunii esențiale insuficient controlată prin monoterapie cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazidă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |

|     |                                          |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |
|-----|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 86  | Sitagliptinum + Metforminum              | Janumet                      | Pentru pacientii adulti cu diabet zaharat de tip 2, Janumet este indicat: ●ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin in monoterapie sau la cei care au fost deja tratati cu asocierea dintre sitagliptin si metformin. ●sub forma de terapie tripla in asociere cu o sulfoniluree ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si o sulfoniluree. ● sub forma de terapie tripla, in asociere cu un agonist al receptorilor gama activati de proliferatorul peroxizomilor (PPAPy) (adica, o tiazolidindion) ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si un agonist PPARY. ● sub forma de terapie adaugata tratamentului cu insulina (terapie tripla), ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii la care doza stabilita de insulina si metformin in monoterapie nu realizeaza un control glicemic adecvat.                                                                                                           | Finalizat |
| 87  | Saxagliptinum + Metforminum              | Komboglyze                   | Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu terapie combinata tripla (cu ADO)). Ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima tolerata de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic adecvat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 88  | Saxagliptinum                            | Onglyza 2,5mg si 5mg         | Onglyza este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2, in scopul imbunatatirii controlului glicemic in terapie combinata, in asociere cu insulina (cu sau fara metformin), cand acest tratament, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 89  | Epoetinum Zeta                           | Retacrit                     | Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficientei renale cronice (IRC) la pacientii adulti, adolescenti si copii: - Tratamentul anemiei asociate cu insuficienta renala cronica la pacientii adulti, copii si adolescenti supusi hemodializei si la pacientii adulti supusi dializei peritoneale. - Tratamentul anemiei simptomatice severe de etiologie renala la pacientii adulti cu insuficienta renala care nu sunt inca supusi dializei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 90  | Epoetinum Zeta                           | Retacrit                     | Retacrit poate fi folosit pentru cresterea disponibilului de sange autolog la pacientii incadrati intr-un program de pre-donare. Decizia utilizarii in aceasta indicatie trebuie cantarita si in functie de riscul raportat de evenimente tromboembolice. Tratamentul trebuie administrat numai pacientilor cu anemie moderata (fara deficit de fier) daca procedurile de conservare a sangelui nu sunt disponibile sau sunt insuficiente atunci cand interventiile chirurgicale electiv majore planificate necesita volume mari de sange (4 sau mai multe unitati de sange pentru femei sau 5 sau mai multe unitati pentru barbati).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 91  | Epoetinum Zeta                           | Retacrit                     | Tratamentul anemiei si reducerea nevoilor transfuzionale la pacienti adulti tratati prin chimioterapie pentru tumori solide, limfoame maligne sau mieloame multiple, si care prezinta risc la primirea transfuziei, dupa cum indica starea generala a pacientului (de exemplu: statusul cardiovascular, anemia preexistenta la inceputul tratamentului prin chimioterapie).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 92  | Epoetinum Zeta                           | Retacrit                     | Retacrit poate fi folosit pentru reducerea expunerii la transfuzii de sânge alogene la pacienții adulți fără deficit de fier, înaintea intervențiilor chirurgicale ortopedice electiv majore, care au un risc potențial crescut de a prezenta complicații ale transfuziei. Utilizarea trebuie limitată la pacienții cu anemie moderată (de exemplu Hb 10-13 g/dl) care nu sunt încadrați într-un program de pre-donare de sânge autolog și la care se așteaptă pierderi sânge moderate (900-1 800 ml).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 93  | Naproxenum + Esomeprazolum               | Vimovo                       | Tratamentul simptomatic al osteoartritei, poliartritei reumatoide și spondilitei anchilozate la pacientii cu risc de aparitie a ulcerului gastric si/sau duodenal ca urmare a administrarii medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) si atunci cand tratamentul cu doze mai mici de naproxen sau alte AINS este considerat insuficient.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 94  | Candesartanum Cilexetil + HCT            | Canzeno HCT 16mg/12.5mg      | Tratamentul hipertensiunii esentiale insuficient controlata prin monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 95  | Rilpivirinum                             | Edurant                      | Edurant, in asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientei umane tip 1 (HIV-1) la pacientii adulti netratati anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o incarcatura virală ARN HIV-1≤100000 copii/ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 96  | Lantanum                                 | Fosrenol                     | Fosrenol este indicat la pacienții adulți ca agent de fixare a fosfatului utilizat pentru controlul hiperfosfatemiei la pacienții cu <b>insuficiență renală cronică</b> supuși hemodializei sau dializei peritoneale continue ambulatorii (DPCA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 97  | Fingolimod                               | Gilenya                      | Gilenya este indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroza multipla recidivanta-remitenta extrem de activa la urmatoarele grupe de pacienti adulti: - Pacienti cu activitate intensa a bolii in ciuda tratamentului cu cel putin un tratament de modificare a bolii (pentru exceptii in informatii privind perioadele de eliminare completa. Acesti pacienti pot fi definiti ca pacienti care nu au raspuns la un ciclu complet si adecvat (in mod normal, minim un an de tratament) cu cel putin un tratament de modificare a bolii. Pacientii trebuie sa fi avut minim 1 recidiva in anul anterior in timpul tratamentului sau sa aiba cel putin 9 leziuni T2-hiperintense la RMN-ul cranian sau minim 1 leziune ca capture de Gadolinium. Un astfel de pacient poate fi definit si ca pacient cu o rata nemodificata sau crescuta de recidiva sau cu recidive curente severe, comparativ cu anul anterior; sau, Pacienti cu scleroza multipla recidivanta-remitenta severa, cu evolutie rapida, definita de 2 sau mai multe recidive debilitante intr-un an si 1 sau mai multe leziuni cu capture de Gadolinium la RMN cranian sau o crestere semnificativa a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN. | Finalizat |
| 98  | Saxagliptinum + Metformin                | Komboglyze 1000mg            | Tratamentul adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2 inadecvat controlat cu doza maxima toleranta de metformin in monoterapie sau la cei care sunt deja tratati cu combinatia de saxagliptin si metformin sub forma de comprimate separate; de asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu insulina (de exemplu terapie combinata cu tripla), ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, cand insulina si metforminul nu asigura un control glicemic adecvat. De asemenea, Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu terapie combinata tripla), ca adjuvant la dieta si exercitii fizice pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima toleranta de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic adecvat.                                                                                                                                            | Finalizat |
| 99  | Bromura de acildinium                    | Eklira Genuair 322micrograme | Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacientii adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 100 | Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta | Mircera                      | Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficientei renale cronice (IRC) la pacienti adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |

|     |                                                                      |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 101 | Glicopironium                                                        | Seebri Breezhaler | Tratament bronhodilatator de intretinere, pentru ameliorarea simptomelor la pacientii adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 102 | Rivaroxaban                                                          | Xarelto           | Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacientii adulti care sunt supusi unei interventii chirurgicale de electie pentru substitutia soldului sau genunchiului (proteza totala a soldului sau genunchiului).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 103 | Perindopril + Amlodipina                                             | Amlessa           | Hipertensiunea arteriala esentiala si/sau boala coronariana stabila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 104 | Amlodipina + Valsartan +Hidrochlorotiazida                           | Exforge HCT       | Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale ca terapie de substitutie la pacientii adulti a caror tensiune arteriala este controlata adecvat prin combinatie cu amlodipina, valsartan si hidroclorotiazida (HCT), administrate fie ca trei formule cu un component, fie ca formule cu doua sau un component.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 105 | Golimumab                                                            | Simponi           | Tratamentul spondilitei anchilozate (SA) active, aflata in stadii severe, la adulti care au avut un raspuns inadecvat la terapia conventionala.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 106 | Dolutegravir                                                         | Tivicay           | Tivicay este indicat in asociere cu alte medicamente anti-retrovirale destinate tratamentului infectiei cu Virusul Imunodeficientiei Umane (Human Immunodeficiency Virus-HIV) la adulti si adolescenti cu varsta peste 12 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 107 | Tenofovir disoproxil                                                 | Viread            | Viread 245 mg comprimate filmate este indicat in tratamentul hepatitei B cronice la adulti cu: ● boala hepatica compensata, cu dovezi de replicare virala activa, concentratie serica a alaninaminotransferazei (ALT/TGP) persistent crescuta si dovada histologica a inflamatiei active si/sau fibrozei. ● dovezi privind prezenta virusului hepatic B rezistent la lamivudina. ● boala hepatica decompensata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 108 | Apixabanum                                                           | Eliquis           | Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacientii adulti care sunt supusi unei interventii chirurgicale de artroplastie a soldului sau genunchiului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 109 | Brinzolamida/Timolol                                                 | Azarga            | Scaderea presiunii intraoculare (PIO) la pacientii adulti cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune intraoculara la care monoterapia determina reducerea insuficienta a PIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 110 | Certolizumab Pegol                                                   | Cimzia            | Artrita reumatoida. Cimzia, in asociere cu metotrexatul (MTX), este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, moderata pana la severa, la pacientii adulti, atunci raspunsul la medicamentele antireumatice modificate ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, este inadecvat. Cimzia poate fi administrat in monoterapie in caz de intoleranta la metotrexat sau atunci cand tratamentul continuu cu metotrexat este inadecvat. S-a demonstrat ca Cimzia reduce rata progresiei distructiei articulare evidentata radiologic si amelioreaza functionalitatea articulare, atunci cand este administrat in asociere cu metotrexat.                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 111 | Linagliptinum+Metforminum                                            | Jentaduetto       | Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 in combinatie cu o sulfoniluree (de exemplu tratament cu tripla combinatie) ca un adjuvant la dieta si exercitii fizice la pacientii adulti la care controlul glicemiei nu se realizeaza adecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina si sulfoniluree                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 112 | Aprepitantum                                                         | Emend             | Prevenirea senzatiei de greata si a varsaturilor acute si tardive asociate: ●chimioterapii anticancerose pe baza de cisplatina, cu potential emetogen mare, la adulti. ● chimioterapii anticancerose cu potential emetogen moderat, la adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 113 | Afliberceptum                                                        | Eylea             | Tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinate de edemul macular secundar ocluziei venei centrale a retinei (OVCR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 114 | Dipropinat de beclometazona anhidru / fumarat de formoterol dihidrat | Foster            | FOSTER este indicat in tratamentul de fond al astmului bronsic atunci cand utilizarea unei combinatii (glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune) este adecvata: ● pacienti care nu au raspuns corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata scurta de actiune administrat la nevoie sau ● pacienti care au raspuns deja corespunzator la tratamentul cu glucocorticoid inhalator si agonist beta-2 adrenergic cu durata lunga de actiune. A. Terapia de intretinere: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, care se poate asocia, la nevoie cu un bronhodilatator cu durata scurta de actiune. B. Terapia de intretinere si de ameliorare a simptomelor: FOSTER se administreaza periodic, ca tratament de intretinere, si, la nevoie, pentru controlul simptomatologiei. | Finalizat |
| 115 | Telaprevirum                                                         | Incivo            | Incivo, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, este indicat in tratamentul hepatitei cronice cu virus C, genotipul 1, la pacientii adulti cu boala hepatica compensata (inclusiv ciroza): - netratati anterior; - care au fost tratati anterior cu interferon alfa (pefilat sau nepegilat) in monoterapie sau in asociere cu ribavirina, inclusiv pacientii cu recadere, pacientii cu raspuns terapeutic partial sau pacientii care nu au raspuns la tratament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 116 | Axitinibum                                                           | Inlyta            | Inlyta eate indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu carcinom renal in stadiu avansat (CCR) dupa esecul tratamentului anterior cu sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 117 | Eltrombopag olamina                                                  | Revolade          | Revolade este indicat pentru tratamentul adultilor cu purpura trombocitopenica imuna (idiopatica) (PTI) cronica splenectomizati care sunt refractari la alte tratamente ( de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline). Revolade poate fi luat in considerare in tratamentul de linia a doua a adultilor nesplenectomizati pentru care tratamentul chirurgical este contraindicat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 118 | Bendamustinum                                                        | Ribovact          | Ca monoterapie in limfomul non-Hodgkin indolent la pacientii cu progresia bolii in timpul sau in decurs de 6 luni dupa tratamentul cu rituximab sau cu o schema terapeutica ce contine rituximab.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 119 | Lapatinib                                                            | Tyverb            | Tyverb este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm mamar, ale caror tumori exprima HER2 (ErbB2) in exces in asociere cu un inhibitor de aromataza la femeile cu boala metastatica cu receptori hormonal prezenti, aflate in postmenopauza, pentru care chimioterapia nu este indicata in prezent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 120 | Dabrafenib                                                           | Tafinlar          | Dabrafenib este indicat ca monoterapie in tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 121 | Apomorphinum                                                         | Dacepton          | Tratamentul pentru inhibarea fluctuatiilor motorii la pacientii cu boala Parkinson, fluctuatii care persista chiar in conditiile administrarii unui tratament titrat individual cu Levodopa si/sau alti agonisti ai dopaminei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 122 | Golimumab                                                            | Simponi           | Colita ulcerativa (CU) activa aflata in stadii moderate pana la severe, la pacientii adulti care au prezentat un raspuns inadecvat la terapia conventionala, incluzand corticosteroizi, 6-mercaptopurina (6-MP) sau azatioprina (AZA), ori care prezinta intorelant sau contraindicatii pentru un astfel de tratament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 123 | Linagliptinum                                                        | Trajenta 5 mg     | Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatati controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic nu asigura un control adecvat al glicemiei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |

|     |                            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|-----|----------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 124 | Linagliptinum              | Trajenta 5 mg     | Trajenta este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a imbunatati controlul glicemic la adulti: Intr-o schema de terapie combinata- in combinatie cu o sulfoniluree si metformina, atunci cand numai dieta si exercitiul fizic impreuna cu terapia asociata/duala a acestor doua medicamente nu asigura un control adecvat al glicemiei.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 125 | Panitumumab                | Vectibix          | Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 126 | Panitumumab                | Vectibix          | Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 127 | Boceprevirum               | Victralis         | Victralis este indicat in tratamentul hepatitei cronice virale tip C (HCC), genotipul 1, in asociere cu peginterferon alfa si ribavirina, la pacientii adulti cu insuficienta hepatica compensata, la care nu s-a administrat tratament sau care nu au raspuns la tratamentele anterioare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 128 | Pazopanib                  | Votrient          | Votrient este indicat la adulti ca prima linie de tratament in carcinomul cu celule <b>renale</b> (CCR) in stadiu avansat si la pacientii la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala in stadiu avansat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 129 | Pazopanib                  | Votrient          | Votrient este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu subtipuri selectate de sarcom de tesuturi moi (STM) aflat in stadiu avansat carora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatica sau la care boala a progresat in decurs de 12 luni dupa terapia (neo) adjuvanta. Eficacitatea si siguranta au fost stabilite doar pentru anumite subtipuri histologice tumorale de STM.                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 130 | Crizotinib                 | Xalkori           | Xalkori este indicat pentru tratamentul adultilor cu neoplasm bronho-pulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 131 | Rivaroxaban                | Xarelto           | Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si a emboliei pulmonare (EP), si prevenirea recurentei TVP si a EP la adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 132 | Rivaroxaban                | Xarelto           | Prevenirea <b>accidentului vascular cerebral</b> si a emboliei sistemice la pacientii adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara cu unul sau mai multi factori de risc, cum sunt insuficienta cardiaca congestiva, hipertensiunea arteriala, varsta $\geq 75$ ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu in antecedente.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 133 | Enzalutamida               | Xtandi            | Xtandi este indicat la barbatii adulti pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, a caror boala a evoluat in timpul, sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 134 | Certolizumab Pegol         | Cimzia            | Spondilartrita axiala. Cimzia este indicat in tratamentul pacientilor adulti cu spondilartrita axiala activa severa, incluzand: -Spondilita anchilozata (SA). Adulti cu spondilita anchilozata activa severa care au un raspuns inadecvat sau intoleranta la antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). -Spondilartrita axiala fara dovada radiografica de SA. Adulti cu spondilartrita axiala activa severa fara dovada radiografica de SA, dar cu semne obiective de inflamatie manifestate prin proteina C reactiva (PCR) crescuta si/sau rezonanta magnetica nucleara (RMN), care au avut un raspuns inadecvat sau intoleranta la AINS.     | Finalizat |
| 135 | Ticagrelorum               | Brilique          | Ticagrelor, aadministrat in asociere cu acid acetilsalicilic, este indicat pentru preventia evenimentelor aterotrombotice la pacientii adulti cu sindrom coronarian acut (SCA) (angina instabila, infarct miocardic fara supradenivelare de segment ST sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST) atat pacientii tratati medical cat si cei tratati prin interventie coronariana percutanata (PCI) sau by-pass coronarian (CABG).                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 136 | Prasugrelum                | Efient            | Prevenirea evenimentelor atero-trombotice la pacienti cu sindrom coronarian acut (adica, angina instabila, infarct miocardic fara supra-denivelare de segment ST [UA/NSTEMI], infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST [STEMI]) ce sufera o interventie coronariana per-cutanata (PTCA) primara sau amanata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 137 | Golimumab                  | Simponi 50mg      | Golimumab administrat singur sau in asociere cu MTX, este recomandat in tratamentul artritei psoriazice active si progresive, la adultii la care raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare bolii (MARMB) a fost inadecvat. S-a demonstrat ca Simponi determina scaderea progresiei afectarii articulatiilor extremitatilor, masurata prin metode radiologice, la pacienti cu subtipurile poliarticulare simetrice ale afectiunii si amelioreaza capacitatea fizica.                                                                                                                                      | Finalizat |
| 138 | Paliperidonum              | Invega            | Invega este indicat in tratamentul schizofreniei la adulti si adolescenti cu varsta de 15 ani si peste. Invega este indicat pentru tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburarile schizoafective la adulti. Nu a fost demonstrat efectul asupra simptomelor depresive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 139 | Abataceptum                | Orencia (Jia)     | Artrita idiopatica juvenila poliarticulara. Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul artritei idiopatice juvenile (AIJ) poliarticulare active, forma moderata pana la severa, la copii si adolescenti cu varsta de 6 ani si peste, care au raspuns insuficient la alte MAMB, inclusiv cel putin un inhibitor TNF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 140 | Ingenoli Mebutas           | Picato            | Tratamentul cutanat al Keratozei actinice non-hipertrofie non-hipercheratozice la adulti la nivelul trunchiului si extremitatilor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 141 | Olmesartanum + Amlodipinum | Sevikar 20mg/5 mg | Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 142 | Olmesartanum + Amlodipinum | Sevikar 40mg/5 mg | Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 143 | Olmesartanum + Amlodipinum | Sevikar 40mg/10mg | Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 144 | Golimumab                  | Simponi 50mg      | Golimumab, in asociere cu metotrexat (MTX), este recomandat in: ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii moderate pana la severe, la adulti la care raspunsul la tratamentul cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, a fost inadecvat. ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii severe, la adultii care nu au fost tratati anterior cu MTX. S-a demonstrat faptul ca Golimumab, in combinatie c u MTX, reduce rata de progresie a leziunilor distructive de la nivel articular, conform determinarilor radiologice si ca amelioreaza capacitatea fizica. | Finalizat |
| 145 | Apixabanum                 | Eliquis           | Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă $\geq 75$ ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA≥II).                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |

|     |                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 146 | Indacaterolum                                  | Onbrez Breezhaler                              | Onbrez Breezhaler este indicat pentru tratamentul bronhodilatator de intretinere al obstructiei cailor respiratorii la pacienti adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 147 | Abataceptum                                    | Orencia (1st line)                             | Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorală (TNF)-alfa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 148 | Vildagliptinum + Metforminum                   | Eucreas                                        | Eucreas este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat on tratamentul pacientilor adulti care nu pot obtine un control glicemic suficient la doza maxima tolerata de metformina administrata oral in monoterapie sau care sunt tratati deja cu o asociere de vildagliptin si metformina sub o forma de comprimate separate. - Eucreas este indicat in combinatie cu o sulfoniluree (si anume terapie in combinatie tripla) ca terapie adjuvanta la regimul alimentar si exercitiile fizice la pacientii adulti, controlati necorespunzator cu metformina si o sulfoniluree. - Eucreas este indicat in terapie in combinatie tripla cu insulina ca terapie adjuvanata la regimul alimentar si exercitiile fizice pentru a imbunatati controlul glicemic la pacientii adulti cand utilizarea insulinei in doza stabila si metformina administrata in monoterapie nu asigura un control glicemic adecvat. | Finalizat |
| 149 | Afatinibum                                     | Giotrif                                        | Afatinib este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacientilor netratati anterior ce Receptori ai Factorului de Crestere Epidermal (EGFR) TKI cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutatie(i) activatoare a(e) EGFR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 150 | Afliberceptum                                  | Eylea                                          | Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul degenerescentei maculare legata de varsta (DMLV) forma neovasculara (umeda).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 151 | Linagliptinum+Metforminum                      | Jentadueto                                     | Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 ca un adjuvant al dietei si exercitiului fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti controlati inadecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina sau la pacientii carora deja li s-a administrat tratament combinat cu linagliptin si metformina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 152 | Lixisenatidum                                  | LYXUMIA                                        | Lyxumia este indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 în asociere cu medicamente hipoglicemizante, administrate pe cale orală, și/sau cu insulină bazală, în vederea obținerii controlului glicemic atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 153 | Abataceptum                                    | Orencia (2st line)                             | Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorală (TNF)-alfa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 154 | Tocilizumabum                                  | RoActemra                                      | Tratamentul pacientilor adulti cu poliartrita reumatoida activa, moderata pana la severa si pacientilor cu varsta de 2 ani si peste, cu artrita idiopatica juvenila, forma sistematica activa si cu poliartrita idiopatica juvenila.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 155 | Ipilimumab                                     | Yervoy                                         | Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezecabil sau metastatic) la pacientii adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 156 | Vemurafenibum                                  | Zelboraf                                       | Vemurafenibum este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 157 | Abirateronum                                   | Zytiga                                         | Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisonol in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbatii adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei scheme chimioterapeutice pe baza de docetaxel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 158 | METHOTREXATUM                                  | METHOTREXAT EBEWE                              | Forme severe de psoriazis, in special psoriazisul tip placa, care nu pot fi tratate eficient cu terapie conventionala cum ar fi fototerapia, PUVA si retinoizii si psoriazis sever care afecteaza articulatiile (artrita psoriazica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 159 | SILIBINUM                                      | SILIMARINA BIOFARM                             | Hepatoprotector utilizat ca adjuvant în diferite afecțiuni hepatice cronice incluzând hepatita etanolică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 160 | INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM                    | ULTIBRO BREEZHALER 85 micrograme/43 micrograme | Ultibro Breezhaler este indicat în tratamentul bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 161 | Perindopril Arginina + Indapamida + Amlodipina | TRIPLIXAM                                      | Hipertensiunea arteriala esentiala la pacienti a caror afectiune este deja controlata cu combinatia in doza fixa perindopril/indapamida si amlodipina administrate concomitent, in aceleasi doze.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 162 | OFLOXACINUM                                    | UNIFLOX                                        | Infectii bacteriene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 163 | BRIMONIDINUM                                   | BRIMONAL                                       | Glaucom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 164 | AGOMELATINUM                                   | VALDOXAN                                       | Tratamentul episoadelor depresive majore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 165 | DENOSUMAB                                      | PROLIA                                         | Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza si barbatii cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 166 | PANITUMUMAB                                    | VECTIBIX                                       | Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care p rezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 167 | DENOSUMAB                                      | XGEVA                                          | Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 168 | ADALIMUMABUM                                   | HUMIRA                                         | Artrita juvenila idiopatica. Poliartrita reumatoida juvenila idiopatica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 169 | DACLATASVIR                                    | DAKLINZA                                       | Daklinza este indicat, in asociere cu alte medicamente, pentru tratamentul infectiei cronice cu virusul hepatic C (VHC) la adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 170 | BRENTUXIMAB VEDOTIN                            | ADCETRIS 50 mg                                 | ADCETRIS este indicat pentru tratamentul <b>pacientilor adulti cu limfom Hodgkin (LH) CD30 +recidivat sau refractar:</b><br>1. dupa transplant de celule stem autologe (TCSA) sau<br>2. dupa cel putin doua tratamente anterioare, cand TCSA sau chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezinta o optiune de tratament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 171 | BRENTUXIMAB VEDOTIN                            | ADCETRIS 50 mg                                 | ADCETRIS este indicat pentru <b>tratamentul pacientilor adulti cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs), recidivat sau refractar.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 172 | DASABUVIR                                      | EXVIERA 250 mg                                 | Exviera este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 173 | OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONA VIRUM       | VIEKIRAX 12,5mg/ 75mg/ 50mg                    | Viekirax este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |

|     |                                               |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-----|-----------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 174 | SORAFENIBUM                                   | NEXAVAR 200mg                            | SORAFENIBUM/Nexavar este indicat pentru tratamentul pacienților cu carcinom tiroidian diferentiat (papilar/folicular/cu celule Hurthle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod radioactiv.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 175 | RIOCIGUAT                                     | ADEMPAS<br>0,5mg/ 1mg/ 105mg, 2mg, 205mg | Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacienților adulti cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS cu:<br>-HAPCTE inoperabila,<br>-HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic.<br>Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacienților adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv | Finalizat |
| 176 | SOFOSBUVIR                                    | SOVALDI 400mg                            | SOVALDI este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul Hepatitei Cronice C (HCC) la adulti. Nu se recomanda administrarea de Sovaldi in monoterapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 177 | SIMEPREVIRUM                                  | OLYSIO                                   | OLYSIO, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 178 | ETHIONAMIDUM                                  | ETIONAMIDA Atb 250mg                     | Medicament tuberculostatic de linia a II a la pacientii cu rezistenta la medicamentele de linia I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 179 | TELBIVUDINA                                   | SEBIVO 600mg                             | Sebivo este indicat pentru tratamentul <b>hepatitei cronice B</b> la pacientii adulti cu boala hepatica compensata si semne de replicare virala, valoare plasmatica crescuta in mod repetat a alanin aminotransferazei (ALT) si cu semne histologice de inflamatie activa si/sau fibroza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 180 | AFLIBERCEPTUM                                 | EYLEA 40mg/ml sol.inj                    | Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinata de edemul macular diabetic (EMD).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 181 | MACITENTANUM                                  | OPSUMIT                                  | Opsumit, administrat in monoterapie sau in asociere, este indicat pentru tratamentul pe termen lung al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacientii adulti aflati in clasa functionala II sau III OMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 182 | BEDAQUILINUM                                  | SIRTURO                                  | SIRTURO este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 183 | LEDIPASVIR/ SOFOSBUVIR                        | HARVONI 90mg/400mg                       | Tratamentul hepatitei C cronice la adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 184 | AZACITIDINE                                   | VIDAZA 25mg/ml                           | Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu <b>sindroame mielodisplazice (SMD)</b> cu risc intermediar-2 și mare, conform Sistemului Internațional de Punctaj referitor la Prognostic (SIPP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 185 | AZACITIDINE                                   | VIDAZA 25mg/ml                           | Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu <b>leucemie mielomonocitară cronică</b> (LMMC) cu 10-29 % blasti medulari, fără boală mieloproliferativă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 186 | AZACITIDINE                                   | VIDAZA 25mg/ml                           | Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30 % blasti și linii multiple de diferențiere a displaziei, conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 187 | LENALIDOMIDUM                                 | REVLIMID                                 | Revlimid este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 188 | COMBINATII (ROSUVASTATINUM+ EZETINIBUM)       | LIPOCOMB 10mg/10mg si 20mg/20mg          | Lipocomb este indicat ca adjuvant al regimului alimentar în tratamentul hipercolesterolemiei (exceptând hipercolesterolemia heterozigotă familială) la pacienții adulți <ul style="list-style-type: none"> <li>care nu sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină în monoterapie; sau</li> <li>ca terapie de substituție la pacienții controlați în mod adecvat cu substanțele individuale administrate concomitent, la aceleași concentrații ca și în combinația în doză fixă, dar administrate separat</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 189 | APIXABAN                                      | ELIQUIS 2,5/5 mg                         | Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a soldului.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 190 | CANAGLIFLOZINUM                               | INVOKANA                                 | Invokana este indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic fiind administrat ca:<br>Monoterapie<br>În cazul în care doar prin dietă și exerciții fizice nu se obține un control glicemic adecvat la pacienții la care utilizarea de metformin este inadecvată datorită intoleranței sau contraindicațiilor.<br>Terapie adjuvantă<br>Terapie adjuvantă la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control glicemic adecvat                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 191 | BOSUTINIB                                     | BOSULIF                                  | Bosulif este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie mieloida cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) în faza cronică (FC), faza accelerată (FA) sau faza blastica (FB), tratați anterior cu unul sau mai mulți inhibitori de tirozinază și la care administrarea de imatinib, nilotinib și dasatinib nu este considerată o opțiune terapeutică adecvată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 192 | Bromura de Acildinium + Fumarat de Formoterol | DUAKLIR GENUAIR                          | Boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 193 | CABAZITAXELUM                                 | JEVTANA                                  | JEVTANA este indicat, in asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostata metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schema de tratament continuând docetaxel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |

|     |                                                                     |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 194 | AFLIBERCEPTUM                                                       | ZALTRAP             | ZALTRAP in asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de tratament pe baza de oxaliplatină.                                                                                                                              | Finalizat |
| 195 | OLAPARIBUM                                                          | LYNPARZA 50mg       | LYNPARZA este indicat in monoterapie ca tratament de intretinere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad inalt recidivant cu mutatie BRCA (germinala si/sau somatica), neoplazie de trompa uterina sau neoplazie peritoneala primara, sensibile la medicamente pe baza de platina, cu raspuns (complet sau partial) la chimioterapie pe baza de platina. | Finalizat |
| 196 | GEFITINIBUM                                                         | IRESSA              | IRESSA este indicata pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozinkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR_TK (linia I).                                                      | Finalizat |
| 197 | APIXABAN                                                            | ELIQUIS 2,5/5 mg    | Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) si al emboliei pulmonare (EP), prevenirea trombozei venoase profunde si a emboliei pulmonare recurente la adulti.                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 198 | RAMUCIRUMAB                                                         | CYRAMZA             | Neoplasm gastric                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 199 | METOPROLOL TARTRAT+ IVABRADINA                                      | IMPLICOR            | terapie de substitutie pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienti adulti cu ritm sinusal normal, a caror afectiune este deja controlata cu metoprolol si ivabradina administrate separat, in doze similare                                                                                                                                 | Finalizat |
| 200 | IPILIMUMAB                                                          | YERVOY              | Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezectabil sau metastatic) la pacientii adulti.                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 201 | THALIDOMIDUM                                                        | THALIDOMIDE CELGENE | Thalidomide Celgene in asociere cu melfalan si prednison este indicat ca tratament de prima linie la pacientii cu mielom multiplu netratat, cu varsta ≥ 65 de ani sau care nu sunt eligibili pentru chimioterapie ce doze mari.                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 202 | ABIRATERONUM                                                        | ZYTIGA              | ZYTIGA este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti care sunt asimptomatici sau usor simptomatici dupa esecul terapiei de privare de androgeni si la care chimioterapia nu este inca indicata din punct de vedere clinic                                                   | Finalizat |
| 203 | IBRUTINIBUM                                                         | IMBRUVICA 140 mg    | tratamentul pacientilor adulti cu <b>leucemie cronica (LLC)</b> carora li s-a administrat cel putin o terapie anterioara sau ca terapie de prima linie in prezenta deletiei 17p sau mutatiei TP53 la pacientii care nu sunt eligibili pentru chimioimunoterapie.                                                                                                                | Finalizat |
| 204 | IBRUTINIBUM                                                         | IMBRUVICA 140 mg    | tratamentul pacientilor cu <b>limfom cu celule de manta (LCM)</b> recidivant sau refractar.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 205 | NIVOLUMAB                                                           | OPDIVO              | OPDIVO este indicat in monoterapie pentru tratamentul <b>melanomului</b> in stadiu avansat (nerezectabil sau metastazat) la adulti.                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 206 | BROMURA DE ACLIDINIUM + FUMARAT DE FORMOTEROL                       | BRIMICA GENUAIR     | a tratament bronhodilatator de intretinere pentru ameliorarea simptomelor la adulti cu boala pulmonara cronică obstructivă (BPOC)                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 207 | PAZOPANIBUM                                                         | VOTRIENT            | indicat la adulti ca prima linie de tratament in <b>carcinomul cu celule renale (CCR) in stadiu avansat</b> si la pacientii la care s-a administrat anterior terapia cu citokine pentru boala in stadiu avansat.                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 208 | PIRFENIDONUM                                                        | ESBRIET 267 mg      | Esbriet este indicat la adulti pentru tratamentul <b>fibrozei pulmonare idiopatice (FPI)</b> usoare pana la moderate.                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 209 | ENZALUTAMIDUM                                                       | XTANDI              | Xtandi este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti cu simptomatologie absenta sau usoara, dupa esecul terapiei de privare de androgenica, la care chimioterapia nu este usoara inca indicata din punct de vedere clinic.                                                                             | Finalizat |
| 210 | PEMBROLIZUMAB                                                       | KEYTRUDA            | tratamentul melanomului avansat (nerezectabil sau metastatic) la pacienti adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 211 | DARUNAVIRUM + COBICISTATUM                                          | REZOLSTA 80mg/150mg | REZOLSTA este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientiei umane (HIV-1) la adulti, incepand cu varsta de 18 ani.                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 212 | PEMBROLIZUMAB                                                       | KEYTRUDA            | indicat in monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienti adulti.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 213 | OBINUTUZUMABUM                                                      | GAZYVARO            | in asociere cu cloramfucil este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu leucemie limfocitara cronica (LLC) netratata anterior si cu comorbiditati care nu permit administrarea unui tratament pe baza de fludarabina in doza completa.                                                                                                                                 | Finalizat |
| 214 | VELAGLUCERASE                                                       | VPRIV               | Terapia de substitutie enzimatica (TSE) pe termen lung la pacienti cu tipul 1 de boala Gaucher.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 215 | TETRABENAZINUM                                                      | TETMODIS            | Tratamentul tulbur[riilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 216 | DONEPEZILUM                                                         | NA                  | ●bolii Alzheimer, forma usoara sau moderata<br>●demenței vasculare (demența asociată cu bolile cerebrovasculare)                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 217 | GALANTAMINUM                                                        | NA                  | Alzheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 218 | MEMANTINUM                                                          | NA                  | Alzheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 219 | RIVASTIGMINUM                                                       | NA                  | Alzheimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 220 | FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT                                      | ATIMOS 0,012mg      | ATIMOS este indicat in tratamentul regulat al afectiunilor obstructive reversibile ale cailor respiratorii la pacienti cu bronhopneumonie cronica obscura, unde este necesara terapia cu bronhodilatator.                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 221 | VEMURAFENIBUM                                                       | ZELBORAF 240mg      | VEMURAFENIB este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 222 | ENZALUTAMIDUM                                                       | XTANDI              | XTANDI este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostata in stadiu metastatic rezistent la castrare, la barbati adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei terapii cu docetaxel.                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 223 | FLUDARABINUM (forma orala)                                          | FLUDARABINA oral    | ●Tratamentul leucemiei limfocitare cronice cu celule B la pacienti cu rezerva medulara suficienta<br>●Tratamentul de prima linie numai la pacienti cu forma avansata a leucemiei limfocitare cronice cu celule B, stadiile Rai III/IV (stadiul Binet C) sau stadiile Rai I/II (stadiul Binet A/B) si care prezinta simptome ale bolii sau dovezi ale progresiei bolii           | Finalizat |
| 224 | ROTIGOTINUM                                                         | NA                  | Parkinson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 225 | AGALSIDASUM ALFA                                                    | REPLAGAL            | Terapia de substitutie enzimatica pe termen lung la pacienti cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienta de α-galactosidaza A)                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 226 | ATALUREN                                                            | TRANSLARNA          | Tratamentul pacientilor ambulatorii cu varsta de 5 ani si peste cu distrofie musculara Duchenne determinata de o mutatie de tip nonsens la nivelul genei distofinei.                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 227 | DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT | FOSTER              | BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC)<br>Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.                                                                     | Finalizat |

|     |                                                                           |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 228 | PASIREOTIDUM                                                              | SIGNIFOR                                       | indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu acromegalie pentru care o intervenție chirurgicală nu constituie o opțiune sau care nu a avut rezultate curative și care nu sunt controlați corespunzător prin tratament cu alt analog al somatostatinei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 229 | CARFILZOMIBUM                                                             | KYPROLIS                                       | în combinație ori cu lenalidomida și cu dexametazonă sau numai cu dexametazonă este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 230 | NINTEDANIBUM                                                              | OFEV                                           | la adulți pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 231 | ELBASVIR/ GRAZOPREVR                                                      | ZEPATIER                                       | ZEPATIER este indicat în tratamentul hepatitei C cronice la adulți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 232 | SECUKINUMAB                                                               | COSENTYX                                       | Cosentyx este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 233 | NIVOLUMAB                                                                 | OPDIVO                                         | OPDIVO este indicat pentru tratamentul <b>cancerului bronhopulmonar</b> altul decât cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local avansat sau metastazat, după tratamentul anterior cu chimioterapie, la adulți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 234 | PERTUZUMABUM                                                              | PERJETA                                        | PERJETA este indicat pentru utilizarea în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 235 | ATAZANAVIR + COBICISTAT                                                   | EVOTAZ                                         | EVOTAZ este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul de tip 1 al imunodeficienței umane dobândite (HIV-1) la adulți fără mutații cunoscute asociate rezistenței la atazanavir .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 236 | INCATIBANT                                                                | FIRAZYR                                        | Tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditare la adulți (cu deficit de inhibitor al C1-esterazei).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 237 | PONATINIB                                                                 | ICLUSIG                                        | 1. leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică, în fază accelerată sau în fază blastică, care prezintă rezistență la dasatinib sau nilotinib, care prezintă intoleranță la dasatinib sau nilotinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I<br><br>2. leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+), care prezintă rezistență la dasatinib, care prezintă intoleranță la dasatinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 238 | COMBINATII<br>(VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)                              | EUCREAS 50mg/1000mg                            | tratatamentul diabetului zaharat de tip 2:<br>- Eucreas este indicat în tratamentul pacienților adulți care nu pot obține un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt tratați deja cu o asociere de vildagliptin și metformină sub formă de comprimate separate.<br>- Eucreas este indicat în combinație cu o sulfoniluree (și anume terapie în combinație triplă) ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice la pacienții adulți, controlați necorespunzător cu metformină și o sulfoniluree.<br>- Eucreas este indicat în terapie în combinație triplă cu insulină ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice pentru a îmbunătăți controlul glicemic la pacienții adulți când utilizarea insulinei în doză stabilă și metformina administrată în monoterapie nu asigură un control glicemic adecvat. | Finalizat |
| 239 | TRAMETINIB                                                                | MEKINIST                                       | în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib, este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, cu mutație BRAF V600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 240 | DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA<br>ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL<br>DIHIDRAT | FOSTER                                         | BRONHOPNEUMOPATIA CRONICĂ OBSTRUCTIVĂ (BPOC)<br>Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50% din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 241 | COMBINATII<br>(TIOTROPIUM+OLODATEROLUM)                                   | SPIOLTO RESPIMAT 2,5 micrograme/2,5 micrograme | tratament bronhodilatator de întreținere, cu rol de ameliorare a simptomelor la pacienții adulți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 242 | MECASERMIN                                                                | INCRELEX                                       | tratamentul de lungă durată al deficitului de creștere la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani cu deficit primar sever de factor de creștere, asemănător insulinei-tip 1 (DFCI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 243 | DAPAGLIFLOZIN                                                             | FORXIGA                                        | Diabet zaharat tip 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 244 | PANOBINOSTAT                                                              | FARYDAK                                        | mielom multiplu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 245 | TRASTUZUMAB EMTANSINE                                                     | KADCYLA                                        | ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie:<br>• să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau<br>• să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 246 | ERLOTINIBUM                                                               | TARCEVA                                        | Neoplasm bronhopulmonar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 247 | PEMETREXEDUM                                                              | ALIMTA                                         | Cancer pulmonar<br>Mezoteliom pleural                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 248 | SORAFENIBUM                                                               | NEXAVAR                                        | Carcinom hepatocelular, renal, tiroidian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 249 | TRABECTEDINUM                                                             | YONDELIS                                       | Sarcom de țesuturi moi<br>Cancer ovarian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 250 | TRASTUZUMABUM                                                             | HERCEPTIN                                      | Cancer mamar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 251 | DECITABINUM                                                               | DACOGEN                                        | Leucemie mieloidă acută                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 252 | RITUXIMABUM                                                               | MABTHERA                                       | Limfom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 253 | BEVACIZUMABUM                                                             | AVASTIN                                        | Carcinom de colon, neoplasm mamar, neoplasm renal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 254 | CETUXIMABUM                                                               | ERBITUX                                        | Cancer colorectal, cancer al capului și gâtului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 255 | PANITUMUMABUM                                                             | VECTIBIX                                       | Neoplasm colorectal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 256 | RUXOLITINIBUM                                                             | JAKAVI                                         | Splenomegalie, mielofibroză                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 257 | TEMOZOLAMIDUM                                                             |                                                | Gliom, glioblastom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 258 | GEMCITABINUM                                                              |                                                | Neoplasm vezică urinară, pancreas, NSCLC, ovarian, mamar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |

|     |                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 259 | PACLITAXELUM                                                      |                                         | Cancer mamar, ovarian, bronho-pulmonar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 260 | DOCETAXELUM                                                       |                                         | Cancer mamar, prostata, bronho-pulmonar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 261 | FILGRASTIMUM                                                      |                                         | Neutropenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 262 | VEDOLIZUMABUM                                                     | ENTYVIO 300 mg                          | Tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 263 | VEDOLIZUMABUM                                                     | ENTYVIO 300 mg                          | Tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 264 | SAXAGLIPTIN                                                       | ONGLYZA 5 mg comprimate filmate         | indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulină (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 265 | SAXAGLIPTIN                                                       | ONGLYZA 5 mg comprimate filmate         | indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic: în terapia orală triplă în asociere cu: metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 266 | ELVITEGRAVIR / COBICISTAT / EMTRICITABINE / TENOFOVIR ALAFENAMIDE | GENVOYA                                 | tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir.                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 267 | COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)                           | DESCOVY 200 mg/10 mg comprimate filmate | indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 268 | COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)                           | DESCOVY 200 mg/25mg comprimate filmate  | indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 269 | SECUKINUMAB                                                       | COSENTYX 150 mg                         | Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul <b>artritei psoriazice</b> active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 270 | SECUKINUMAB                                                       | COSENTYX 150 mg                         | Cosentyx este indicat în tratamentul <b>spondilitei anchilozante</b> active la adulții care au răspuns necorespunzător la terapia convențională.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 271 | COMBINATII (FLUTICASONUM+FORMOTEROLUM)                            | FLUTIFORM                               | tratamentul de întreținere al astmului bronșic în cazul în care este indicată utilizarea unui medicament combinat (un corticosteroid inhalator și un β2 agonist cu durată lungă de acțiune): La pacienții la care nu se obține control adecvat cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agonști cu durată scurtă de acțiune, administrați la nevoie. Sau la pacienții la care s-a obținut deja control adecvat atât cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agonști cu durată lungă de acțiune. | Finalizat |
| 272 | OSIMERTINIB MESYLATE                                              | TAGRISSO                                | tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 273 | DELAMANID                                                         | DELTYBA 50 MG                           | indicat pentru utilizare în cadrul unui regim terapeutic asociat adecvat pentru tuberculoza pulmonară plurirezistentă la medicamente la pacienți adulți atunci când un regim terapeutic eficient nu poate fi altfel constituit din motive de rezistență sau tolerabilitate                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 274 | APIXABAN                                                          | ELIQUIS                                 | Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II)                                                                                                             | Finalizat |
| 275 | NIVOLUMAB                                                         | OPDIVO                                  | indicat ca monoterapie pentru tratamentul <b>carcinomului renal</b> după terapie anterioară, la adulți.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat |
| 276 | PEMBROLIZUMAB                                                     | KEYTRUDA                                | indicat pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), local avansat sau metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament aprobat pentru aceste mutații înaintea administrării KEYTRUDA.                                      | Finalizat |
| 277 | BENDAMUSTINUM                                                     | BENDAMUSTINA ZENTIVA                    | Tratament de primă linie al mielomului multiplu în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomidă sau bortezomib                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 278 | BENDAMUSTINUM                                                     | BENDAMUSTINA ZENTIVA                    | Ca monoterapie în <b>limfomul non-Hodgkin latent</b> , la pacienții cu progresie a bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă terapeutică care conține rituximab.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 279 | BENDAMUSTINUM                                                     | BENDAMUSTINA ZENTIVA                    | Tratament de primă linie al <b>leucemiei limfatice cronice</b> (stadiul B sau C Binet) la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 280 | COMBINATII (SAXAGLIPTIN+DAPAGLIFLOZINUM)                          | QTERN                                   | Qtern, combinație în doză fixă de saxagliptin și dapagliflozin este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2:<br>- pentru îmbunătățirea controlului glicemic atunci când metformin și/sau sulfoniluree (SU) și una din monocomponentele din Qtern nu asigură un control adecvat al glicemiei,<br>- atunci când sunt deja tratați cu combinația liberă de dapagliflozin și saxagliptin                                                            | Finalizat |
| 281 | LANREOTIDUM                                                       | SOMATULINE AUTOGEL 120mg                | Tratamentul tumorilor neuroendocrine gastroenteropancreatice (GEP-NETS) de gradul 1 și un subset al gradului 2 (indice Ki67 până la 10%) de origine mezenterică, pancreatică sau necunoscută (acolo unde a fost exclusă originea în hemicolonul stâng și rect), la pacienții adulți cu boală local avansată nerezecabilă sau la cei cu boală metastatică                                                                                                                                     | Finalizat |
| 282 | BLINATUMOMAB                                                      | BLINCYTO                                | tratamentul adulților cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu precursor de celule B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia negativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |

|     |                                                     |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|-----|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 283 | IDEBENONUM                                          | RAXONE                                                             | tratatamentul tulburărilor de vedere la pacienții adolescenți și adulți cu neuropatie optică ereditară Leber (LHON)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 284 | TACROLIMUS                                          | PROTOPIC 0.03% ung                                                 | Tratatamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârsta peste 16 ani) Tratatamentul <b>dermatitelor atopice</b> de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici. Copii (cu vârsta peste 2 ani) Tratatamentul dermatitelor atopice moderate până la severe la copiii care nu au răspuns adecvat la terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici.                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 285 | TACROLIMUS                                          | PROTOPIC 0.1% ung                                                  | Tratatamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârsta peste 16 ani) Tratatamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 286 | ALEMTUZUMAB                                         | LEMTRADA                                                           | indicat la pacienții adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR), cu boală activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 287 | CABAZITAXELUM                                       | JEVTANA                                                            | în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților adulți cu <b>cancer de prostată</b> metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 288 | ABACAVIR SULFATE / DOLUTEGRAVIR SODIUM / LAMIVUDINE | TRIUMEQ                                                            | indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 289 | EMPAGLIFLOZIN                                       | JARDIANCE                                                          | tratatamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulți, ca:<br>Monoterapie<br>Atunci când numai dieta și exercițiul fizic nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminei este considerată inadecvată din cauza intoleranței.<br>Terapie asociată suplimentară<br>În asociere cu alte medicamente hipoglicemice, incluzând insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei )                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 290 | EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL                  | EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg               | tratamentul antiretroviral combinat în tratarea adulților infectați cu VIH-1; antiretroviral pentru utilizare sistemică; antiretrovirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 291 | PALIPERIDONUM                                       | Trevicta                                                           | injecție cu o administrare la 3 luni, este indicată în tratamentul de întreținere al <b>schizofreniei</b> la pacienții adulți care sunt stabiliizați clinic cu palmitat de paliperidonă injectabil cu o administrare lunară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 292 | TOCILIZUMABUM                                       | RoActemra                                                          | în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat pentru: tratamentul pacienților adulți cu <b>PR</b> activă, moderată până la severă, care au avut fie un răspuns inadecvat, fie nu au tolerat tratamentul cu unul sau mai multe medicamente antireumateice<br>modificatoare ale bolii (DMARD) sau cu inhibitori ai factorului de necroză tumorală (TNF).La acești pacienți, RoActemra poate fi administrat ca monoterapie, în cazul intoleranței la MTX sau unde continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată. S-a demonstrat că RoActemra scade rata de progresie a leziunilor articulare, evaluată radiologic și îmbunătățește funcția fizică atunci când este administrat în asociere cu metotrexat. | Finalizat |
| 293 | COMBINAȚII(BRINZOLAMIDUM+BRIMONIDINUM)              | SIMBRINZA                                                          | Scăderea presiunii intraoculare (PIO) crescute, la pacienții adulți cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune oculară, la care monoterapia nu asigură o reducere suficientă a PIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FINALIZAT |
| 294 | COMBINAȚII (SACUBITRILUM+VALSARTANUM)               | ENTRESTO 24 mg/26 mg ENTRESTO 49 mg/51 mg mg ENTRESTO 97 mg/103 mg | pacienții adulți în tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejeție redusă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 295 | IBRUTINIBUM                                         | IMBRUVICA                                                          | ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu macroglobulinemie Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau ca terapie de primă linie la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 296 | TRASTUZUMABUM EMTANSINUM                            | KADCYLA                                                            | ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie:<br>• să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau<br>• să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 297 | BELIMUMAB                                           | BENLYSTA                                                           | tratament asociat la terapiile existente la pacienții adulți cu <b>lupus eritematos sistemic</b> (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 298 | COMBINAȚII (AZELASTINUM+FLUTICASONUM)               | DYMISTA 137 micrograme/50 micrograme/doza                          | Ameliorarea simptomelor de rinită alergică sezonieră și perenă moderate până la severe dacă monoterapia cu antihistaminice intrnazale sau glucocorticoizi nu este considerată suficientă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 299 | COMBINAȚII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)             | Dunotrisin                                                         | o combinație cu doză fixă de emtricitabină și succinat de tenofovir disoproxil. Este indicat în terapia antiretrovirală combinată pentru tratamentul adulților cu vârsta de 18 ani și peste, infectați cu HIV-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 300 | Apixabanum                                          | Eliquis                                                            | Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 301 | Romiplostim                                         | Nplate                                                             | Nplate este indicat pentru pacienții cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) cu vârsta de un an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 302 | Osimertinibum                                       | TAGRISSO 80 mg comprimate filmate                                  | tratamentul pacienților adulți cu <b>cancer bronho-pulmonar</b> altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 303 | Elbasvir/grazoprevir                                | Zepatier                                                           | în tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adulți.<br>Pentru activitatea specifică genotipului virusului hepatic C (VHC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RETRAS    |
| 304 | Darunavir 800mg/cobicista 150 mg                    | Rezolsta 800mg/150 mg                                              | în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1) la adulți, începând cu vârsta de 18 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 305 | Ixekizumab                                          | Taltz 80 mg soluție injectabilă în seringă preumplută              | tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 306 | Ramucirumab                                         | Cyramza 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă             | în asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină<br>indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat                                                                                           | Finalizat |

|     |                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 307 | RILPIVIRINUM                                                         | Edurant 25mg                    | în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1 ≤ 100000 copii/ml.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 308 | Secukinumabum                                                        | Cosentyx                        | în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul <b>artritei psoriazice active</b> la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FINALIZAT |
| 309 | Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat  | Foster 100/6 mcg/doză           | Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS<50%din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu acțiune de lungă durată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 310 | Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat  | Foster Nexthaler 200/6 mcg/doză | Tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu lungă durată de acțiune) este adecvată:<br>- pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie<br>- pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată lungă de acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 311 | PERTUZUMABUM                                                         | PERJETA 420mg                   | indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 312 | LAPATINIBUM                                                          | TYVERB                          | tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces: ☐ în asociere cu capecitabina, la pacienții cu neoplasm mamar avansat sau metastatic, progresiv în urma unor terapii anterioare, care trebuie să fi inclus antraciclina și taxani și terapie cu trastuzumab, în context metastatic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 313 | BEVACIZUMAB                                                          | AVASTIN                         | 1. Bevacizumab administrat în asociere cu <b>carboplatină și paclitaxel</b> este indicat ca tratament de primă linie al pacienților adulte cu <b>neoplasm ovarian epitelial (stadiile FIGO (Federația Internațională de Ginecologie și Obstetrică) IIB, IIIC și IV), al trompelor uterine sau cu neoplasm peritoneal primar în stadii avansate</b> .<br>2. Bevacizumab, administrat în asociere cu <b>carboplatină și gemcitabină</b> , este indicat pentru tratamentul pacienților adulte la care s-a diagnosticat prima recidivă de <b>neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, sensibile la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-a administrat anterior tratament cu bevacizumab sau alți inhibitori ai factorului de creștere a endotelului vascular (FCEV) sau terapie țintă asupra receptorului FCEV</b><br>3. Bevacizumab administrat în asociere cu <b>paclitaxel, topotecan sau doxorubicină lipozomală polietilenglicată</b> este indicat pentru tratamentul pacienților adulte cu <b>neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, recurente, rezistente la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-au administrat mai mult de două scheme chimioterapice și care nu au fost tratate anterior cu bevacizumab sau cu alți inhibitori ai FCEV sau cu terapie țintă asupra receptorului FCEV</b> | Finalizat |
| 314 | TRASTUZUMABUM                                                        | HERCEPTIN                       | în asociere cu capecitabină sau 5-fluorouracil și cisplatină este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu adenocarcinom gastric metastazat HER2 pozitiv sau a joncțiunii gastroesofagiene, cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului pentru boala lor metastatică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 315 | PEMBROLIZUMABUM                                                      | KEYTRUDA 50mg                   | indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporțional (STP) ≥ 50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 316 | ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINĂ/ FUMARAT TENOFOVIR ALAFENAMIDA | GENVOYA                         | Tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 317 | CERTOLIZUMAB PEGOL                                                   | CIMZIA                          | Artrită psoriazică<br>Cimzia în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evoluției bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie în cazul intoleranței la MTX sau când continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 318 | CERTOLIZUMAB PEGOL                                                   | CIMZIA                          | <b>Spondilartrită axială severă, incluzând:</b><br>Spondilita anchilozantă (SA) - Adulți cu spondilită anchilozantă activă severă care au un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS<br>Spondilartrită axială fără dovadă radiografică de SA- Adulți cu spondilartrită axială activă severă fără dovadă radiografică de SA, dar cu semne obiective de inflamație manifestate prin proteina C reactivă (PCR) crescută și/sau rezonanță magnetică nucleară (RMN), care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 319 | DOLUTEGRAVIR+ABACA VIR+LAMIVUDINUM                                   | TRIUMEQ                         | indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 320 | DARATUMUMAB                                                          | DARZALEX                        | 1) în monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și refractar, care au fost tratați anterior cu un inhibitor de proteazom și un agent imunomodulator și care au înregistrat progresia bolii sub ultimul tratament.;<br>2) în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin un tratament anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 321 | EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDĂ                                  | DESCOVY 250mg/25 mg             | Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat |
| 322 | EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDĂ                                  | DESCOVY 200mg/10 mg             | în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 323 | BARICITINIB                                                          | OLUMIANT                        | Tratamentul <b>poliartritei reumatoide</b> active moderat până la severă la pacienții adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |

|     |                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 324 | DULAGLUTIDUM                                                 | TRULICITY                                                                 | <p>indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de:</p> <p>Monoterapie</p> <p>Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor.</p> <p>Terapie combinată</p> <p>În combinație cu alte medicamente hipoglicemice, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat</p>               | Finalizat |
| 325 | COMBINATII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)                 | SULIQUA                                                                   | <p>indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală</p>                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 326 | TAFLUPROSTUM                                                 | SAFLUTAN                                                                  | <p>Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții cu <b>glaucom cu unghi deschiși</b> și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți</li> <li>o care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie</li> <li>o care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie</li> </ul> <p>Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante.</p> <p>SAFLUTAN este indicat la adulți cu vârsta ≥18 ani.</p>                 | Finalizat |
| 327 | CARFILZOMIB                                                  | KYPROLIS                                                                  | <p>în combinație ori cu lenalidomida si cu dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu (MM) la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 328 | ALIROCUMABUM                                                 | PRALUENT                                                                  | <p>indicat la adulți cu hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă și non-familială) sau cu dislipidemie mixtă, ca adjuvant la dietă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- în asociere cu o statină sau cu o statină împreună cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți la care nu s-au putut atinge valori țintă ale LDL-colesterolului cu o statină administrată în doza maximă tolerată, sau</li> <li>- singur sau în asociere cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți cu intoleranță la statine sau la care este contraindicată administrarea de statine.</li> </ul> | Finalizat |
| 329 | ELTROMBOPAG                                                  | REVOLADE                                                                  | <p>indicat pentru tratamentul purperei trombocitopenice imune (idiopatie) (PTI) cronice la pacienții cu vârsta de 1 an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 330 | IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA, CU ADMINISTRARE EXTRAVASCULARA | GAMMANORM 165 mg/mL                                                       | <p>Terapie de substituție la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta între 0 și 18 ani) cu sindroame de imunodeficiență primară cum sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-agamaglobulinemie și hipogamaglobulinemie congenitale;</li> <li>- imunodeficiență comună variabilă (IDCV); -imunodeficiență severă combinată; -deficite de subclasa IgG cu infecții recurente;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 331 | Secukinumabum                                                | Cosentyx                                                                  | <p>indicat pentru tratamentul <b>psoriazisului în plăci, moderat până la sever</b>, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 332 | USTEKINUMABUM                                                | STELARA                                                                   | <p>indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu <b>psoriazis în plăci</b>, forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen și ultraviolete A)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FINALIZAT |
| 333 | Nivolumabum                                                  | Opdivo                                                                    | <p>în monoterapie este indicat pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic recidivat sau refractar după transplant autolog de celule stem (TACS) și tratament cu brentuximab vedotin la adulți</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 334 | ELIGLUSTAT                                                   | CERDELGA                                                                  | <p>tratamentul de lungă durată la pacienții adulți cu boala Gaucher de tip 1 (BG1), care sunt metabolizatori lenți (ML), metabolizatori intermediari (MI) sau metabolizatori rapizi (MR) prin intermediul CYP2D6</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 335 | VANDETANIB                                                   | CAPRELSA                                                                  | <p>tratamentul neoplasmului medular tiroidian (NMT) agresiv și simptomatic la pacienți cu forma de boală local avansată, inoperabilă sau cu forma de boală metastazată.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 336 | CRIZOTINIB                                                   | XALKORI                                                                   | <p>Xalkori este indicat pentru tratamentul de prima intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FINALIZAT |
| 337 | RITUXIMAB                                                    | MABTHERA                                                                  | <p><b>Granulomatoză cu poliangeită și poliangeită microscopică</b></p> <p>în asociere cu glucocorticoizi este indicat pentru inducerea remisiunii la pacienții adulți cu granulomatoză cu poliangeită Wegener GPA activă, severă și poliangeită microscopică MPA</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FINALIZAT |
| 338 | AFLIBERCEPTUM                                                | EYLEA                                                                     | <p>afectării acuității vizuale determinată de edemul macular secundar occludiei venei retinei (OVR de ram sau OVR centrală)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FINALIZAT |
| 339 | BRIVARACETAM                                                 | BRIVIACT                                                                  | <p>terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți și adolescenți, începând cu vârsta de 16 ani.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FINALIZAT |
| 340 | LIRAGLUTIDUM                                                 | VICTOZA                                                                   | <p>pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FINALIZAT |
| 341 | ALFA ELOSULFAZA                                              | VIMIZIM                                                                   | <p>tratamentul mucopolizaharidozei tip IVA (sindromul Morquio A, MPS IVA) la pacienții de orice vârstă</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FINALIZAT |
| 342 | TOFACITINIB                                                  | XELJANZ                                                                   | <p>• în <b>asociere</b> cu metotrexat (MTX) este indicat în tratamentul artritei reumatoide (AR) active, moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la, sau care nu tolerează unul sau mai multe medicamente antireumactice modificate ale bolii; •administrat ca <b>monoterapie</b> în caz de intoleranță la MTX sau atunci când tratamentul cu MTX nu este adecvat</p>                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 343 | ETIONAMIDUM                                                  | ETIONAMIDA 250 mg                                                         | <p>Medicament tuberculostatic de linia a 2a la pacienții cu rezistență la medicamentele de linia 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 344 | VEDOLIZUMABUM                                                | ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă       | <p>Boala Crohn</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 345 | VEDOLIZUMABUM                                                | ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă       | <p>Colita Ulcerativă</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 346 | COMBINATII (EFAVIRENZUM/ EMTRICITABINUM/ TENOFOVIRUM)        | EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR disoproxil MYLAN 600 mg /200 mg /245 mg | <p>infecția HIV</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 347 | OMALIZUMAB                                                   | XOLAIR 150 mg                                                             | <p>tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienți adulți și adolescenți (12 ani și peste această vârstă) cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |

|     |                                                         |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|-----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 348 | ETIONAMIDUM                                             | NA                                                                                     | în combinație cu alte medicamente tuberculostatice ca medicament de linia a doua la pacienții cu Mycobacterium tuberculosis (MT) în condițiile în care s-a instalat rezistența la medicamentele de primă intenție (izoniazidă și rifampicină).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat |
| 349 | LEVOFLOXACINUM                                          | NA                                                                                     | tratamentul infecțiilor bacteriene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 350 | CLOFAZIMUN                                              | NA                                                                                     | TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 351 | LINEZOLID                                               | NA                                                                                     | TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 352 | Combinatii (Rifampicina+Pirazinamida+Izoniazida)        | NA                                                                                     | TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 353 | Combinatii (Amoxicilina+Acid clavulanic)                | NA                                                                                     | TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 354 | Combinatii (Imipenem+Cilastatin)                        | NA                                                                                     | TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 355 | Rifamycin                                               | NA                                                                                     | TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 356 | Combinatii(Rifampicin+Pirazinamid+Izoniazid +Etambutol) | NA                                                                                     | TBC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat |
| 357 | Natrii Cromoglicas                                      |                                                                                        | MASTOCITOZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat |
| 358 | Palbociclib                                             | IBRANCE 75 mg capsule<br>IBRANCE 100 mg capsule<br>IBRANCE 125 mg capsule              | tratamentul <b>cancerului mamar avansat local sau metastatic pozitiv pentru receptorul pentru hormoni (HR) i</b> negativ pentru receptorul 2 pentru factorul uman de creștere epidermală (HER2):<br>- în asociere cu un inhibitor de aromatază<br>- în asociere cu fulvestrant la femei cărora li s-a administrat tratament endocrin anterior La femeile în pre- sau perimenopauză, tratamentul endocrin trebuie combinat cu un agonist al hormonului de eliberare al hormonului luteinizant (LHRH).                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 359 | BECLOMETASONE / FORMOTEROL / GLYCOPYRRONIUM BROMIDE     | TRIMBOW 87/5/9 mg                                                                      | BPOC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat |
| 360 | OLARATUMAB                                              | LARTRUVO                                                                               | în combinație cu doxorubicina pentru tratamentul pacienților adulți cu sarcom de țesuturi moi în stadii avansate care nu sunt eligibili pentru tratamentul curativ prin intervenție chirurgicală sau radioterapie și care nu au fost tratați anterior cu doxorubicină                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat |
| 361 | VENETOCLAX                                              | VENCLYXTO                                                                              | 1. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC) în prezența deleției 17p sau a mutației TP53 la pacienți adulți care nu sunt eligibili pentru sau au avut eșec la un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B.<br>2. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu LLC în absența deleției 17p sau a mutației TP53 care au avut eșec atât la chimioterapie și imunoterapie cât și la tratamentul cu un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B.                                                                                                                              | Finalizat |
| 362 | BRENTUXIMAB VEDOTIN                                     | ADCETRIS                                                                               | tratamentul pacienților adulți cu limfom cutanat cu celule T CD30+ (LCCT) după cel puțin 1 tratament sistemic anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat |
| 363 | ARSENICUM TRIOXIDUM                                     | TRISENOX 1mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă                                  | TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii și consolidare la pacienții adulți care prezintă:<br>☒ leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la intermediar, nou diagnosticată(număr de leucocite ≤10 x 103/μl) în asociere cu acidul all-trans retinoic (AATR)<br>☒ leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară (tratamentul anterior trebuie să fi inclus un retinoid și chimioterapie) caracterizată prin prezența translocăției t(15;17) și / sau prezența genei leucemiei promielocitare/receptorului-alfa al acidului retinoic (LPM/RAR-alfa).<br>Nu a fost studiată rata de răspuns a altor subtipuri de leucemii acute mieloblastice la trioxidul de arsen. | Finalizat |
| 364 | LIPEGFILGRASTIMUM                                       | LONQUEX 6 mg soluție injectabilă                                                       | Reducerea duratei neutropeniei și a apariției neutropeniei febrile la pacienți adulți tratați cu chimioterapie citotoxică pentru afecțiuni maligne (cu excepția leucemiei mieloid cronice și a sindroamelor mielodisplazice).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat |
| 365 | EVEROLIMUS                                              | AFINITOR                                                                               | tratamentul tumorilor neuroendocrine, nefuncționale, nerezectabile sau metastatice, bine diferențiate (de gradul 1 sau gradul 2), de origine gastro-intestinală sau pulmonară, la adulți cu boală progresivă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat |
| 366 | NIVOLUMAB                                               | OPDIVO 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă                                  | OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul cancerului scuamos de cap și gât la adulți la care boala progresează în timpul sau după terapie pe bază de săruri de platină                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat |
| 367 | COMBINATII (TRIFLURIDINUM+TIPIRACILUM)                  | LONSURF 15 mg/ 6,14 mg comprimate filmate<br>LONSURF 20 mg/ 8,19 mg comprimate filmate | tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (CCR –cancer colorectal), cărora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe bază de fluoropirimidină, oxaliplatină și irinotecan, tratamentele anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) și anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 368 | NUSINERSEN                                              | SPINRAZA                                                                               | tratamentul atrofiei musculare spinale 5q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat |
| 369 | COLISTIMETAT DE SODIU                                   | COLOBREATHE 1662500 UI capsule cu pulbere de inhalat                                   | Colobreathe este indicat în abordarea terapeutică a infecțiilor pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa, la pacienții cu fibroză chistică (FC), cu vârsta de cel puțin 6 ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat |
| 370 | PERTUZUMABUM                                            | PERJETA                                                                                | Perjeta este indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |
| 371 | DOLUTEGRAVIR                                            | TIVICAY 10 mg, 25 mg                                                                   | în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 372 | DOLUTEGRAVIR                                            | TIVICAY 50 mg                                                                          | în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat |
| 373 | CABOZANTINIB                                            | CABOMETYX 40mg, 60mg                                                                   | tratamentul carcinomului celular renal (CCR) în stadiu avansat, la adulți care au urmat anterior o terapie țintită asupra factorului de creștere al endoteliului vascular (FCEV).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat |
| 374 | CERITINIB                                               | ZYKADIA                                                                                | a în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat (NSCLC), pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), tratați anterior cu crizotinib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat |

|     |                                          |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 375 | AZACITIDINE                              | VIDAZA                                                                                 | tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice (TCSH), cu LAM cu > 30 % blaști medulari conform clasificării OMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 376 | BEVACIZUMAB                              | AVASTIN                                                                                | în asociere cu paclitaxel și cisplatină sau, în mod alternativ, cu paclitaxel și topotecan la pacientele cărora nu li se poate administra chimioterapie cu săruri de platină, este indicat pentru tratamentul pacientelor adulte cu carcinom de col uterin persistent, recurent sau metastazat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat    |
| 377 | DIMETHYL FUMARATE                        | Tecfidera 120 mg capsule gastrorezistente<br>Tecfidera 240 mg capsule gastrorezistente | Tecfidera este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă forma recurentremisivă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat    |
| 378 | OBINUTUZUMAB                             | GAZYVARO                                                                               | Gazyvaro administrat în asociere cu bendamustină, urmat de tratament de întreținere cu Gazyvaro, este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfom folicular (LF) care nu au răspuns la tratament sau au prezentat progresia bolii în timpul sau în interval de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă de tratament care a inclus rituximab                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat    |
| 379 | PEGINTERFERON BETA 1A                    | PLEDIGRY                                                                               | Plegridy este indicat la pacienții adulți pentru tratamentul sclerozei multiple recurent remiseive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat    |
| 380 | COMBINATII<br>(CARVEDILOLUM+IVABRADINUM) | CARIVALAN                                                                              | 1. tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienți cu boală coronariană<br>2. tratamentul insuficienței cardiace cronice (clasa II-IV NYHA) cu disfuncție sistolică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat    |
| 381 | APREMILAST                               | OTEZLA                                                                                 | tratamentul psoriazisului în plăci cronic, moderat până la sever, la pacienții adulți care nu au răspuns sau cărora le este contraindicată ori prezintă intoleranță la altă terapie sistemică, inclusiv ciclosporină, metotrexat sau psoralen și raze ultraviolete A (PUVA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat    |
| 382 | APREMILAST                               | OTEZLA                                                                                 | administrat ca monoterapie sau în asociere cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active (APS) la pacienții adulți care auobținut un răspuns inadecvat sau au prezentat intoleranță la o terapie anterioară cu MARMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 383 | ERIBULIN                                 | HALAVEN                                                                                | tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar local în stadiu avansat sau metastatic, la care boala a progresat după cel puțin un regim chimioterapic pentru boală în stadiu avansat. Tratamentul anterior trebuia să includă o antraciclină și un taxan fie în context adjuvant, fie în context metastatic, cu excepția cazului în care pacienții nu îndeplineau criteriile pentru administrarea acestor medicamente                                                                                                                                                                                                    | Finalizat    |
| 384 | USTEKINUMAB                              | STELARA                                                                                | tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai răspundă sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la antagoniști TNFα, sau aceste tratamente le sunt contraindicate din punct de vedere medical.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat    |
| 385 | MIDOSTAURIN                              | RYDAPT                                                                                 | <b>1)</b> la pacienții adulți nou diagnosticați cu leucemie granulocitară acută (LGA), cu mutație FLT3 în asociere cu chimioterapia standard de inducție cu daunorubicină și citarabină și de consolidare cu doză mare de citarabină, iar la pacienții cu răspuns complet, ca tratament de întreținere cu Rydapt în monoterapie;<br><b>2)</b> în tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă (MSA), mastocitoză sistemică cu neoplazie hematologică asociată (MS-NHA) sau leucemie cu celule de tip mastocit (LCM) în monoterapie                                                                      | Finalizat    |
| 386 | SILTUXIMABUM                             | SYLVANT                                                                                | SYLVANT este indicat în tratamentul pacienților adulți cu boala Castleman multicentrică (BCM) fără infecție cu virusul imunodeficienței umane (HIV) și fără infecție cu virusul herpetic uman de tip 8 (VHU-8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat    |
| 387 | PANOBINOSTATUM                           | FARYDAK                                                                                | Farydak, administrat în combinație cu borteomib și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și/sau refractar cărora li s-au administrat cel puțin două scheme anterioare de tratament incluzând borteomib și o substanță imunomodulatoare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat    |
| 388 | ATEZOLIZUMAB                             | TECENTRIQ                                                                              | Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină sau care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatină                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat    |
| 389 | EFTRENONACOG ALFA                        | ALPROLIX                                                                               | Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilie B (deficit congenital de factor IX).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat    |
| 390 | ABIRATERONE                              | ZYTIGA                                                                                 | ●tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy)<br>● tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la castrare (mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer), la bărbații adulți asimptomatici sau ușor simptomatici, după eșecul terapiei de deprivare androgenică și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic (vezi pct. 5.1) | in asteptare |
| 391 | ATEZOLIZUMAB                             | TECENTRIQ                                                                              | Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul neoplasmului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie. Pacienților cu mutații activatoare ale EGFR sau mutații tumorale ALK pozitive trebuie, deasemenea, să li se fi administrat tratament specific, înaintea administrării Tecentriq                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat    |
| 392 | ALECTINIB                                | ALECENSA                                                                               | indicat ca monoterapie pentru tratamentul de primă linie al pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, cu status pozitiv pentru kinaza din limfomul anaplastic (ALK). Alecensa este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu NSCLC avansat, cu status pozitiv ALK, tratați anterior cu crizotinib                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat    |
| 393 | RIBOCICLIB                               | KISQALI                                                                                | în asociere cu un inhibitor de aromatază este indicat pentru tratamentul femeilor aflate la <b>postmenopauză, cu cancer mamar, în stadiu avansat sau metastazat local</b> , cu receptori hormonal (RH) pozitivi și <b>fără</b> receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică ( <b>HER2</b> ), ca terapie hormonală inițială                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat    |
| 394 | PEMBROLIZUMAB                            | KEYTRUDA                                                                               | în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulți cărora li s-a administrat anterior chimioterapie care conține săruri de platină                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat    |
| 395 | IBRUTINIB                                | IMBRUVICA                                                                              | în asociere cu bendamustină și rituximab (BR) în tratamentul pacienților adulți cu LLC cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 396 | OCRELIZUMAB                              | OCREVUS                                                                                | Ocrevus este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu forme recurente de scleroză multiplă (SMR), cu boală activă definită prin caracteristici clinice și imagistice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat    |

|     |                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 397 | DASATINIBUM                                  | Sprycel                                                                | SPRYCEL este indicat pentru tratamentul copiilor și adolescenților:<br>☑ nou-diagnosticați cu LMC Ph+ în fază cronică (LMC Ph+ FC) sau cu LMC Ph+ FC cu rezistență sau intoleranță la terapii anterioare, inclusiv imatinib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat    |
| 398 | ATALUREN                                     | Translarna                                                             | Translarna este indicat în tratamentul pacienților ambulatorii cu vârsta de 2 ani și peste cu distrofie musculară Duchenne determinată de o mutație de tip nonsens la nivelul genei distrofinei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat    |
| 399 | EVOLOCUMAB                                   | Repatha 140 mg                                                         | Se utilizează pentru reducerea nivelurilor de lipide din sânge la pacienți care suferă de hipercolesterolemie primară (niveluri ridicate de colesterol în sânge, provocate de o anomalie genetică), de hipercolesterolemie familială homozigotă (o formă severă de colesterol ridicat în sânge, moștenită de la ambii părinți) și de dislipidemie mixtă (niveluri anormale de diferite lipide, inclusiv colesterol). Medicamentul se utilizează și pentru reducerea riscului de probleme cardiace la pacienții cu ateroscleroză (pereți îngroșați ai arterelor) care au avut un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte probleme ale sistemului circulator (boală cardiacă aterosclerotică). Repatha se utilizează în asociere cu o statină, sau cu o statină și alte medicamente pentru scăderea nivelurilor de lipide. Repatha se poate utiliza și fără statină la pacienții care nu pot lua statine. La unii pacienți este necesară și o dietă slabă în grăsimi. | Finalizat    |
| 400 | DARATUMUMAB                                  | Darzalex                                                               | în asociere cu bortezomib, melfalan și prednison pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu nou diagnosticat și care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat    |
| 401 | PEMBROLIZUMABUM                              | Keytruda                                                               | limfom Hodgkin clasic, o formă de cancer al limfocitelor (un tip de globule albe). Keytruda se utilizează numai după ce tratamentul cu brentuximab vedotin și transplantul autolog de celule stem (un tip de transplant utilizat pentru a înlocui măduva osoasă cu celulele stem ale pacientului) nu au dat rezultate, ori după ce tratamentul cu brentuximab vedotin nu a dat rezultate și nu este posibilă efectuarea unui transplant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat    |
| 402 | REGORAFENIBUM                                | STIVARGA                                                               | Monoterapie pt tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular , care au fost tratați anterior cu sorafenib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat    |
| 403 | EMICIZUMAB                                   | Hemlibra                                                               | tratament profilactic de rutină pentru prevenirea sângerărilor sau reducerea frecvenței episoadelor de sângerare la pacienți cu hemofilia A care prezintă inhibitor de factor VIII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat    |
| 404 | INSULINA GLARGINE+LIXISENATIDUM              | Suliqua                                                                | Suliqua este indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat    |
| 405 | INSULINA DEGLUTEC                            | Tresiba                                                                | Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 1 an.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 406 | DABIGATRAN ETEXILAT                          | Pradaxa 110 mg<br>Pradaxa 150 mg                                       | Prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârsta ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă, (NYHA≥ II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 407 | GOLIMUMABUM                                  | Simponi                                                                | Colita ulcerativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat    |
| 408 | NETUPITANTUM+PALONOSTERONUM                  | Akynzeo                                                                | prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen accentuat ce conține cisplatină<br>- prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen moderat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat    |
| 409 | TUROCTOCOG ALFA                              | Novoeight                                                              | Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat    |
| 410 | PERTUZUMABUM                                 | Perjeta                                                                | tratament neoadjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc înalt de recurență si tratament adjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER 2 pozitiv, în stadiu incipient, cu risc înalt de recurență                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Finalizat    |
| 411 | BAZOMIB                                      | NINLARO 2,3 mg capsule<br>NINLARO 3 mg capsule<br>NINLARO 4 mg capsule | Ixazomib, în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu care au urmat cel puțin un tratament anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat    |
| 412 | AVELUMABUM                                   | Bavencio                                                               | carcinom metastatic cu celulu Merkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 413 | CLADRIBINUM                                  | MAVENCLAD 10 mg comprimate                                             | MAVENCLAD este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă (SM) recurentă foarte activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | în așteptare |
| 414 | DENOSUMAB                                    | Prolia                                                                 | tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauza cu risc crescut de fractura după tratamentul inițiat cu bifosfonati sau care au intoleranță sau contraindicație la bifosfonati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 415 | Cilostazol                                   | Dilvas                                                                 | claudicație intermitentă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | în așteptare |
| 416 | LENALIDOMIDUM                                | LENALIDOMIDA ALVOGEN 10 mg, 25 mg, 15 mg, 5 mg                         | Lenalidomidă Alvogen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem.<br>Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.<br>Lenalidomidă Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Finalizat    |
| 416 | Cerliponază alfa                             | Brineura 150 mg soluție perfuzabilă                                    | tratamentul afecțiunii de lipofuscină ceroidă neuronală de tip 2 (LCN2), cunoscută și sub denumirea de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat    |
| 417 | Velmanază alfa                               | Lamzedo 10 mg                                                          | Terapia de substituție enzimatică în tratamentul manifestărilor non-neurologice la pacienți cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat    |
| 418 | SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM | VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg                                            | Vosevi este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitic C (VHC) la adulți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat    |
| 419 | COMBINATII(SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM)       | EPCLUSA 400mg/100mg                                                    | Epclusa este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat    |
| 420 | BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM                  | FOSTER NEXTHALER 100/6 micrograme pe doză                              | Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | în așteptare |

|     |                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 | Benralizumabum                                                          | Fasenra        | Fasenra este indicat ca tratament de întreținere la pacienții adulți cu astm bronșic eozinofilic sever, care nu este controlat în mod adecvat prin administrarea inhalatorie a unei doze mari de corticosteroizi plus $\beta$ -agoniști cu durată lungă de acțiune                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat    |
|     | Empagliflozin                                                           | Jardiance      | tratamentul adulților cu diabet de tip 2 insuficient controlat, ca adjuvant la dieta și exercitiu fizic și ca monoterapie atunci când metformina este considerată inadecvată din cauza intoleranței în plus față de alte medicamente pentru tratamentul DZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 422 | Pembrolizumab                                                           | KEYTRUDA       | KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporțional (STP) $\geq 50\%$ , fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Finalizat    |
| 423 | Turoctocog alfa, factor de coagulare VIII                               | NovoEight®     | Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII). NovoEight poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat    |
| 424 | Lenalidomidă                                                            | Lenalidomidum  | Este indicat în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat    |
| 425 | Trametinib                                                              | Mekinist       | administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib, este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, cu mutație BRAF V600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | în așteptare |
| 426 | Dabrafenib                                                              | Tafinlar       | administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib, este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, cu mutație BRAF V600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | în așteptare |
| 427 | Propranololum                                                           | Hemangioli     | Hemangiomi infantili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | în așteptare |
| 428 | Burosumabum                                                             | CRYSVITA 10 mg | CRYSVITA este indicat pentru tratamentul hipofosfatemiei X-linkate (HXL), cu evidențe radiografice de boală osoasă, la copii cu vârsta de 1 an și peste și adolescenți al căror schelet este în creștere.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat    |
| 429 | Lenalidomidă Sandoz                                                     | Lenalidomidum  | Mielom multiplu<br>Lenalidomidă Alvogen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem.<br>Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.<br>Lenalidomidă Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior. | Finalizat    |
| 430 | Icatibant                                                               | Firazyr        | Firazyr este indicat pentru tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditar (AEE) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste cu deficit de inhibitor al C1-esterazei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Finalizat    |
| 431 | Darvadstrocel                                                           | Alofisel       | Alofisel este indicat pentru tratamentul fistulelor perianale complexe la pacienții adulți cu boala Crohn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Finalizat    |
| 432 | Ruxolitinib                                                             | Jakavi         | tratamentul pacienților adulți cu policitemia vera care prezintă rezistență sau intoleranță la hidroxiuree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat    |
| 433 | Combinatii Dapagliflozin + Metformin                                    | Xigduo         | Xigduo este indicat ca tratament adjuvant la dieta și exercitiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2;<br>- la pacienții controlați inadecvat cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie<br>- în asociere cu alte medicamente pentru scăderea glicemiei, inclusiv insulina, la pacienții controlați inadecvat cu metformin<br>- pentru pacienții tratați deja cu asocierea dapagliflozin și metformin sub formă de comprimate separate                                                                                       | în așteptare |
| 434 | CRIZOTINIB                                                              | XALKORI        | tratamentul de primă intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Finalizat    |
| 435 | Guselkumab                                                              | Tremfya        | Tremfya este indicat în tratamentul psoriazisului în placi, formele moderate până la severe, la pacienții care sunt eligibili pentru terapia sistemică.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | în așteptare |
| 436 | combinatii darunavir+cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamida | Symtuza        | Symtuza este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la adulți și adolescenți (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 40 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | în așteptare |
| 437 | Blinatumomab                                                            | Blincyto       | monoterapie pentru tratamentul adulților cu LLA precursor de celulă B, cu cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă, în prima sau a doua remisie completă cu boala minimă reziduală (minimal residual disease, MRD) mai mare sau egală cu 0,1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | în așteptare |
| 438 | Migalastat                                                              | GALAFOLD       | Migalastat este indicat pentru tratamentul de lungă durată al adulților și adolescenților în vârstă de cel puțin 16 ani, cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficit de alfa-galactozidază A) și care prezintă o mutație sensibilă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat    |
| 439 | Brentuximab Vedotin                                                     | ADCETRIS       | Adcetris este indicat pentru pacienții adulți cu limfom Hodgkin (LH) CD30+ stadiu IV, netratat anterior, în asociere cu doxorubicină, vinblastină și dacarbazină (AVD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Finalizat    |
| 440 | Fampridinum                                                             | Fampyra        | îmbunătățirea mersului la pacienții adulți cu scleroză multiplă care prezintă invaliditate (EDSS4-7)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | în așteptare |
| 441 | Pomalidomida                                                            | IMNOVID        | în asociere cu dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-a administrat cel puțin două regimuri terapeutice anterioare, incluzând lenalidomidă și bortezomib și care au prezentat progresia bolii la ultimul tratament                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat    |
| 442 | Avelumabum                                                              | Bavencio       | carcinom metastatic cu celule Merkel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat    |
| 443 | Comb (Ledipasvirum+Sofosbuvirum)                                        | Harvoni        | tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adolescenți cu vârsta cuprinsă între 12 și < 18 ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat    |
| 444 | Ixekizumabum                                                            | TALTZ          | tratamentul artritei psoriazice active la adulți la care răspunsul terapeutic a fost inadecvat sau a demonstrat intoleranță după administrarea unuia sau a mai multor medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | în așteptare |
| 445 | Ixekizumabum                                                            | TALTZ          | tratamentul psoriazisului în placi moderat până la sever la adulții care sunt eligibili pentru terapie sistemică și care prezintă pe lângă diagnosticul principal psoriazis afectare articulară                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | în așteptare |
| 446 | Patisiran                                                               | ONPATTRO       | tratamentul amiloidozei ereditare mediata de transtiretina (amiloidoză hATTR) la pacienții adulți cu polineuropatie de stadiu 1 sau stadiu 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Finalizat    |
| 447 | Nivolumab                                                               | OPDIVO         | în monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastază la care s-a efectuat rezecție completă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |

|     |                                                        |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
|-----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 448 | Pembrolizumabum                                        | Keytruda                                                | pacienti adulti cu carcinom pulmonar, altul decat cel cu celule mici (NSCLC, non-small lung cancer) metastatic, scuamos, ale caror tumori nu prezinta mutatii EGFR sau ALK pozitive si care pot fi tratati cu medicamentul Keytruda in asociere cu carboplatina si fie paclitaxel, fie nab-paclitaxel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat    |
| 449 | Abemaciclibum                                          | Verzenios                                               | trat femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv si receptor c pentru factorul de crestere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, in asociere cu fulvestrant ca tratament hormonal initial sau la femei carora li s-a administrat anterior tratament hormonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 450 | Abemaciclibum                                          | Verzenios                                               | tratamentul femeilor cu cancer mamaar metastatic sau local avansat cu recepttor hormonal (HR) pozitiv si receptor pentru factorul de crestere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, in asociere cu inhibitor de aromataza ca tratament hormonal initial sau la femei carora li s-a administrat anterior tratamentul hormonal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in asteptare |
| 451 | Obinutuzumab                                           | Gazyvaro                                                | tratamentul pacientilor cu limfom folicular in forma avansata ,netratati anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Finalizat    |
| 452 | VENETOCLAX                                             | VENCLYXTO                                               | Venclyxto administrat în asociere cu rituximab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) care au primit anterior cel puțin un tratament.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat    |
| 453 | Durvalumabum                                           | Imfinzi                                                 | in monoterapie este indicat in tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) local avansat, inoperabil, pentru pacienti adulti ale caror tumori exprima PD-L1 la ≥1% dintre celule;e tumorale si a caror boala nu a progresat dupa radio-chimioterapie cu compusi pe baza de platina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in asteptare |
| 454 | TISAGENLECLEUCEL                                       | KYMRIAH                                                 | tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe linii de terapie sistemică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in asteptare |
| 455 | TRAMETINIB                                             | MEKINIST                                                | Trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat    |
| 456 | DABRAFENIB                                             | TAFINLAR                                                | Dabrafenib în asociere cu trametinib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Finalizat    |
| 457 | TISAGENLECLEUCEL                                       | KYMRIAH                                                 | tratamentul pacienților copii și adolescenți și pacienților adulți tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în remisie post-transplant sau în a doua sau a treia recidivă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in asteptare |
| 458 | Semaglutidum                                           | Ozempic                                                 | Ozempic este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dieta și exerciții fizice:<br>- sub forma de monoterapie atunci cand administrarea de metformin este considerata inadecvata din cauza intolerantei sau a contraindicațiilor<br>- in asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Finalizat    |
| 459 | Agalsidasum Alfa                                       | Replagal                                                | indicat pentru terapia de substitutie enzimatica pe termen lung la pacienti cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienta de alfa-galactosidaza A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Finalizat    |
| 460 | Irinotecan lipozomal                                   | ONIVYDE 4,3 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă | Tratamentul adenocarcinomului pancreatic metastazat, în asociere cu 5-fluorouracil (5-FU) și leucovorin (LV), la pacienți adulți la care afecțiunea a progresat sub tratament pe bază de gemcitabină.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat    |
| 461 | Sirolimus                                              | Rapamune                                                | Rapamune este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfangioleiomiomatoză sporadică, cu boală pulmonară moderată sau funcție pulmonară în declin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Finalizat    |
| 462 | Dupilumab                                              | Dupixent                                                | Tratamentul dermatitei atopice forma moderata pana la severa la pacienii adulti care sunt candidati pentru terapie sistemică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in asteptare |
| 463 | Everolimus                                             | Votubia                                                 | Tratamentul adjuvant al pacientilor cu varsta de 2 ani si peste aceasta varsta, ale caror convulsii referactare, cu debut partial, cu sau fara generalizare secundara, sunt asociate cu complexul sclerozei tuberoase(CST)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Finalizat    |
| 464 | Apomorfium                                             | APO-GO                                                  | trat. Fluctuțiilor motorii la pac. cu b. Parkinson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in asteptare |
| 465 | Caplacizumab                                           | Cablivi                                                 | Tratamentul adulților care manifesta un episod de purpura trombocitopenica trombotica dobandita (PTTd), in asociere cu plasmafereza si tratament imunosupresor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Finalizat    |
| 466 | Pegaspargasum                                          | ONCASPAR                                                | indicat ca o componenta a terapiei combinate antineoplazice in leucemia limfoblastica acuta (LAL) la copii si adolescenti de la nastere pana la 18 ani si la pacienti adulti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | in asteptare |
| 467 | Elmoroctocog alfa                                      | Elocta                                                  | tratamentul si profilaxia hemoragiilor la pacientii cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII). Elocta poate fi utilizat la toate grupele de varsta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in asteptare |
| 468 | Comb (Bictegravir+Emtricitabina+Tenofovir alafenamida) | Biktarvy                                                | tratamentul adulților infectati cu virusul imunodeficientiei umane de tip 1 (HIV-1) fara evidente prezente sau anterioare de rezistenta virala la clasa inhibitorilor integrazei , emtricitabina sau tenofovir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in asteptare |
| 469 | Insulinum degludec                                     | Tresiba                                                 | tratamentul diabetului zaharat la adulti,adolescenti si copii de la varsta de 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Finalizat    |
| 470 | Rosuvastatina+perindopril+indapamida                   | Roxiper                                                 | tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale, și care prezintă și una dintre următoarele afecțiuni concomitente: hipercolesterolemie primară (tip IIa incluzând hipercolesterolemie familială heterozigotă), dislipidemia mixtă (tip IIb) sau hipercolesterolemie familială homozigotă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in asteptare |
| 471 | Pembrolizumabum                                        | Keytruda                                                | Introducere in compensare ambalaj nou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in asteptare |
| 472 | Lurasidona                                             | Latuda                                                  | tratamentul este indicat pentru tratamentul schizofreniei la adulti cu varsta de 18 ani sau mai mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 473 | Sunitinib                                              | Sutent                                                  | Sutent este indicat pentru tratamentul tumorilor neuroendocrine pancreatice (pNET) bine diferențiate, nerezecabile sau metastatice, la adulți care au prezentat progresia bolii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in asteptare |
| 474 | Lenalidomide Accord                                    | Lenalidomidum                                           | Lenalidomide Accord, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in asteptare |
| 475 | Lenalidomide Accord                                    | Lenalidomidum                                           | Lenalidomide Accord este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in asteptare |
| 476 | Dinutuximab beta                                       | Qarziba 4,5 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă | Qarziba este indicat pentru tratamentul neuroblastomului cu grad mare de risc la pacienții cu vârsta peste 12 luni, cărora li s-a administrat anterior chimioterapie de inducție și care au obținut cel puțin un răspuns parțial, urmat de terapie mieloablativă și transplant de celule stem, precum și la pacienții cu antecedente de neuroblastom recurent sau rezistent, cu sau fără boală reziduală. Înaintea tratamentului pentru neuroblastom recurent, orice boală activă care progresează trebuie stabilizată prin alte măsuri adecvate. În cazul pacienților cu antecedente de boală recurentă/rezistentă și al pacienților care nu au obținut un răspuns complet după terapia de primă linie, Qarziba trebuie administrat în asociere cu interleukină-2 (IL-2) | Finalizat    |

|     |                                      |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 477 | AFATINIBUM                           | GIOTRIF 20 mg comprimate filmate<br>GIOTRIF 30 mg comprimate filmate<br>GIOTRIF 40 mg comprimate filmate | GIOTRIF este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutație(i) activatoare a(le) EGFR, netratați anterior cu Receptorul Factorului de Creștere Epidermal (EGFR) TK                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in asteptare |
| 478 | DULAGLUTIDUM                         | TRULICITY                                                                                                | Trulicity este indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic sub formă de:<br>Monoterapie<br>Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor.<br>Terapie combinată<br>În combinație cu alte medicamente hipoglicemizante, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat | in asteptare |
| 479 | Olaparibum                           | Lynparza                                                                                                 | Monoterapie ca tratament de întreținere la pacienți adulți cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivat cu mutație BRCA (germinală și/sau somatică) neoplazie de trompa uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe baza de platină, cu raspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe baza de platină                                                                                                                                                                                                                           | in asteptare |
| 480 | Lenalidomidum                        | Lenalidomidă Alvogen                                                                                     | Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in asteptare |
| 481 | Lenalidomidum                        | Lenalidomidă Alvogen                                                                                     | Lenalidomida Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in asteptare |
| 482 | Cresemba                             | Isavuconazolum                                                                                           | Cresemba este indicat la adulți pentru tratamentul mucormicozei la pacienții la care amfotericina B este inadecvată                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in asteptare |
| 483 | Cresemba                             | Isavuconazolum                                                                                           | Cresemba este indicat la adulți pentru tratamentul aspergilozei invazive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 484 | Briviact                             | brivacaracetam                                                                                           | indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 4 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in asteptare |
| 484 | Ivacaftor                            | Kalydeco                                                                                                 | Kalydeco comprimate este indicat pentru tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC) cu vârsta de 6 ani și peste și cu greutatea de 25 kg sau mai mult, care prezintă una dintre următoarele mutații de sincronizare (clasa III) la nivelul genei CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N sau S549R                                                                                                                                                                                                                                              | in asteptare |
| 485 | Lenalidomidum                        | Lenalidomida Sandoz                                                                                      | indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 486 | Crizotinibum                         | Xalkori                                                                                                  | în monoterapie este indicat pentru:Tratamentul adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in asteptare |
| 487 | Nivolumab/Ipilimumab                 | Opdivo/Vervoy                                                                                            | Opdivo în asociere cu Ipilimumab este indicat pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat cu pronostic intermediar/nefavorabil, la adulți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in asteptare |
| 488 | Dolutegravir/Lamivudina              | Dovato                                                                                                   | tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV) tip 1 la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de minim 40 kg, fără rezistență documentată sau suspectată clinic la clasa inhibitorilor de integrază sau fața de lamivudina                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | in asteptare |
| 489 | Telotristat                          | Xermelo                                                                                                  | indicat pentru tratamentul diareei din cadrul sindromului carcinoid, în combinație cu terapie cu analog de somatostatina (ASS), la adulții care nu sunt controlați în mod corespunzător prin terapie cu ASS>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in asteptare |
| 490 | Lenalidomidum                        | Lenalidomida Glenmark                                                                                    | ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomida este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior                                                                                                                                                                                                                                           | in asteptare |
| 491 | Dolutegravir/Rilpivirina             | Juluca                                                                                                   | indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) la adulți care prezintă supresie virologică (ARN HIV-1 <50 copii/ml) în prezența unui regim antiretroviral stabil timp de minimum șase luni, care nu au antecedente de eșec virologic și rezistență cunoscută sau suspiciunată la inhibitori non-nucleozidici de reverstranscriptază sau la inhibitori de integrază                                                                                                                                                                   | in asteptare |
| 492 | Ramucirumabum                        | Cyramza                                                                                                  | în monoterapie este indicat în tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular în stadiu avansat sau nerezeceabil cu o valoare a alfa fetoproteinei serice (AFP) ≥ 400 ng/ml, care au fost tratați anterior cu sorafenib.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in asteptare |
| 493 | inhibitor de esteraza C1, umana      | Cinryze                                                                                                  | Tratamentul și prevenția pre-procedurală a episoadelor de angioedem la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 2 ani și peste) cu angioedem ereditar (AEE). Prevenția de rutină a episoadelor de angioedem la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 6 ani și peste) cu crize severe și recurente de angioedem ereditar (AEE), care prezintă intoleranță la tratamentele orale preventive sau sunt insuficient protejați de acestea, sau la pacienți a căror stare este inadecvat controlată prin tratamente de fază acută aplicate în mod repetat                     | in asteptare |
| 494 | inotuzumab ozogamicin                | Besponsa                                                                                                 | indicat ca monoterapie pentru tratamentul adulților cu leucemie acută limfoblastică recidivată sau refractară (LAL) cu precursori de celule B pozitive pentru CD22. Pentru pacienții adulți cu LAL cu precursori de celule B cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph+) recidivată sau refractară, la care tratamentul cu cel puțin un inhibitor de tirozin-kinază (ITK) să fi eșuat.                                                                                                                                                                                             | in asteptare |
| 495 | Mercaptamine (cysteamine bitartrate) | Procysbi                                                                                                 | este indicat pentru tratamentul cistinozei nefropatice confirmate. Cisteamina reduce acumularea de cistină în unele celule (de exemplu leucocite, celule musculare și hepatice) la pacienții cu cistinoză nefropatică și întârzie dezvoltarea insuficienței renale, în cazul în care tratamentul este inițiat în primele faze ale bolii.                                                                                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 496 | LETERMOVIRUM                         | PREVMIS 240 mg                                                                                           | este indicat în tratamentul profilactic al reactivării infecției cu virusul citomegalic (CMV) și al bolii induse de virusul citomegalic la adulți CMV-seropozitivi [R+] la care s-a efectuat un transplant alogen de celule stem hematopoietice (TCSH).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | in asteptare |
| 497 | Tofacitinib                          | Xeljanz                                                                                                  | indicat în tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă (CU) activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns inadecvat, au pierdut răspunsul terapeutic sau nu au tolerat fie tratamentul convențional, fie un agent biologic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | in asteptare |
| 498 | Tofacitinib                          | Xeljanz                                                                                                  | în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice (APs) active la pacienții adulți care au avut un răspuns inadecvat, sau care nu au tolerat un tratament anterior cu un medicament antireumatic modificator al bolii (DMARD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in asteptare |
| 499 | Glecaprevir/Pibrentasvir             | Maviret                                                                                                  | indicat pentru tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulți și la adolescenți cu vârsta de 12 ani până la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in asteptare |

|     |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 500 | Simoctocog alfa                               | Nuwiq                                                   | Tratamentul si profilaxia hemoragiilor la pacientii cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 501 | Atorvastatinum+Ezetimibum                     | Zentovar                                                | Tratament adjuvant la regimul alimentar ca tratament de substituție pentru tratamentul adulților cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă sau homozigotă, familială și non-familială) sau hiperlipidemie mixtă deja controlată sub tratament cu atorvastatină și ezetimib administrate concomitent în aceleași doze                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 502 | Brigatinibum                                  | Aunbrig                                                 | este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar non-microcelular (CPNMC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), tratați anterior cu crizotinib.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | in asteptare |
| 503 | Baricitinib                                   | Olumiant 2 mg                                           | indicat în tratamentul poliartritei reumatoide active moderată până la severă la pacienți adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumactice modificatoare de boală . Olumiant poate fi administrat ca monoterapie sau în asociere cu metotrexat                                                                                                                                                                                     | in asteptare |
| 504 | Certolizumab pegol                            | Cimzia                                                  | psoriazis in placi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | in asteptare |
| 505 | Lumacaftor/Ivacaftor                          | Orkambi                                                 | tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC), cu vârsta de 12 ani și peste, cu genotip homozigot pentru mutația F508del la nivelul genei CFTR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in asteptare |
| 506 | Pancreatinum                                  | Kreon                                                   | Tratamentul insuficienței pancreatice exocrine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in asteptare |
| 507 | Cerliponasm Alfa                              | Brineura                                                | Brineura este indicat pentru tratamentul afecțiunii de lipofuscinoză ceroidă neuronală de tip 2 (LCN2), cunoscută și sub denumirea de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | in asteptare |
| 508 | EDOXABANUM                                    | Roteas 30 mg                                            | Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in asteptare |
| 509 | EDOXABANUM                                    | Roteas 60 mg                                            | Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in asteptare |
| 510 | EDOXABANUM                                    | Roteas 30 mg                                            | Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă ≥ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente.                                                                                                                             | in asteptare |
| 511 | EDOXABANUM                                    | Roteas 60 mg                                            | Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă ≥ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente.                                                                                                                             | in asteptare |
| 512 | DORAVIRINUM                                   | Pifeltro                                                | Pifeltro este indicat, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență la compușii din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)) în antecedente sau în prezent                                                                                                                                                       | in asteptare |
| 513 | DORAVIRINUM+LAMIVUDINUM+TENOFVIRUM DISOPROXIL | DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg                          | Delstrigo este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență în antecedente sau în prezent la compușii din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)), lamivudină, sau tenofovir                                                                                                                                                                             | in asteptare |
| 514 | LIRAGLUTIDUM                                  | VICTOZA                                                 | Victoza este indicat pentru tratamentul adulților, adolescenților și copiilor cu vârsta de 10 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice: in asociere cu metformin si insulina                                                                                                                                                                                                                                       | in asteptare |
| 515 | LENALIDOMIDUM                                 | LENALIDOMIDA GLENMARK                                   | Lenalidomidă Glenmark este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | in asteptare |
| 516 | RISANKIZUMABUM                                | Skyrizi 75 mg soluție injectabilă în seringă preumplută | Skyrizi este indicat în tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | in asteptare |
| 517 | NONACOG ALPHA (FACTOR IX DE COAGULARE)        | BENEFIX                                                 | Tratamentul și profilaxia hemoragiei la pacienții cu hemofilia tip B (deficit congenital de factor IX). BeneFIX poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in asteptare |
| 518 | PALIVIZUMABUM                                 | Synagis                                                 | Synagis este indicat pentru prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare, determinate de virusul sincițial respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR: Copii născuți la 35 săptămâni de gestație sau mai puțin și cei cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR.<br><br>Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni. | in asteptare |
| 519 | Abirateronum                                  | Zytiga                                                  | este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în: tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy)                                                                                                                                               | in asteptare |
| 520 | INHIBITOR DE ESTERAZA C1, UMANA               | Berinert                                                | Angioedem ereditar tip I și II (AAE)<br>Tratamentul și procedura de prevenire prealabilă a episoadelor acute.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | in asteptare |
| 521 | Insulinum glarginum                           | Toujeo/Lantus                                           | Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 6 ani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in asteptare |
| 522 | PATISIRANUM                                   | ONPATTRO                                                | Onpattro este indicat pentru tratamentul amiloidozei ereditare mediată de transtiretină (amiloidoză hATTR) la pacienții adulți cu polineuropatie de stadiu 1 sau stadiu 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in asteptare |
| 523 | Eltrombopag                                   | REVOLADE                                                | Revolade este indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste, cu trombocitopenie imună primară (TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)                                                                                                                                                                                                                     | in asteptare |
| 524 | Rituximabum                                   | Mabthera                                                | MabThera, administrat în asociere cu glucocorticoizi, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu granulomatoză cu poliangeită (Wegener) (GPA) activă, severă și poliangeită microscopică (MPA).                                                                                                                                                                                                                                                                                   | in asteptare |
| 525 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 526 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 527 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 528 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 529 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 530 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
| 531 |                                               |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |

|     |
|-----|
| 532 |
| 533 |
| 534 |
| 535 |
| 536 |
| 537 |
| 538 |
| 540 |
| 541 |
| 542 |
| 543 |
| 544 |
| 545 |
| 546 |
| 547 |
| 548 |
| 549 |
| 550 |
| 551 |
| 552 |
| 553 |
| 554 |
| 555 |
| 556 |
| 557 |
| 558 |
| 559 |
| 560 |
| 561 |
| 562 |
| 563 |
| 564 |
| 565 |
| 566 |
| 567 |
| 568 |
| 569 |
| 570 |
| 571 |
| 572 |
| 573 |
| 574 |
| 575 |
| 576 |
| 577 |
| 578 |
| 579 |
| 580 |
| 581 |
| 582 |
| 583 |
| 584 |
| 585 |
| 586 |
| 587 |
| 588 |
| 589 |
| 590 |
| 591 |
| 592 |
| 593 |
| 594 |
| 595 |
| 596 |

|     |
|-----|
| 597 |
| 598 |
| 599 |
| 600 |
| 601 |
| 602 |
| 603 |
| 604 |
| 605 |
| 606 |
| 607 |
| 608 |
| 609 |
| 610 |
| 611 |
| 612 |
| 613 |
| 614 |
| 615 |
| 616 |
| 617 |
| 618 |
| 619 |
| 620 |
| 621 |
| 622 |
| 623 |
| 624 |
| 625 |
| 626 |
| 627 |
| 628 |
| 629 |
| 630 |
| 631 |
| 632 |
| 633 |
| 634 |
| 635 |
| 636 |
| 637 |
| 638 |
| 639 |
| 640 |
| 641 |
| 642 |
| 643 |
| 644 |
| 645 |
| 646 |
| 647 |
| 648 |
| 649 |
| 650 |
| 651 |
| 652 |
| 653 |
| 654 |
| 655 |
| 656 |
| 657 |
| 658 |
| 659 |
| 660 |

|     |
|-----|
| 661 |
| 662 |
| 663 |
| 664 |
| 665 |
| 666 |
| 667 |
| 668 |
| 669 |
| 670 |
| 671 |
| 672 |
| 673 |
| 674 |
| 675 |
| 676 |
| 677 |
| 678 |
| 679 |
| 680 |
| 681 |
| 682 |
| 683 |
| 684 |
| 685 |
| 686 |
| 687 |
| 688 |
| 689 |
| 690 |
| 691 |
| 692 |
| 693 |
| 694 |
| 695 |
| 696 |
| 697 |
| 698 |
| 699 |
| 700 |
| 701 |
| 702 |
| 703 |
| 704 |
| 705 |
| 706 |
| 707 |
| 708 |
| 709 |
| 710 |
| 711 |
| 712 |
| 713 |
| 714 |
| 715 |
| 716 |
| 717 |
| 718 |
| 719 |
| 720 |
| 721 |
| 722 |
| 723 |
| 724 |

|     |
|-----|
| 725 |
| 726 |
| 727 |
| 728 |
| 729 |
| 730 |
| 731 |
| 732 |
| 733 |
| 734 |
| 735 |
| 736 |
| 737 |
| 738 |
| 739 |
| 740 |
| 741 |
| 742 |
| 743 |
| 744 |
| 745 |
| 746 |
| 747 |
| 748 |
| 749 |
| 750 |
| 751 |
| 752 |
| 753 |
| 754 |
| 755 |
| 756 |
| 757 |
| 758 |
| 759 |
| 760 |
| 761 |
| 762 |
| 763 |
| 764 |
| 765 |
| 766 |
| 767 |
| 768 |
| 769 |
| 770 |
| 771 |
| 772 |
| 773 |
| 774 |
| 775 |
| 776 |
| 777 |
| 778 |
| 779 |
| 780 |
| 781 |
| 782 |
| 783 |
| 784 |
| 785 |
| 786 |
| 787 |
| 788 |

|     |
|-----|
| 789 |
| 790 |
| 791 |
| 792 |
| 793 |
| 794 |
| 795 |
| 796 |
| 797 |
| 798 |
| 799 |
| 800 |
| 801 |
| 802 |
| 803 |
| 804 |
| 805 |
| 806 |
| 807 |
| 808 |
| 809 |
| 810 |
| 811 |
| 812 |
| 813 |
| 814 |
| 815 |
| 816 |
| 817 |
| 818 |
| 819 |
| 820 |
| 821 |
| 822 |
| 823 |
| 824 |
| 825 |
| 826 |
| 827 |
| 828 |
| 829 |
| 830 |
| 831 |
| 832 |
| 833 |
| 834 |
| 835 |
| 836 |
| 837 |
| 838 |
| 839 |
| 840 |
| 841 |
| 842 |
| 843 |
| 844 |
| 845 |
| 846 |
| 847 |
| 848 |
| 849 |
| 850 |
| 851 |
| 852 |

|     |
|-----|
| 853 |
| 854 |
| 855 |
| 856 |
| 857 |
| 858 |
| 859 |
| 860 |
| 861 |
| 862 |
| 863 |
| 864 |
| 865 |
| 866 |
| 867 |
| 868 |
| 869 |
| 870 |
| 871 |
| 872 |
| 873 |
| 874 |
| 875 |
| 876 |
| 877 |
| 878 |
| 879 |
| 880 |
| 881 |
| 882 |
| 883 |
| 884 |
| 885 |
| 886 |
| 887 |
| 888 |
| 889 |
| 890 |
| 891 |
| 892 |
| 893 |
| 894 |
| 895 |
| 896 |
| 897 |
| 898 |
| 899 |
| 900 |
| 901 |
| 902 |
| 903 |
| 904 |
| 905 |
| 906 |
| 907 |
| 908 |
| 909 |
| 910 |
| 911 |
| 912 |
| 913 |
| 914 |
| 915 |
| 916 |

|     |
|-----|
| 917 |
| 918 |
| 919 |
| 920 |
| 921 |
| 922 |
| 923 |
| 924 |
| 925 |
| 926 |
| 927 |
| 928 |
| 929 |
| 930 |
| 931 |
| 932 |
| 933 |
| 934 |
| 935 |
| 936 |
| 937 |
| 938 |
| 939 |
| 940 |
| 941 |
| 942 |
| 943 |
| 944 |
| 945 |
| 946 |
| 947 |
| 948 |
| 949 |
| 950 |
| 951 |
| 952 |
| 953 |
| 954 |
| 955 |
| 956 |
| 957 |
| 958 |
| 959 |
| 960 |
| 961 |
| 962 |
| 963 |
| 964 |
| 965 |
| 966 |
| 967 |
| 968 |
| 969 |
| 970 |
| 971 |
| 972 |
| 973 |
| 974 |
| 975 |
| 976 |
| 977 |
| 978 |
| 979 |
| 980 |

|      |
|------|
| 981  |
| 982  |
| 983  |
| 984  |
| 985  |
| 986  |
| 987  |
| 988  |
| 989  |
| 990  |
| 991  |
| 992  |
| 993  |
| 994  |
| 995  |
| 996  |
| 997  |
| 998  |
| 999  |
| 1000 |
| 1001 |
| 1002 |
| 1003 |
| 1004 |
| 1005 |
| 1006 |
| 1007 |
| 1008 |
| 1009 |
| 1010 |
| 1011 |
| 1012 |
| 1013 |
| 1014 |
| 1015 |
| 1016 |
| 1017 |
| 1018 |
| 1019 |
| 1020 |
| 1021 |
| 1022 |
| 1023 |
| 1024 |
| 1025 |
| 1026 |
| 1027 |
| 1028 |
| 1029 |
| 1030 |
| 1031 |
| 1032 |
| 1033 |
| 1034 |
| 1035 |
| 1036 |
| 1037 |
| 1038 |
| 1039 |
| 1040 |
| 1041 |
| 1042 |
| 1043 |
| 1044 |

|      |
|------|
| 1045 |
| 1046 |
| 1047 |
| 1048 |
| 1049 |
| 1050 |
| 1051 |
| 1052 |
| 1053 |
| 1054 |
| 1055 |
| 1056 |
| 1057 |
| 1058 |
| 1059 |
| 1060 |
| 1061 |
| 1062 |
| 1063 |
| 1064 |
| 1065 |
| 1066 |
| 1067 |
| 1068 |
| 1069 |
| 1070 |
| 1071 |
| 1072 |
| 1073 |
| 1074 |
| 1075 |
| 1076 |
| 1077 |
| 1078 |
| 1079 |
| 1080 |
| 1081 |
| 1082 |
| 1083 |
| 1084 |
| 1085 |
| 1086 |
| 1087 |
| 1088 |
| 1089 |
| 1090 |
| 1091 |
| 1092 |
| 1093 |
| 1094 |
| 1095 |
| 1096 |
| 1097 |
| 1098 |
| 1099 |
| 1100 |
| 1101 |
| 1102 |
| 1103 |
| 1104 |
| 1105 |
| 1106 |
| 1107 |
| 1108 |

|      |
|------|
| 1109 |
| 1110 |
| 1111 |
| 1112 |
| 1113 |
| 1114 |
| 1115 |
| 1116 |
| 1117 |
| 1118 |
| 1119 |
| 1120 |
| 1121 |
| 1122 |
| 1123 |
| 1124 |
| 1125 |
| 1126 |
| 1127 |
| 1128 |
| 1129 |
| 1130 |
| 1131 |
| 1132 |
| 1133 |
| 1134 |
| 1135 |
| 1136 |
| 1137 |
| 1138 |
| 1139 |
| 1140 |
| 1141 |
| 1142 |
| 1143 |
| 1144 |
| 1145 |
| 1146 |
| 1147 |
| 1148 |
| 1149 |
| 1150 |
| 1151 |
| 1152 |
| 1153 |
| 1154 |
| 1155 |
| 1156 |
| 1157 |
| 1158 |
| 1159 |
| 1160 |
| 1161 |
| 1162 |
| 1163 |
| 1164 |
| 1165 |
| 1166 |
| 1167 |
| 1168 |
| 1169 |
| 1170 |
| 1171 |
| 1172 |

|      |
|------|
| 1173 |
| 1174 |
| 1175 |
| 1176 |
| 1177 |
| 1178 |
| 1179 |
| 1180 |
| 1181 |
| 1182 |
| 1183 |
| 1184 |
| 1185 |
| 1186 |
| 1187 |
| 1188 |
| 1189 |
| 1190 |
| 1191 |
| 1192 |
| 1193 |
| 1194 |
| 1195 |
| 1196 |
| 1197 |
| 1198 |
| 1199 |
| 1200 |
| 1201 |
| 1202 |
| 1203 |
| 1204 |
| 1205 |
| 1206 |
| 1207 |
| 1208 |
| 1209 |
| 1210 |
| 1211 |
| 1212 |
| 1213 |
| 1214 |
| 1215 |
| 1216 |
| 1217 |
| 1218 |
| 1219 |
| 1220 |
| 1221 |
| 1222 |
| 1223 |
| 1224 |
| 1225 |
| 1226 |
| 1227 |
| 1228 |
| 1229 |
| 1230 |
| 1231 |
| 1232 |
| 1233 |
| 1234 |
| 1235 |
| 1236 |

|      |
|------|
| 1237 |
| 1238 |
| 1239 |
| 1240 |
| 1241 |
| 1242 |
| 1243 |
| 1244 |
| 1245 |
| 1246 |
| 1247 |
| 1248 |
| 1249 |
| 1250 |
| 1251 |
| 1252 |
| 1253 |
| 1254 |
| 1255 |
| 1256 |
| 1257 |
| 1258 |
| 1259 |
| 1260 |
| 1261 |
| 1262 |
| 1263 |
| 1264 |
| 1265 |
| 1266 |
| 1267 |
| 1268 |
| 1269 |
| 1270 |
| 1271 |
| 1272 |
| 1273 |
| 1274 |
| 1275 |
| 1276 |
| 1277 |
| 1278 |
| 1279 |
| 1280 |
| 1281 |
| 1282 |
| 1283 |
| 1284 |
| 1285 |
| 1286 |
| 1287 |
| 1288 |
| 1289 |
| 1290 |
| 1291 |
| 1292 |
| 1293 |
| 1294 |
| 1295 |
| 1296 |
| 1297 |
| 1298 |
| 1299 |
| 1300 |

|      |
|------|
| 1301 |
| 1302 |
| 1303 |
| 1304 |
| 1305 |
| 1306 |
| 1307 |
| 1308 |
| 1309 |
| 1310 |
| 1311 |
| 1312 |
| 1313 |
| 1314 |
| 1315 |
| 1316 |
| 1317 |
| 1318 |
| 1319 |
| 1320 |
| 1321 |
| 1322 |
| 1323 |
| 1324 |
| 1325 |
| 1326 |
| 1327 |
| 1328 |
| 1329 |
| 1330 |
| 1331 |
| 1332 |
| 1333 |
| 1334 |
| 1335 |
| 1336 |
| 1337 |
| 1338 |
| 1339 |
| 1340 |
| 1341 |
| 1342 |
| 1343 |
| 1344 |
| 1345 |
| 1346 |
| 1347 |
| 1348 |
| 1349 |
| 1350 |
| 1351 |
| 1352 |
| 1353 |
| 1354 |
| 1355 |
| 1356 |
| 1357 |
| 1358 |
| 1359 |
| 1360 |
| 1361 |
| 1362 |
| 1363 |
| 1364 |

|      |
|------|
| 1365 |
| 1366 |
| 1367 |
| 1368 |
| 1369 |
| 1370 |
| 1371 |
| 1372 |
| 1373 |
| 1374 |
| 1375 |
| 1376 |
| 1377 |
| 1378 |
| 1379 |
| 1380 |
| 1381 |
| 1382 |
| 1383 |
| 1384 |
| 1385 |
| 1386 |
| 1387 |
| 1388 |
| 1389 |
| 1390 |
| 1391 |
| 1392 |
| 1393 |
| 1394 |
| 1395 |
| 1396 |
| 1397 |
| 1398 |
| 1399 |
| 1400 |
| 1401 |
| 1402 |
| 1403 |
| 1404 |
| 1405 |
| 1406 |
| 1407 |
| 1408 |
| 1409 |
| 1410 |
| 1411 |
| 1412 |
| 1413 |
| 1414 |
| 1415 |
| 1416 |
| 1417 |
| 1418 |
| 1419 |
| 1420 |
| 1421 |
| 1422 |
| 1423 |
| 1424 |
| 1425 |
| 1426 |
| 1427 |
| 1428 |

|      |
|------|
| 1429 |
| 1430 |
| 1431 |
| 1432 |
| 1433 |
| 1434 |
| 1435 |
| 1436 |
| 1437 |
| 1438 |
| 1439 |
| 1440 |
| 1441 |
| 1442 |
| 1443 |
| 1444 |
| 1445 |
| 1446 |
| 1447 |
| 1448 |
| 1449 |
| 1450 |
| 1451 |
| 1452 |
| 1453 |
| 1454 |
| 1455 |
| 1456 |
| 1457 |
| 1458 |
| 1459 |
| 1460 |
| 1461 |
| 1462 |
| 1463 |
| 1464 |
| 1465 |
| 1466 |
| 1467 |
| 1468 |
| 1469 |
| 1470 |
| 1471 |
| 1472 |
| 1473 |
| 1474 |
| 1475 |
| 1476 |
| 1477 |
| 1478 |
| 1479 |
| 1480 |
| 1481 |
| 1482 |
| 1483 |
| 1484 |
| 1485 |
| 1486 |
| 1487 |
| 1488 |
| 1489 |
| 1490 |
| 1491 |
| 1492 |

|      |
|------|
| 1493 |
| 1494 |
| 1495 |
| 1496 |
| 1497 |
| 1498 |
| 1499 |
| 1500 |
| 1501 |
| 1502 |
| 1503 |
| 1504 |
| 1505 |
| 1506 |
| 1507 |
| 1508 |
| 1509 |
| 1510 |
| 1511 |
| 1512 |
| 1513 |
| 1514 |
| 1515 |
| 1516 |
| 1517 |
| 1518 |
| 1519 |
| 1520 |
| 1521 |
| 1522 |
| 1523 |
| 1524 |
| 1525 |
| 1526 |
| 1527 |
| 1528 |
| 1529 |
| 1530 |
| 1531 |
| 1532 |
| 1533 |
| 1534 |
| 1535 |
| 1536 |
| 1537 |
| 1538 |
| 1539 |
| 1540 |
| 1541 |
| 1542 |
| 1543 |
| 1544 |
| 1545 |
| 1546 |
| 1547 |
| 1548 |
| 1549 |
| 1550 |
| 1551 |
| 1552 |
| 1553 |
| 1554 |
| 1555 |
| 1556 |

|      |
|------|
| 1557 |
| 1558 |
| 1559 |
| 1560 |
| 1561 |
| 1562 |
| 1563 |
| 1564 |
| 1565 |
| 1566 |
| 1567 |
| 1568 |
| 1569 |
| 1570 |
| 1571 |
| 1572 |
| 1573 |
| 1574 |
| 1575 |
| 1576 |
| 1577 |
| 1578 |
| 1579 |
| 1580 |
| 1581 |
| 1582 |
| 1583 |
| 1584 |
| 1585 |
| 1586 |
| 1587 |
| 1588 |
| 1589 |
| 1590 |
| 1591 |
| 1592 |
| 1593 |
| 1594 |
| 1595 |
| 1596 |
| 1597 |
| 1598 |
| 1599 |
| 1600 |
| 1601 |
| 1602 |
| 1603 |
| 1604 |
| 1605 |
| 1606 |
| 1607 |
| 1608 |
| 1609 |
| 1610 |
| 1611 |
| 1612 |
| 1613 |
| 1614 |
| 1615 |
| 1616 |
| 1617 |
| 1618 |
| 1619 |
| 1620 |

|      |
|------|
| 1621 |
| 1622 |
| 1623 |
| 1624 |
| 1625 |
| 1626 |
| 1627 |
| 1628 |
| 1629 |
| 1630 |
| 1631 |
| 1632 |
| 1633 |
| 1634 |
| 1635 |
| 1636 |
| 1637 |
| 1638 |
| 1639 |
| 1640 |
| 1641 |
| 1642 |
| 1643 |
| 1644 |
| 1645 |
| 1646 |
| 1647 |
| 1648 |
| 1649 |
| 1650 |
| 1651 |
| 1652 |
| 1653 |
| 1654 |
| 1655 |
| 1656 |
| 1657 |
| 1658 |
| 1659 |
| 1660 |
| 1661 |
| 1662 |
| 1663 |
| 1664 |
| 1665 |
| 1666 |
| 1667 |
| 1668 |
| 1669 |
| 1670 |
| 1671 |
| 1672 |
| 1673 |
| 1674 |
| 1675 |
| 1676 |
| 1677 |
| 1678 |
| 1679 |
| 1680 |
| 1681 |
| 1682 |
| 1683 |
| 1684 |

|      |
|------|
| 1685 |
| 1686 |
| 1687 |
| 1688 |
| 1689 |
| 1690 |
| 1691 |
| 1692 |
| 1693 |
| 1694 |
| 1695 |
| 1696 |
| 1697 |
| 1698 |
| 1699 |
| 1700 |
| 1701 |
| 1702 |
| 1703 |
| 1704 |
| 1705 |
| 1706 |
| 1707 |
| 1708 |
| 1709 |
| 1710 |
| 1711 |
| 1712 |
| 1713 |
| 1714 |
| 1715 |
| 1716 |
| 1717 |
| 1718 |
| 1719 |
| 1720 |
| 1721 |
| 1722 |
| 1723 |
| 1724 |
| 1725 |
| 1726 |
| 1727 |
| 1728 |
| 1729 |
| 1730 |
| 1731 |
| 1732 |
| 1733 |
| 1734 |
| 1735 |
| 1736 |
| 1737 |
| 1738 |
| 1739 |
| 1740 |
| 1741 |
| 1742 |
| 1743 |
| 1744 |
| 1745 |
| 1746 |
| 1747 |
| 1748 |

|      |
|------|
| 1749 |
| 1750 |
| 1751 |
| 1752 |
| 1753 |
| 1754 |
| 1755 |
| 1756 |
| 1757 |
| 1758 |
| 1759 |
| 1760 |
| 1761 |
| 1762 |
| 1763 |
| 1764 |
| 1765 |
| 1766 |
| 1767 |
| 1768 |
| 1769 |
| 1770 |
| 1771 |
| 1772 |
| 1773 |
| 1774 |
| 1775 |
| 1776 |
| 1777 |
| 1778 |
| 1779 |
| 1780 |
| 1781 |
| 1782 |
| 1783 |
| 1784 |
| 1785 |
| 1786 |
| 1787 |
| 1788 |
| 1789 |
| 1790 |
| 1791 |
| 1792 |
| 1793 |
| 1794 |
| 1795 |