

Nr crt	DCI	DC	INDICAȚIE	Stadiu
1	Regorafenibum	Stivarga	Tratamentul adulților cu neoplasm colorectal (NCR) metastatic cărora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe baza de fluoropirimidina, un tratament anti-VEGF și un tratament anti EGFR	Finalizat
2	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de monoterapie dacă dieta și exercitiile fizice nu asigură un control corespunzător al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminului nu este adecvată din cauza intoleranței sau tratament adjuvant asociat în asociere cu alte medicamente care scad concentrația plasmatică de glucoză, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercitiile fizice, nu asigură un control glicemic corespunzător.	Finalizat
3	Vildagliptinum	Galvus	Vildaglipton este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la adulți: În monoterapie - la pacienți cu control adecvat numai prin regim alimentar și exerciții și pentru care metformina nu este recomandată datorită contraindicațiilor sau intoleranței. Ca tratament oral dublu, în asociere cu - metformina, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerate de metformina în monoterapie, - o sulfoniluree, la pacienții cu control glicemic insuficient în pofida administrării dozei maxime tolerate de sulfoniluree și pentru care tratamentul cu metformina este recomandabil din cauza contraindicațiilor sau intoleranței, - o tiazolidindionă, la pacienții cu control glicemic insuficient și la care este indicată utilizarea unei tiazolidindione. Ca tratament oral triplu, în asociere cu - o sulfoniluree și o metformina când exercitiile fizice împreună cu tratamentul dual cu aceste medicamente nu asigură un control glicemic adecvat. Vildagliptin este, de asemenea, indicată pentru administrarea în asociere cu insulina (cu sau fără metformina) când regimul alimentar și exercitiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
4	Saxagliptinum	Onglyza 2,5mg și 5mg	Onglyza este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia asociere cu alte medicamente antidiabetice orale (ADO), dubla în asociere cu metformin, atunci când monoterapia cu metformin, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, o sulfoniluree, atunci când monoterapia cu sulfoniluree, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care administrarea de metformin este considerată inadecvată, o tiazolidindionă, atunci când monoterapia cu tiazolidindionă, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei, la pacienții la care administrarea unei tiazolidindione este considerată adecvată, în terapia orală triplă în asociere cu metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exerciții fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
5	Ustekinumabum	Stelara	Stelara este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen și ultraviolete A).	Finalizat

6	Riociguat	Adempas	Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv.	Finalizat
7	Febuxostatium	Adenuric	Tratamentul Hiperuricemiei cronice in bolile in care depunerea de urati a avut deja loc (inclusiv toful gutos si/sau artrita gutoasa in antecedente sau in prezent). Adenuric este indicat pentru adulti.	Finalizat
8	Belimumab	Benlysta	Benlysta este indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacientii adulti cu lupus eritematos sistemis (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad inalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi si complement seric scazut) in ciuda terapiei standard.	Finalizat
9	Bromura de aclidinium	Bretaris Genuair 322micrograme	Tratament bronhodilatator de mentinere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacientii adulti.	Finalizat
10	Certolizumab Pegol	Cimzia 200mg	Artrita psoriazica. Cimzia, in asociere cu MTX, este indicat in tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie in cazul intolerantei la metotrexat sau cand continuarea tratamentului cu metotrexat este inadecvata. Tratamentul artritei psoriazice active la adulti cand raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evolutiei bolii a fost inadecvat.	Finalizat
11	Duodart (Dutasterida + Clorhidrat de Tamsulosin)	Duodart	Tratamentul simptomelor moderate pana la severe ale hiperplaziei benigne de prostata (HBP). Reducerea riscului de retentie acuta de urina (RAU) si a necesitatii interventiilor chirurgicale la pacientii cu simptome moderate pana la severe de HBP.	Finalizat
12	Degarelix	Firmagon	Firmagon este un antagonist al hormonului eliberator de gonadotropina (GnRH) indicat pentru tratamentul pacientilor adulti de sex masculin cu cancer de prostata hormono-dependent in stadiu avansat.	Finalizat

13	Ulipristal Acetat	Esmya	Tratamentul preoperator al simptomelor moderate pana la severe ale fibroamelor uterine la femeile adulte aflate la varsta fertila.	Finalizat
14	Ethionamidum	Etionamida ATB	Medicament tuberculostatic de linia a II la pacientii cu rezistenta la medicatia antituberculoasa de linia I.	Finalizat
15	Carboximaltoza ferica	Ferinject	Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei asociate cu insuficienta renala cronica pentru pacientii in predializa.	Finalizat
16	Carboximaltoza ferica	Ferinject	Tratamentul carentei de fer cand preparatele de fer orale nu sunt eficiente sau nu pot fi utilizate; Tratamentul anemiei prin deficit de fier asociate bolilor inflamatorii intestinale.	Finalizat
17	Denosumab	Xgeva	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.	Finalizat
18	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic, sub forma de monoterapie daca dieta si exercitiile fizice nu asigura un control coresanzator al glicemiei la pacienti la care utilizarea metforminului nu este adecvata din cauza intolerantei.	Finalizat
19	Dipropinat de beclometazona anhidru / fumarat de formoterol dihidrat	Foster	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbari repetate la pacienti care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
20	Lantanum	Fosrenol	Fosrenol este indicat, de asemenea, pacienților adulți cu boală renală cronică , nedializați, având nivelul concentrației plasmatice de fosfat $\geq 1,78$ mmol/L, la care exclusiv dieta săracă în fosfat este insuficientă pentru a controla nivelul fosfaților.	Finalizat
21	Everolimus	Afinitor	Cancer mamar in stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenti, cu HER2/neu negativ, administrat in combinatie cu exemestane, la femeile in postmenopauza, fara boala viscerală simptomatica, dupa recurenta sau progresia bolii in urma administrării unui inhibitor de aromataza non-steroidal.	Finalizat
22	Everolimus	Afinitor	Carcinom celular renal avansat, care au inregistrat progresie a bolii la sau in urma tratamentului cu terapie tintita asupra FCEV (factor de crestere endoteliala vasculara).	Finalizat
23	Eplerenona	Inspra	In asociere cu tratamentul standard optim pentru scaderea riscului mortalitatii si morbiditatii cardiovasculare la pacienti adulti cu insuficienta cardiaca (cronica) clasa II NYHA si disfunctie ventriculara stanga (FEVS $\leq$ 30%).	Finalizat
24	Canagliflozin	Invokana	Invokana este indicat la dulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru imbunatatirea controlului glicemic fiind administrat ca monoterapie (in cazul in care doar prin dieta si exercitii fizice nu se obtine un control glicemic adecvat la pacientii la care utilizarea de metformin este inadecvata datorita intolerantei sau contraindicatiilor) sau terapie adjuvanta (terapie adjuvanta la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci cand acestea, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control glicemic adecvat).	Finalizat
25	Everolimus	Afinitor	Tumori neuroendocrine, nerezectabile sau metastatice, bine sau moderat diferite, de origine pancreatica, la adulti cu boala progresiva.	Finalizat
26	Gefitinibum	Iressa	Iressa este indicata pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozininkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR TK (linia all-a).	Finalizat
27	Gefitinibum	Iressa	Tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC -non small cell lung cancer), avansat loco-regional sau metastatic, ale caror tumori exprima mutatii ale tirozininkinazei receptorului factorului de crestere epidermal uman EGFR TK.	Finalizat
28	Alemtuzumab	Lemtrada	Pacientii adulti cu scleroza multipla recurent-remisiva (SMRR), cu boala activa, definita prin caracteristici clinice sau imagistice.	Finalizat
29	Minocyclinum	Minoz MR	Tratamentul acneei	Finalizat
30	Fotemustinum	Mustophoran	Melanom malign diseminat cu metastaze cerebrale	Finalizat
31	Rotigotinum	Neupro	Tratamentul simptomatic al sindromului picioarelor nelinistite idiopatic, moderat pana la sever	Finalizat
32	Nepafenac	Nevanac	Prevenirea si tratamentul durerilor si inflamatiilor postoperatorii asociate cu operatia de cataracta.	Finalizat

33	Simeprevirum	Olysio	Olysio, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.	Finalizat
34	Tapentadolum	Palexia	Palexia retard este indicat la adulti pentru abordarea terapeutica a durerilor cronice severe care pot fi tratate adecvat numai cu analgezice opioide.	Finalizat
35	Dabigatran Etexilat	Pradaxa	Preventia accidentelor vasculare cerebrale si a emboliei sistemice la pacienti adulti cu fibrilatie atriala non-valvulara (FANV) ce prezinta unul sau mai multi dintre urmatoorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral, atac ischemic tranzitoriu (AIT), varsta ≥ 75 ani, insuficienta cardiaca (NYHA $\geq$ II), diabet zaharat, hipertensiune arteriala.	Finalizat
36	Perindopril argininum + Amlodipinum	Prestance	Hipertensiune arteriala	Finalizat
37	Perindopril argininum + Amlodipinum	Prestance	Boala coronariana stabila	Finalizat
38	Denosumab	Prolia	Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.	Finalizat
39	Furoat de fluticazona/vilanterol	Relvar Elipta	Relvar Elipta este indicat in tratamentul regulat la astmul bronhic la adulti si adolescenti cu varsta de 12 ani si peste, la care este adecvata utilizarea unui medicament combinat (beta ₂ agonisti cu durata lunga de actiune si corticosteroizi cu administrare inhalatorie): Pacienti la care nu se obtine un control adecvat prin terapia cu corticosteroizi cu administrare inhalatorie si beta ₂ agonisti cu durata scurta de actiune cu administrare inhalatorie, utilizata la nevoie.	Finalizat
40	Fluticazona/ Vilanterol	Relvar Elipta	Relvar Elipta este indicat in tratamentul simptomatic al adulților cu BPOC cu VEMS <70% din valoarea predictibilă normală (post-bronhodilatator) și cu un istoric de exacerbări, în ciuda administrării regulate a unei terapii bronhodilatatoare.	Finalizat
41	Agalsidasum alfa	Replagal	Replagal este indicat pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiență de α -galactosidază A).	Finalizat
42	Eltrombopag olamina	Revolade	Revolade este indicat pentru tratamentul adulților cu infecție cu virusul hepatic C (VHC) pentru tratamentul trombocitopeniei, în situațiile în care gradul de trombocitopenie este factorul principal care împiedică inițierea sau limitează posibilitatea menținerii unei terapii optime pe baza de interferon.	Finalizat
43	Bendamustinum	Ribovact	Tratament de prima linie în Leucemia Limfatică Cronică(LLC), Binet stadiul B sau C, la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabina.	Finalizat
44	Bendamustinum	Ribovact	Tratament de prima linie în mielomul multiplu(MM), Durie-Salmon stadiul II cu progresie sau stadiul III, în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomida sau bortezomib.	Finalizat
45	Conestat Alfa	Ruconest	Ruconest este indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adulții cu angioedem eredită (AEE) cauzat de deficitul de inhibitor al C1-esterazei.	Finalizat
46	Tafuprostum	Saflutan	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții adulți cu vârsta ≥ 18 ani cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: - care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți - care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie - care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante.	Finalizat
47	Nalmefen	Selincro	Reducerea consumului de alcool la pacienții adulți cu dependența de alcool și care au un risc crescut de consum de alcool, fara simptome somatice de sevraj și care nu necesita in mod imediat tratament detoxifiant	Finalizat
48	Bedaquilinum	Sirturo	Sirturo este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.	Finalizat
49	Ustekinumabum	Stelara	Stelara, in monoterapie sau in asociere cu MTX este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu artrita psoriazica activa care au avut un raspuns insuficient la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice non-biologice modifcatoare ale evolutiei bolii (MARMB).	Finalizat
50	Lapatinib	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm mamar, ale caror tumori exprima HER2 (ErbB2) in exces in asociere cu trastuzumab, la pacienti cu boala metastatica cu receptori hormonal absent, progresiva in urma unor terapii anterioare ce trastuzumab in combinatie cu chimioterapie.	Finalizat
51	Regorafenibum	Stivarga	Stivarga este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu tumori stromale gastro-intestinale (GIST-Gastrointestinal stromal tumor) nerezectabil sau metastatice care au progresat sau care nu au tolerat tratamentul anterior cu imatinib si sunitinib.	Finalizat

52	Oxycodonom/Naloxonom	Targin	Dureri severe, care pot fi tratate in mod adecvat numai cu analgezice opioide. Naloxona, antagonist opioid este adaugata pentru a contracara constipatia indusa de opioide prin antagonizarea actiunii oxycodonei la nivelul receptorilor opioizi locali, in intestin.	Finalizat
53	Imunoglobulina Anti-Limfocite	Thymoglobuline	Tratamentul anemiei aplastice	Finalizat
54	Fesoterodina	Toviaz	Tratamentul simptomelor (polakiurie si/sau mictiuni imperioase si/sau incontinenta imperioasa) care pot surveni la pacientii adulti cu sindrom de vezica hiperactiva.	Finalizat
55	Atosiban	Tractocile	Tractocile este indicat pentru intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte cu: • contractii uterine regulate, cu durata de cel putin 30 secunde, cu o frecventa de ≥ 4 si 30 minute; • dilatație cervicala de 1 pana la 3 cm (0-3 cm la nulipare) si stergere a colului uterin de $\geq 50\%$; • varsta ≥ 18 ani; • varsta sarcinii cuprinsa intre 24 si 33 de saptamani complete; • frecventa normala a batailor cardiace fetale. Intarzierea iminentei de nastere prematura la gravidele adulte.	Finalizat
56	Telmisartan+Amlodipna	Twynsta	Tratamentul hipertensiunii arteriale esentiale la adulti. Terapie de asociere. Indicata la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu amlodipina. Terapie de substitutie. Pacientilor adulti la care tensiunea arteriala esentiala este controlata adecvat si carora li se administreaza telmisartan si amlodipina sub forma de monoterapie li se pot administra in schimb comprimate de Twynsta care contin in compozitie aceleasi doze	Finalizat
57	Agomelatinum	Valdoxan	Tratamentul episoadelor depresive majore la adulti	Finalizat
58	Silodosin	Urorec 4mg/8mg	Tratamentul semnelor si simptomelor hiperplaziei prostatice benigne (HPB) pentru grupurile speciale de pacienti, cu insuficienta renala si hepatica.	Finalizat
59	Cilostazol	Velyn	Claudicație intermitenta fara semne de necroza a tesutului periferic (boala arteriala periferica stadiul II Fontaine)	Finalizat
60	Lacosamidum	Vimpat	Vimpat este indicat ca terapie adjuvanta in tratamentul crizelor convulsive partiale, cu sau fara generalizare secundara, la pacientii adulti si adolescenti (16-18 ani) cu epilepsie.	Finalizat
61	Paliperidonum Palmitat	Xeplion	XEPLION este indicat in tratamentul de intretinere al schizofreniei la apacientii adulti stabilizati cu paliperidona sau risperidona. La pacientii adulti selectati cu schizofrenie si care au raspuns anterior la administrarea orala a paliperidonei sau risperidonei, se poate administra XEPLION fara stabilizare anterioara cu un tratament pe cale orala daca simptomele psihotice sunt usoare pana la moderate si este necesar un tratament injectabil cu eliberare prelungita.	Finalizat
62	Trastuzumabum	Herceptin	Trastuzumabum (Herceptin) in asociere cu capecitabina sau 5-fluorouracil si cisplatina este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu adenocarcinom gastric metastatic HER2 pozitiv sau a jonctiunii gastroesofagiene, carora nu li s-a administrat anterior tratament impotriva cancerului pentru boala lor metastatica.	Finalizat
63	Vismodegib	Erivedge	Erivedge este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu: carcinom bazocelular metastatic simptomatic sau carcinom bazocelular avansat local, inadecvat pentru interventie chirurgicala sau radioterapie.	Finalizat
64	Abirateronum	Zytiga	Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbatii adulti care sunt asimptomatici sau usor simptomatici dupa esecul terapiei de privare de androgeni si la care chimioterapia nu este inca indicata din punct de vedere clinic.	Finalizat
65	Furoat de fluticazona	Avamys	Avamys este indicat pentru tratamentul simptomelor rinitei alergice. Avamys este indicat la adulti, adolescenti si copii (cu varsta de 6 ani peste).	Finalizat
66	Bosutinib	Bosulif	Bosulif este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu leucemie mieloida cronica cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) in faza cronica (FC), faza accelerata (FA) sau faza blastica (FB), tratati anterior cu unul sau mai multi inhibitori de tirozinkinaza si la care administrarea de imatinib, nilotinib si dasatinib nu este considerata o optiune terapeutica adecvata.	Finalizat
67	Toxina botulinica	Dysport	Ca medicație adjuvantă fizioterapiei, pentru reducerea spast icității membrului superior, apărută ca urmare a unui accident vascular cerebral -prezentând astfel un beneficiu semnificativ pentru pacientul adult.	Finalizat
68	Dalteparin	Fragmin	Tratamentul de durata al tromboemboliei venoase simptomatice (TEV) pentru prevenirea recurenței TEV la pacientii cu cancer	Finalizat
69	Bevacizumabum	Avastin	Neoplasm ovarian epitelial, neoplasm de trompe uterine si neoplasm peritoneal primar.	Finalizat
70	Fenilbutirat de Sodiu	Ammonaps	Ammonaps este indicat ca adjuvant in tratamentul cronic al tulburarilor de ciclu ureic, incluzand deficienta de carbamil-fosfat-sinteza, ornitin-transcarbamilaza sau argininosuccinat-sinteza.	Finalizat
71	Ofatumumab	Arzerra	Arzerra, in asociere cu clorambucil sau bendamustina, este indicat in tratamentul pacientilor cu LLC care nu au primit tratament anterior si care nu sunt eligibili pentru tratamentul pe baza de fludarabina.	Finalizat

72	Teriflunomidum	Aubagio	Este indicat la adulti, pentru tratamentul pacientilor cu scleroza multipla recurent-remisiva.	Finalizat
73	Cabazitaxelum	Jevtana	Jevtana este indicat, in asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacientilor cu cancer de prostata metastazat hormono-rezistent, tratati anterior dupa o schema de tratament continand docetaxel.	Finalizat
74	Bilastinum	Borenar	Tratamentul simptomatic al rinoconjunctivitei alergice (sezoniere si perene).	Finalizat
75	Bilastinum	Borenar	Tratamentul simptomatic al urticariei.	Finalizat
76	Combinatii (Candesartan cilexetil+Amlodipin)	Caramlo	Terapie de substitutie la pacientii adulti cu hipertensiune arterială esențială a căror tensiune arterială este controlată adecvat cu amlodipină și candesartan administrate concomitent în aceleași doze	Finalizat
77	Bisoprololum + Amlodipinum	Concor AM	Concor AM este indicat pentru tratamentul hipertensiunii arteriale ca terapie de substitutie pentru pacientii la care s-au administrat separat medicamentele individuale in acelasi regim de dozaj ca si in combinatie.	Finalizat
78	Ivabradinum	Corlentor	Tratamentul insuficientei cardiace cronice. Ivabradina este indicata in insuficienta cardiaca cronica clasa II-IV NYHA cu disfuncție sistolică, la pacienti in ritm sinusal si a caror frecventa cardiaca este ≥ 75 bpm, in asociere cu terapie standard incluzand beta-blocante sau atunci cand tratamentul cu beta-blocante este contraindicat sau nu este tolerat.	Finalizat
79	Toxina botulinica	Dysport	Torticolis spastic/distonie cervicala (adulti)	Finalizat
80	Toxina botulinica	Dysport	Paralizii spastice la copii cu varsta de doi ani sau peste, cu infirmitate motorie cerebrala cum este deformarea dinamica, datorata spasticitatii - picior equin	Finalizat
81	Lapatinibum	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces: în asociere cu trastuzumab, la pacienții cu boală metastatică cu receptori hormonal absentți, progresivă în urma unor terapii anterioare cu trastuzumab în combinație cu chimioterapie	Finalizat
82	Conestat alfa	Ruconest	Episoade acute de angioedem la adulții cu angioedem ereditar (aee) datorat deficitului de inhibitor al c1-esterazei	Finalizat
83	Dabigatran Etexilat	Pradaxa	Prevenția primară a evenimentelor tromboembolice venoase la pacienții adulți care au suferit o intervenție chirurgicală electivă de înlocuire completă de sold sau o intervenție chirurgicală de înlocuire completă a genunchiului.	Finalizat
84	Afliberceptum	Zaltrap	Zaltrap in asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulti cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat dupa o schema de tratament pe baza de oxaliplatină.	Finalizat
85	Candesartanum Cilexetil + HCT	Canzeno HCT 8mg/12.5mg	Tratamentul hipertensiunii esențiale insuficient controlată prin monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazida.	Finalizat
86	Sitagliptinum + Metforminum	Janumet	Pentru pacientii adulti cu diabet zaharat de tip 2, Janumet este indicat: ●ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic, la pacientii controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin in monoterapie sau la cei care au fost deja tratati cu asocierea dintre sitagliptin si metformin. ●sub forma de terapie tripla in asociere cu o sulfoniluree ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacienti controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si o sulfoniluree. ● sub forma de terapie tripla, in asociere cu un agonist al receptorilor gama activati de proliferatorul peroxizomilor (PPAPy) (adica, o tiazolidindionă) ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, la pacienti controlati inadecvat cu doza maxima tolerata de metformin si un agonist PPARY. ● sub forma de terapie adaugata tratamentului cu insulina (terapie tripla), ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic, pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacienti la care doza stabilita de insulina si metformin in monoterapie nu realizeaza un control glicemic adecvat.	Finalizat
87	Saxagliptinum + Metforminum	Komboglyze	Komboglyze este indicat in asociere cu o sulfoniluree (de exemplu terapie combinata tripla (cu ADO)). Ca adjuvant la dieta si exercitiu fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci cand doza maxima tolerata de metformin si sulfoniluree nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat
88	Saxagliptinum	Onglyza 2,5mg si 5mg	Onglyza este indicat la pacientii adulti cu varsta de 18 ani si peste cu diabet zaharat de tip 2, in scopul imbunatatirii controlului glicemic in terapia combinata, in asociere cu insulina (cu sau fara metformin), cand acest tratament, impreuna cu dieta si exercitiile fizice, nu asigura un control adecvat al glicemiei.	Finalizat

89	Epoetinum Zeta	Retacrit	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficienței renale cronice (IRC) la pacienții adulți, adolescenți și copii: - Tratamentul anemiei asociate cu insuficiența renală cronică la pacienții adulți, copii și adolescenți supuși hemodializei și la pacienții adulți supuși dializei peritoneale. - Tratamentul anemiei simptomatice severe de etiologie renală la pacienții adulți cu insuficiența renală care nu sunt încă supuși dializei.	Finalizat
90	Epoetinum Zeta	Retacrit	Retacrit poate fi folosit pentru creșterea disponibilității de sânge autolog la pacienții încadrați într-un program de pre-donare. Decizia utilizării în această indicație trebuie cântărită și în funcție de riscul raportat de evenimente tromboembolice. Tratamentul trebuie administrat numai pacienților cu anemie moderată (fără deficit de fier) dacă procedurile de conservare a sângelui nu sunt disponibile sau sunt insuficiente atunci când intervențiile chirurgicale electivă majore planificate necesită volume mari de sânge (4 sau mai multe unități de sânge pentru femei sau 5 sau mai multe unități pentru bărbați).	Finalizat
91	Epoetinum Zeta	Retacrit	Tratamentul anemiei și reducerea nevoilor transfuzionale la pacienții adulți tratați prin chimioterapie pentru tumori solide, limfoame maligne sau mielome multiple, și care prezintă risc la primirea transfuziei, după cum indică starea generală a pacientului (de exemplu: statusul cardiovascular, anemia preexistentă la începutul tratamentului prin chimioterapie).	Finalizat
92	Epoetinum Zeta	Retacrit	Retacrit poate fi folosit pentru reducerea expunerii la transfuzii de sânge alogene la pacienții adulți fără deficit de fier, înaintea intervențiilor chirurgicale ortopedice electivă majore, care au un risc potențial crescut de a prezenta complicații ale transfuziei. Utilizarea trebuie limitată la pacienții cu anemie moderată (de exemplu Hb 10-13 g/dl) care nu sunt încadrați într-un program de pre-donare de sânge autolog și la care se așteaptă pierderi de sânge moderate (900-1 800 ml).	Finalizat
93	Naproxenum + Esomeprazolum		Tratamentul simptomatic al osteoartritei, poliartritei reumatoide și spondilitei anchilozate la pacienții cu risc de apariție a ulcerului gastric și/sau duodenal ca urmare a administrării medicamentelor antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) și atunci când tratamentul cu doze mai mici de naproxen sau alte AINS este considerat insuficient.	Finalizat
94	Candesartanum Cilexetil + HCT	Canzeno HCT 16mg/12.5mg	Tratamentul hipertensiunii esențiale insuficient controlată prin monoterapia cu candesartan cilexetil sau hidroclorotiazidă.	Finalizat
95	Rilpivirinum	Edurant	Edurant, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții adulți netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1 ≤100000 copii/ml.	Finalizat
96	Lantanum	Fosrenol	Fosrenol este indicat la pacienții adulți ca agent de fixare a fosfatului utilizat pentru controlul hiperfosfatemiei la pacienții cu insuficiență renală cronică supuși hemodializei sau dializei peritoneale continue ambulatorii (DPCA)	Finalizat
97	Fingolimod	Gilenya	Gilenya este indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroza multiplă recidivantă-remitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți: - Pacienți cu activitate intensă a bolii în ciuda tratamentului cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții în informații privind perioadele de eliminare completă. Acești pacienți pot fi definiți ca pacienți care nu au răspuns la un ciclu complet și adecvat (în mod normal, minim un an de tratament) cu cel puțin un tratament de modificare a bolii. Pacienții trebuie să fi avut minim 1 recidivă în anul anterior în timpul tratamentului sau să aibă cel puțin 9 leziuni T2-hiperintense la RMN-ul cranian sau minim 1 leziune ca captură de Gadolinium. Un astfel de pacient poate fi definit și ca pacient cu o rată nemodificată sau crescută de recidivă sau cu recidive curente severe, comparativ cu anul anterior; sau, Pacienți cu scleroza multiplă recidivantă-remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive debilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni ca captură de Gadolinium la RMN cranian sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	Finalizat
98	Saxagliptinum + Metformin	Komboglyze 1000mg	Tratamentul adjuvant la dietă și exercițiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2 inadecvat controlat cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie sau la cei care sunt deja tratați cu combinația de saxagliptin și metformin sub formă de comprimate separate; de asemenea, Komboglyze este indicat în asociere cu insulina (de exemplu terapie combinată cu triplă), ca adjuvant la dietă și exerciții fizice pentru îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, când insulina și metforminul nu asigură un control glicemic adecvat. De asemenea, Komboglyze este indicat în asociere cu o sulfonilură (de exemplu terapie combinată triplă), ca adjuvant la dietă și exerciții fizice pentru îmbunătățirea controlului glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, atunci când doza maximă tolerată de metformin și sulfonilură nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
99	Bromura de aclidiniu	Ekliira Genuair 322micrograme	Tratament bronhodilatator de menținere pentru ameliorarea simptomatologiei bronhopneumoniei obstructive cronice (BPOC) la pacienții adulți.	Finalizat

100	Methoxy polyethylene glycol-epoetin beta	Mircera	Tratamentul anemiei simptomatice asociate insuficienței renale cronice (IRC) la pacienți adulți.	Finalizat
101	Glicopironium	Seebri Breezhaler	Tratament bronhodilatator de întreținere, pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boala pulmonară obstructivă cronică (BPOC)	Finalizat
102	Rivaroxaban	Xarelto	Prevenirea tromboemboliei venoase (TEV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de elecție pentru substitutia soldului sau genunchiului (proteza totală a soldului sau genunchiului).	Finalizat
103	Perindopril + Amlodipina	Amlessa	Hipertensiunea arterială esențială și/sau boala coronariană stabilă.	Finalizat
104	Amlodipina + Valsartan + Hidroclorotiazida	Exforge HCT	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale ca terapie de substituție la pacienții adulți a căror tensiune arterială este controlată adecvat prin combinație cu amlodipina, valsartan și hidroclorotiazida (HCT), administrate fie ca trei formule cu un component, fie ca formule cu două sau un component.	Finalizat
105	Golimumab	Simponi	Tratamentul spondilitei anchilozate (SA) active, aflată în stadii severe, la adulți care au avut un răspuns inadecvat la terapia convențională.	Finalizat
106	Dolutegravir	Tivicay	Tivicay este indicat în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale destinate tratamentului infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus-HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani.	Finalizat
107	Tenofovir disoproxil	Viread	Viread 245 mg comprimate filmate este indicat în tratamentul hepatitei B cronice la adulți cu: ● boala hepatică compensată, cu dovezi de replicare virală activă, concentrație serică a alaninaminotransferazei (ALT/TGP) persistent crescută și dovada histologică a inflamației active și/sau fibrozei. ● dovezi privind prezența virusului hepatic B rezistent la lamivudina. ● boala hepatică decompensată.	Finalizat
108	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului sau genunchiului.	Finalizat
109	Brinzolamida/Timolol	Azarga	Scaderea presiunii intraoculare (PIO) la pacienți adulți cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune intraoculară la care monoterapia determină reducerea insuficientă a PIO.	Finalizat
110	Certolizumab Pegol	Cimzia	Artrita reumatoidă. Cimzia, în asociere cu metotrexatul (MTX), este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, moderată până la severă, la pacienții adulți, atunci când răspunsul la medicamentele antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, este inadecvat. Cimzia poate fi administrat în monoterapie în caz de intoleranță la metotrexat sau atunci când tratamentul continuu cu metotrexat este inadecvat. S-a demonstrat că Cimzia reduce rata progresiei distrucției articulare evidențiată radiologic și ameliorează funcționalitatea articulare, atunci când este administrat în asociere cu metotrexat.	Finalizat
111	Linagliptinum+Metforminum	Jentadueto	Tratamentul pacienților adulți cu diabet zaharat de tip 2 în combinație cu o sulfonilură (de exemplu tratament cu triplă combinație) ca un adjuvant la dieta și exerciții fizice la pacienții adulți la care controlul glicemiei nu se realizează adecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformină și sulfonilură	Finalizat
112	Aprepitant	Emend	Prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive asociate: ● chimioterapiei anticancerogene pe bază de cisplatina, cu potențial emetogen mare, la adulți. ● chimioterapiei anticancerogene cu potențial emetogen moderat, la adulți.	Finalizat
113	Afliberceptum	Eylea	Tratamentul afectării acuității vizuale determinate de edemul macular secundar occludiei venei centrale a retinei (OVCR)	Finalizat
114	Dipropinat de beclometazonă anhidru / fumarat de formoterol dihidrat	Foster	FOSTER este indicat în tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta-2 adrenergic cu durată lungă de acțiune) este adecvată: ● pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta-2 adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie sau ● pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta-2 adrenergic cu durată lungă de acțiune. A. Terapia de întreținere: FOSTER se administrează periodic, ca tratament de întreținere, care se poate asocia, la nevoie, cu un bronhodilatator cu durată scurtă de acțiune. B. Terapia de întreținere și de ameliorare a simptomelor: FOSTER se administrează periodic, ca tratament de întreținere, și, la nevoie, pentru controlul simptomatologiei.	Finalizat
115	Telaprevirum	Incivo	Incivo, în asociere cu peginterferon alfa și ribavirina, este indicat în tratamentul hepatitei cronice cu virus C, genotipul 1, la pacienții adulți cu boala hepatică compensată (inclusiv ciroza): - netratată anterior; - care au fost tratată anterior cu interferon alfa (pefilat sau nepefilat) în monoterapie sau în asociere cu ribavirina, inclusiv pacienții cu recădere, pacienții cu răspuns terapeutic parțial sau pacienții care nu au răspuns la tratament.	Finalizat

116	Axitinibum	Inlyta	Inlyta este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom renal în stadiu avansat (CCR) după eșecul tratamentului anterior cu sunitinib sau cu un medicament din clasa citokinelor.	Finalizat
117	Eltrombopag olamina	Revolade	Revolade este indicat pentru tratamentul adulților cu purpura trombocitopenică imună (idiopatică) (PTI) cronică splenectomizată care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline). Revolade poate fi luat în considerare în tratamentul de linia a doua a adulților nesplenectomizati pentru care tratamentul chirurgical este contraindicat.	Finalizat
118	Bendamustinum	Ribovact	Ca monoterapie în limfomul non-Hodgkin indolent la pacienții cu progresia bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schema terapeutică ce conține rituximab.	Finalizat
119	Lapatinib	Tyverb	Tyverb este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces în asociere cu un inhibitor de aromatază la femeile cu boală metastatică cu receptori hormonalți prezenți, aflate în postmenopauză, pentru care chimioterapia nu este indicată în prezent.	Finalizat
120	Dabrafenib	Tafinlar	Dabrafenib este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutația BRAF V600.	Finalizat
121	Apomorphinum	Dacepton	Tratamentul pentru inhibarea fluctuațiilor motorii la pacienții cu boala Parkinson, fluctuații care persistă chiar în condițiile administrării unui tratament titrat individual cu Levodopa și/sau alti agonisti ai dopaminei	Finalizat
122	Golimumab	Simponi	Colita ulcerativă (CU) activă aflată în stadii moderate până la severe, la pacienții adulți care au prezentat un răspuns inadecvat la terapia convențională, incluzând corticosteroizi, 6-mercaptapurina (6-MP) sau azatioprina (AZA), ori care prezintă intoleranță sau contraindicații pentru un astfel de tratament.	Finalizat
123	Linagliptinum	Trajenta 5 mg	Trajenta este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulți: Intr-o schema de terapie combinată- în combinație cu metformina, atunci când numai dieta și exercițiul fizic nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
124	Linagliptinum	Trajenta 5 mg	Trajenta este indicat în tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulți: Intr-o schema de terapie combinată- în combinație cu o sulfonilurée și metformina, atunci când numai dieta și exercițiul fizic împreună cu terapia asociată/duală a acestor două medicamente nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
125	Panitumumab	Vectibix	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezintă gena RAS de tip salvatic (non mutanta) în cadrul tratamentului de primă linie în asociere cu FOLFOX.	Finalizat
126	Panitumumab	Vectibix	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care prezintă gena RAS de tip salvatic (non mutanta) în cadrul tratamentului de primă linie în asociere cu FOLFOX.	Finalizat
127	Boceprevirum	Victrelis	Victrelis este indicat în tratamentul hepatitei cronice virale tip C (HCC), genotipul 1, în asociere cu peginterferon alfa și ribavirina, la pacienții adulți cu insuficiență hepatică compensată, la care nu s-a administrat tratament sau care nu au răspuns la tratamentele anterioare.	Finalizat
128	Pazopanib	Votrient	Votrient este indicat la adulți ca primă linie de tratament în carcinomul cu celule renale (CCR) în stadiu avansat și la pacienții la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala în stadiu avansat.	Finalizat
129	Pazopanib	Votrient	Votrient este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu subtipuri selectate de sarcom de țesuturi moi (STM) aflat în stadiu avansat cărora li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatică sau la care boala a progresat în decurs de 12 luni după terapia (neo) adjuvantă. Eficacitatea și siguranța au fost stabilite doar pentru anumite subtipuri histologice tumorale de STM.	Finalizat
130	Crizotinib	Xalkori	Xalkori este indicat pentru tratamentul adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv).	Finalizat
131	Rivaroxaban	Xarelto	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și a emboliei pulmonare (EP), și prevenirea recurenței TVP și a EP la adulți.	Finalizat
132	Rivaroxaban	Xarelto	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiența cardiacă congestivă, hipertensiunea arterială, vârsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accidentul vascular cerebral sau atacul ischemic tranzitoriu în antecedente.	Finalizat
133	Enzalutamida	Xtandi	Xtandi este indicat la bărbații adulți pentru tratamentul neoplasmului de prostată în stadiu metastatic rezistent la castrare, a căror boală a evoluat în timpul, sau după administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat

134	Certolizumab Pegol	Cimzia	Spondilartrita axiala. Cimzia este indicat in tratamentul pacientilor adulti cu spondilartrita axiala activa severa, incluzand: -Spondilita anchilozata (SA). Adulti cu spondilita anchilozata activa severa care au un raspuns inadecvat sau intoleranta la antiinflamatoare nesteroidiene (AINS). -Spondilartrita axiala fara dovada radiografica de SA. Adulti cu spondilartrita axiala activa severa fara dovada radiografica de SA, dar cu semne obiective de inflamatie manifestate prin proteina C reactiva (PCR) crescuta si/sau rezonanta magnetica nucleara (RMN), care au avut un raspuns inadecvat sau intoleranta la AINS.	Finalizat
135	Ticagrelor	Brillique	Ticagrelor, aadministrat in asociere cu acid acetilsalicilic, este indicat pentru preventia evenimentelor aterotrombotice la pacientii adulti cu sindrom coronarian acut (SCA) (angina instabila, infarct miocardic fara supradenivelare de segment ST sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST) atat pacientii tratati medical cat si cei tratati prin interventie coronariana percutanata (PCI) sau by-pass coronarian (CABG).	Finalizat
136	Prasugrelum	Efient	Prevenirea evenimentelor atero-trombotice la pacienti cu sindrom coronarian acut (adica, angina instabila, infarct miocardic fara supra-denivelare de segment ST [UA/NSTEMI], infarct miocardic cu supra-denivelare de segment ST [STEMI]) ce sufera o interventie coronariana per-cutanata (PTCA) primara sau amanata.	Finalizat
137	Golimumab	Simponi 50mg	Golimumab administrat singur sau in asociere cu MTX, este recomandat in tratamentul artritei psoriazice active si progresive, la adultii la care raspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare bolii (MARMB) a fost inadecvat. S-a demonstrat ca Simponi determina scaderea progresiei afectarii articulatiilor extremitatilor, masurata prin metode radiologice, la pacienti cu subtipurile poliarticulare simetrice ale afectiunii si amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat
138	Paliperidonum	Invega	Invega este indicat in tratamentul schizofreniei la adulti si adolescenti cu varsta de 15 ani si peste. Invega este indicat pentru tratamentul simptomelor psihotice sau maniacale din tulburarile schizoafective la adulti. Nu a fost demonstrat efectul asupra simptomelor depresive.	Finalizat
139	Abataceptum	Orencia (Jia)	Artrita idiopatica juvenila poliarticulara. Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul artritei idiopatice juvenile (AJ) poliarticulare active, forma moderata pana la severa, la copii si adolescenti cu varsta de 6 ani si peste, care au raspuns insuficient la alte MAMB, inclusiv cel putin un inhibitor TNF.	Finalizat
140	Ingenoli Mebutas	Picato	Tratamentul cutanat al Keratozei actinice non-hipertrofie non-hipercheratozice la adulti la nivelul trunchiului si extremitatilor.	Finalizat
141	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 20mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
142	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 40mg/5 mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
143	Olmesartanum + Amlodipinum	Sevikar 40mg/10mg	Hipertensiune arteriala esentiala la pacientii a caror tensiune arteriala nu este controlata adecvat cu olmesartan medoxomil sau amlodipina, administrate in monoterapie.	Finalizat
144	Golimumab	Simponi 50mg	Golimumab, in asociere cu metotrexat (MTX), este recomandat in: ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii moderate pana la severe, la adulti la care raspunsul la tratamentul cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), inclusiv metotrexat, a fost inadecvat. ●Tratamentul poliartritei reumatoide active aflate in stadii severe, la adultii care nu au fost tratati anterior cu MTX. S-a demonstrat faptul ca Golimumab, in combinatie c u MTX, reduce rata de progresie a leziunilor distructive de la nivel articular, conform determinarilor radiologice si ca amelioreaza capacitatea fizica.	Finalizat
145	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea accidentului vascular cerebral si a emboliei sistemice la pacienti adulti cu fibrilatie atriala nonvalvulara (FANV) cu unul sau mai multi factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) in antecedente; varsta ≥ 75 ani; hipertensiune arteriala; diabet zaharat; insuficienta cardiaca simptomatice (clasa NYHA≥II).	Finalizat
146	Indacaterolum	Onbrez Breezhaler	Onbrez Breezhaler este indicat pentru tratamentul bronhodilatator de intretinere al obstructiei cailor respiratorii la pacienti adulti cu boala pulmonara obstructiva cronica (BPOC).	Finalizat
147	Abataceptum	Orencia (1st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorală (TNF)-alfa.	Finalizat

148	Vildagliptinum + Metforminum	Eucreas	Eucreas este indicat in tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat on tratamentul pacientilor adulti care nu pot obtine un control glicemic suficient la doza maxima tolerata de motformina administrata oral in monoterapie sau care sunt tratati deja cu o asociere de vildagliptin si metformina sub o forma de comprimate separate. - Eucreas este indicat in combinatie cu o sulfoniluree (si anume terapie in combinatie tripla) ca terapie adjuvanta la regimul alimentar si exercitiile fizice la pacientii adulti, controlati necorespunzator cu metformina si o sulfoniluree. - Eucreas este indicat in terapie in combinatie tripla cu insulina ca terapie adjuvanata la regimul alimentar si exercitiile fizice pentru a imbunatati controlul glicemic la pacienti adulti cand utilizarea insulinei in doza stabila si metformina administrata in monoterapie nu asigura un control glicemic adecvat.	Finalizat
149	Afatinibum	Giotrif	Afatinib este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacientilor netratati anterior ce Receptori ai Factorului de Crestere Epidermal (EGFR) TKI cu neoplasm bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutatie(i) activatoare a(le) EGFR.	Finalizat
150	Afliberceptum	Eylea	Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul degenerescentei maculare legata de varsta (DMLV) forma neovasculara (umeda).	Finalizat
151	Linagliptinum+Metforminum	Jentadueto	Tratamentul pacientilor adulti cu diabet zaharat de tip 2 ca un adjuvant al dietei si exercitiului fizic pentru imbunatatirea controlului glicemic la pacientii adulti controlati inadecvat numai prin administrarea dozei maxime tolerate de metformina sau la pacientii carora deja li s-a administrat tratament combinat cu linagliptin si metformina	Finalizat
152	Lixisenatidum	LYXUMIA	Lyxumia este indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 în asociere cu medicamente hipoglicemizante, administrate pe cale orală, și/sau cu insulină bazală, în vederea obținerii controlului glicemic atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei	Finalizat
153	Abataceptum	Orencia (2st line)	Orencia in asociere cu metotrexat este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, forma moderata pana la severa, la pacientii adulti care au raspuns inadecvat la terapia anterioara cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificate de boala (MAMB), inclusiv metotrexat (MXT) sau un inhibitor al factorului de necroza tumorala (TNF)-alfa.	Finalizat
154	Tocilizumabum	RoActemra	Tratamentul pacientilor adulti cu poliartrita reumatoida activa, moderata pana la severa si pacientilor cu varsta de 2 ani si peste, cu artrita idiopatica juvenila, forma sistematica activa si cu poliartrita idiopatica juvenila.	Finalizat
155	Ipilimumab	Yervoy	Yervoy este indicat in tratamentul melanomului in stadii avansate (nerezecabil sau metastatic) la pacientii adulti.	Finalizat
156	Vemurafenibum	Zelboraf	Vemurafenibum este indicat in monoterapie pentru tratamentul pacientilor adulti cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutatia BRAF V600.	Finalizat
157	Abirateronum	Zytiga	Zytiga este indicat in asociere cu prednison sau prednisolon in tratamentul neoplasmului de prostata metastatic rezistent la castrare, la barbatii adulti a caror boala a evoluat in timpul sau dupa administrarea unei scheme chimioterapeutice pe baza de docetaxel.	Finalizat
158	METHOTREXATUM	METHOTREXAT EBEWE	Forme severe de psoriazis, in special psoriazisul tip placa, care nu pot fi tratate eficient cu terapie conventionala cum ar fi fototerapia, PUVA si retinoizii si psoriazis sever care afecteaza articulatiile (artrita psoriazica)	Finalizat
159	SILIBINUM	SILIMARINA BIOFARM	Hepatoprotector utilizat ca adjuvant în diferite afecțiuni hepatice cronice incluzând hepatita etanolică	Finalizat
160	INDACATEROLUM+GLICOPIRONIUM	ULTIBRO BREEZHALER 85 micrograme/43 micrograme	Ultibro Breezhaler este indicat în tratamentul bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
161	Perindopril Arginina + Indapamida + Amlodipina	TRIPLIXAM	Hipertensiunea arteriala esentiala la pacienti a caror afectiune este deja controlata cu combinatia in doza fixa perindopril/indapamida si amlodipina administrate concomitent, in aceleasi doze.	Finalizat
162	OFLOXACINUM	UNIFLOX	Infectii bacteriene	Finalizat
163	BRIMONIDINUM	BRIMONAL	Glaucom	Finalizat
164	AGOMELATINUM	VALDOXAN	Tratamentul episoadelor depresive majore	Finalizat
165	DENOSUMAB	PROLIA	Tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza si barbatii cu risc crescut de fracturi. Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale si de sold.	Finalizat
166	PANITUMUMAB	VECTIBIX	Vectibix (panitumumab) este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu neoplasm colorectal metastatic (NCRm) care p rezinta gena RAS de tip salbatic (non mutanta) in cadrul tratamentului de prima linie in asociere cu FOLFOX.	Finalizat

167	DENOSUMAB	XGEVA	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractura patologica, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau interventie chirurgicala la nivel osos) la adulti cu metastaze osoase secundare tumorilor solide.	Finalizat
168	ADALIMUMABUM	HUMIRA	Artrita juvenila idiopatica. Poliartrita reumatoida juvenila idiopatica.	Finalizat
169	DACLATASVIR	DAKLINZA	Daklinza este indicat, in asociere cu alte medicamente, pentru tratamentul infectiei cronice cu virusul hepatic C (VHC) la adulti.	Finalizat
170	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu limfom Hodgkin (LH) CD30 +recidivat sau refractar: 1. dupa transplant de celule stem autologe (TCSA) sau 2. dupa cel putin doua tratamente anterioare, cand TCSA sau chimioterapia cu mai multe medicamente nu reprezinta o optiune de tratament.	Finalizat
171	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS 50 mg	ADCETRIS este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs) , recidivat sau refractar.	Finalizat
172	DASABUVIR	EXVIERA 250 mg	Exviera este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
173	OMBITASVIRUM+PARITAPREVIRUM+RITONA VIRUM	VIEKIRAX 12,5mg/ 75mg/ 50mg	Viekirax este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulti.	Finalizat
174	SORAFENIBUM	NEXAVAR 200mg	SORAFENIBUM/Nexavar este indicat pentru tratamentul pacientilor cu carcinom tiroidian diferentiat (papilar/folicular/cu celule Hurthle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod radioactiv.	Finalizat
175	RIOCIGUAT	ADEMPAS 0,5mg/ 1mg/ 105mg, 2mg, 205mg	Hipertensiune pulmonara cronica tromboembolica (HAPCTE). Adempas este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS cu: -HAPCTE inoperabila, -HAPCTE persistenta sau recurenta dupa un tratament chirurgical, pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Hipertensiune arteriala pulmonara (HAP). Adempas, in monoterapie sau in combinatie cu antagonisti ai receptorilor de endotelina, este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu hipertensiune arteriala pulmonara (HAP) cu clasa functionala II si III conform clasificarii OMS pentru ameliorarea capacitatii de efort fizic. Eficacitatea a fost demonstrata la pacienti cu HAP inclusiv etiologii de HAP idiopatica sau ereditara sau HAP asociata cu o boala a tesutului conjunctiv	Finalizat
176	SOFOSBUVIR	SOVALDI 400mg	SOVALDI este indicat in asociere cu alte medicamente in tratamentul Hepatitei Cronice C (HCC) la adulti. Nu se recomanda administrarea de Sovaldi in monoterapie.	Finalizat
177	SIMEPREVIRUM	OLYSIO	OLYSIO, in asociere cu alte medicamente, este indicat in tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la pacienti adulti.	Finalizat
178	ETHIONAMIDUM	ETIONAMIDA Atb 250mg	Medicament tuberculostatic de linia a II a la pacientii cu rezistenta la medicamentele de linia I.	Finalizat
179	TELBIVUDINA	SEBIVO 600mg	Sebivo este indicat pentru tratamentul hepatitei cronice B la pacientii adulti cu boala hepatica compensata si semne de replicare virala, valoare plasmatice crescuta in mod repetat a alanin aminotransferazei (ALT) si cu semne histologice de inflamatie activa si/sau fibroza.	Finalizat
180	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40mg/ml sol.inj	Eylea este indicat la adulti pentru tratamentul afectarii acuitatii vizuale determinata de edemul macular diabetic (EMD).	Finalizat
181	MACITENTANUM	OPSUMIT	Opsumit, administrat in monoterapie sau in asociere, este indicat pentru tratamentul pe termen lung al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacientii adulti aflatii in clasa functionala II sau III OMS	Finalizat
182	BEDAQUILINUM	SIRTURO	SIRTURO este indicat la adulti ca parte a unei scheme de tratament asociat corespunzator pentru tuberculoza pulmonara multi-drog rezistenta (MDR-TB) atunci cand un tratament eficient nu poate fi altfel alcatuit din motive de rezistenta sau tolerabilitate.	Finalizat
183	LEDIPASVIR/ SOFOSBUVIR	HARVONI 90mg/400mg	Tratamentul hepatitei C cronice la adulti	Finalizat
184	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu sindroame mielodisplazice (SMD) cu risc intermediar-2 si mare, conform Sistemului International de Punctaj referitor la Prognostic (SIPP)	Finalizat

185	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie mielomonocitară cronică (LMMC) cu 10-29 % blasti medulari, fără boală mieloproliferativă	Finalizat
186	AZACITIDINE	VIDAZA 25mg/ml	Vidaza este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice, cu leucemie acută mieloidă (LAM) cu 20-30 % blasti și linii multiple de diferențiere a displaziei, conform clasificării Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)	Finalizat
187	LENALIDOMIDUM	REVLIMID	Revlimid este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
188	COMBINATII (ROSUVASTATINUM+ EZETINIBUM)	LIPOCOMB 10mg/10mg si 20mg/20mg	Lipocomb este indicat ca adjuvant al regimului alimentar în tratamentul hipercolesterolemiei (exceptând hipercolesterolemia heterozigotă familială) la pacienții adulți • care nu sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină în monoterapie; sau • ca terapie de substituție la pacienții controlați în mod adecvat cu substanțele individuale administrate concomitent, la aceleași concentrații ca și în combinația în doză fixă, dar administrate separat	Finalizat
189	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a soldului.	Finalizat
190	CANAGLIFLOZINUM	INVOKANA	Invokana este indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2, pentru îmbunătățirea controlului glicemic fiind administrat ca: Monoterapie În cazul în care doar prin dietă și exerciții fizice nu se obține un control glicemic adecvat la pacienții la care utilizarea de metformin este inadecvată datorită intoleranței sau contraindicațiilor. Terapie adjuvantă Terapie adjuvantă la alte medicamente care scad glicemia, inclusiv insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
191	BOSUTINIB	BOSULIF	Bosulif este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) în faza cronică (FC), faza accelerată (FA) sau faza blastică (FB), tratați anterior cu unul sau mai mulți inhibitori de tirozinază și la care administrarea de imatinib, nilotinib și dasatinib nu este considerată o opțiune terapeutică adecvată.	Finalizat
192	Bromura de Acildinium + Fumarat de Formoterol	DUAKLIR GENUAIR	Boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat
193	CABAZITAXELUM	JEVTANA	JEVTANA este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schema de tratament continuând docetaxel.	Finalizat
194	AFLIBERCEPTUM	ZALTRAP	ZALTRAP în asociere cu chimioterapia cu irinotecan/5-fluorouracil/acid folinic (FOLFIRI) este indicat la adulți cu cancer colorectal metastatic (CCRM), care este rezistent la sau a progresat după o schema de tratament pe baza de oxaliplatină.	Finalizat
195	OLAPARIBUM	LYNPARZA 50mg	LYNPARZA este indicat în monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivant cu mutație BRCA (germinală și/sau somatică), neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe baza de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe baza de platină.	Finalizat
196	GEFITINIBUM	IRESSA	IRESSA este indicată pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR_TK (linia I).	Finalizat
197	APIXABAN	ELIQUIS 2,5/5 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea trombozei venoase profunde și a emboliei pulmonare recurente la adulți.	Finalizat
198	RAMUCIRUMAB	CYRAMZA	Neoplasm gastric	Finalizat

199	METOPROLOL TARTRAT+ IVABRADINA	IMPLICOR	terapie de substituție pentru tratamentul simptomatic al anginei pectorale cronice stabile la pacienți adulți cu ritm sinusal normal, a căror afecțiune este deja controlată cu metoprolol și ivabradină administrate separat, în doze similare	Finalizat
200	IPILIMUMAB	YERVOY	Yervoy este indicat în tratamentul melanomului în stadii avansate (nerezectabil sau metastatic) la pacienții adulți.	Finalizat
201	THALIDOMIDUM	THALIDOMIDE CELGENE	Thalidomide Celgene în asociere cu melfalan și prednison este indicat ca tratament de primă linie la pacienții cu mielom multiplu netratat, cu vârsta ≥ 65 de ani sau care nu sunt eligibili pentru chimioterapie cu doze mari.	Finalizat
202	ABIRATERONUM	ZYTIGA	ZYTIGA este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în tratamentul neoplasmului de prostată metastatic rezistent la castrare, la bărbații adulți care sunt asimptomatici sau ușor simptomatici după eșecul terapiei de privare de androgeni și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic	Finalizat
203	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA 140 mg	tratamentul pacienților adulți cu leucemie cronică (LLC) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau ca terapie de primă linie în prezenta delectiei 17p sau mutației TP53 la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimioimunoterapie.	Finalizat
204	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA 140 mg	tratamentul pacienților cu limfom cu celule de manta (LCM) recidivant sau refractar.	Finalizat
205	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului în stadiu avansat (nerezectabil sau metastatic) la adulți.	Finalizat
206	BROMURA DE ACLIDINIUM + FUMARAT DE FORMOTEROL	BRIMICA GENUAIR	a tratament bronhodilatator de întreținere pentru ameliorarea simptomelor la adulții cu boală pulmonară cronică obstructivă (BPOC)	Finalizat
207	PAZOPANIBUM	VOTRIENT	indicat la adulți ca primă linie de tratament în carcinomul cu celule renale (CCR) în stadiu avansat și la pacienții la care s-a administrat anterior terapie cu citokine pentru boala în stadiu avansat.	Finalizat
208	PIRFENIDONUM	ESBRIET 267 mg	Esbriet este indicat la adulți pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice (FPI) usoare până la moderate.	Finalizat
209	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	Xtandi este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostată în stadiu metastatic rezistent la castrare, la bărbați adulți cu simptomatologie absentă sau ușoară, după eșecul terapiei de deprivare androgenică, la care chimioterapia nu este ușoară încă indicată din punct de vedere clinic.	Finalizat
210	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	tratamentul melanomului avansat (nerezectabil sau metastatic) la pacienți adulți.	Finalizat
211	DARUNAVIRUM + COBICISTATUM	REZOLSTA 80mg/150mg	REZOLSTA este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1) la adulți, începând cu vârsta de 18 ani.	Finalizat
212	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezectabil sau metastatic) la pacienți adulți.	Finalizat
213	OBINUTUZUMABUM	GAZYVARO	în asociere cu clorambucil este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior și cu comorbidități care nu permit administrarea unui tratament pe baza de fludarabină în doză completă.	Finalizat
214	VELAGLUCERASE	VPRIV	Terapia de substituție enzimatică (TSE) pe termen lung la pacienți cu tipul 1 de boala Gaucher.	Finalizat
215	TETRABENAZINUM	TETMODIS	Tratamentul tulburărilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington	Finalizat
216	DONEPEZILUM	NA	●bolii Alzheimer, formă ușoară sau moderată ●demenței vasculare (demența asociată cu bolile cerebrovasculare)	Finalizat
217	GALANTAMINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
218	MEMANTINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
219	RIVASTIGMINUM	NA	Alzheimer	Finalizat
220	FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	ATIMOS 0,012mg	ATIMOS este indicat în tratamentul regulat al afecțiunilor obstructive reversibile ale căilor respiratorii la pacienți cu bronhopneumonie cronică obscură, unde este necesară terapia cu bronhodilatator.	Finalizat
221	VEMURAFENIBUM	ZELBORAF 240mg	VEMURAFENIB este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, pozitiv la mutația BRAF V600.	Finalizat
222	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	XTANDI este indicat pentru tratamentul neoplasmului de prostată în stadiu metastatic rezistent la castrare, la bărbați adulți a căror boală a evoluat în timpul sau după administrarea unei terapii cu docetaxel.	Finalizat
223	FLUDARABINUM (forma orală)	FLUDARABINA oral	●Tratamentul leucemiei limfocitare cronice cu celule B la pacienții cu rezervă medulară suficientă ●Tratamentul de primă linie numai la pacienții cu formă avansată a leucemiei limfocitare cronice cu celule B, stadiile Rai III/IV (stadiul Binet C) sau stadiile Rai I/II (stadiul Binet A/B) și care prezintă simptome ale bolii sau dovezi ale progresiei bolii	Finalizat
224	ROTIGOTINUM	NA	Parkinson	Finalizat

225	AGALSIDASUM ALFA	REPLAGAL	Terapia de substitutie enzimatica pe termen lung la pacienti cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficienta de α -galactosidaza A)	Finalizat
226	ATALUREN	TRANSLARNA	Tratamentul pacientilor ambulatorii cu varsta de 5 ani si peste cu distrofie musculara Duchenne determinata de o mutatie de tip nonsense la nivelul genei distofinei.	Finalizat
227	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbări repetate la pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
228	PASIREOTIDUM	SIGNIFOR	indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu acromegalie pentru care o interventie chirurgicala nu constituie o optiune sau care nu a avut rezultate curative si care nu sunt controlati corespunzator prin tratament cu alt analog al somatostatinei.	Finalizat
229	CARFILZOMIBUM	KYPROLIS	in combinatie ori cu lenalidomida si cu dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu la care s-a administrat cel putin o terapie anterioara.	Finalizat
230	NINTEDANIBUM	OFEV	la adulti pentru tratamentul fibrozei pulmonare idiopatice	Finalizat
231	ELBASVIR/ GRAZOPREVIR	ZEPATIER	ZEPATIER este indicat in tratamentul hepatitei C cronice la adulti.	Finalizat
232	SECUKINUMAB	COSENTYX	Cosentyx este indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică.	Finalizat
233	NIVOLUMAB	OPDIVO	OPDIVO este indicat pentru tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decat cel de celule mici (NSCLC, non-small cell lung cancer) local avansat sau metastataz, dupa tratamentul anterior cu chimioterapie, la adulti.	Finalizat
234	PERTUZUMABUM	PERJETA	PERJETA este indicat pentru utilizarea in asociere cu trastuzumab si docetaxel la pacientii adulti cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatica.	Finalizat
235	ATAZANAVIR + COBICISTAT	EVOTAZ	EVOTAZ este indicat in asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infectiei cu virusul de tip 1 al imunodeficientei umane dobandite (HIV-1) la adulti fara mutatii cunoscute asociate rezistentei la atazanavir .	Finalizat
236	INCATIBANT	FIRAZYR	Tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditat la adulti (cu deficit de inhibitor al C1-I esterazei).	Finalizat
237	PONATINIB	ICLUSIG	1. leucemie mieloidă cronică (LMC) în fază cronică, în fază accelerată sau în fază blastică, care prezintă rezistență la dasatinib sau nilotinib, care prezintă intoleranță la dasatinib sau nilotinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I 2. leucemie limfoblastică acută cu cromozom Philadelphia pozitiv (LLA Ph+), care prezintă rezistență la dasatinib, care prezintă intoleranță la dasatinib și pentru care tratamentul ulterior cu imatinib nu este adecvat din punct de vedere clinic, sau care prezintă mutația T315I.	Finalizat
238	COMBINATII (VILDAGLIPTINUM + METFORMINUM)	EUCREAS 50mg/1000mg	tratamentul diabetului zaharat de tip 2: - Eucreas este indicat în tratamentul pacienților adulți care nu pot obține un control glicemic suficient la doza maximă tolerată de metformină administrată oral în monoterapie sau care sunt tratați deja cu o asociere de vildagliptin și metformină sub formă de comprimate separate. - Eucreas este indicat în combinație cu o sulfoniluree (și anume terapie în combinație triplă) ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice la pacienții adulți, controlați necorespunzător cu metformină și o sulfoniluree. - Eucreas este indicat în terapie în combinație triplă cu insulină ca terapie adjuvantă la regimul alimentar și exercițiile fizice pentru a îmbunătăți controlul glicemic la pacienți adulți când utilizarea insulinei în doză stabilă și metformina administrată în monoterapie nu asigură un control glicemic adecvat.	Finalizat
239	TRAMETINIB	MEKINIST	în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib, este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic, cu mutație BRAF V600	Finalizat
240	DIPROPIONAT DE BECLOMETAZONA ANHIDRU/FUMARAT DE FORMOTEROL DIHIDRAT	FOSTER	BRONHOPNEUMOPATIA CRONICA OBSTRUCTIVA (BPOC) Tratamentul simptomatic al pacientilor cu BPOC severa (VEMS < 50% din valoarea normala prezisa) si antecedente de exacerbări repetate la pacientii care prezinta simptome semnificative in pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durata lunga de actiune.	Finalizat
241	COMBINATII (TIOTROPIUM+OLODATEROLUM)	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 micrograme/2,5 micrograme	tratament bronhodilatator de întreținere, cu rol de ameliorare a simptomelor la pacienții adulți cu bronhopneumopatie obstructivă cronică (BPOC).	Finalizat

242	MECASERMIN	INCRELEX	tratatamentul de lungă durată al deficitului de creștere la copiii și adolescenții cu vârsta cuprinsă între 2 și 18 ani cu deficit primar sever de factor de creștere, asemănător insulinei-tip 1 (DFCI)	Finalizat
243	DAPAGLIFLOZIN	FORXIGA	Diabet zaharat tip 2	Finalizat
244	PANOBINOSTAT	FARYDAK	mielom multiplu	Finalizat
245	TRASTUZUMAB EMTANSINE	KADCYLA	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
246	ERLOTINIBUM	TARCEVA	Neoplasm bronhopulmonar	Finalizat
247	PEMETREXEDUM	ALIMTA	Cancer pulmonar Mezotelion pleural	Finalizat
248	SORAFENIBUM	NEXAVAR	Carcinom hepatocelular, renal, tiroidian	Finalizat
249	TRABECTEDINUM	YONDELIS	Sarcom de țesuturi moi Cancer ovarian	Finalizat
250	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	Cancer mamar	Finalizat
251	DECITABINUM	DACOGEN	Leucemie mieloida acuta	Finalizat
252	RITUXIMABUM	MABTHERA	Limfom	Finalizat
253	BEVACIZUMABUM	AVASTIN	Carcinom de colon, neoplasm mamar, neoplasm renal	Finalizat
254	CETUXIMABUM	ERBITUX	Cancer colorectal, cancer al capului si gatului	Finalizat
255	PANITUMUMABUM	VECTIBIX	Neoplasm colorectal	Finalizat
256	RUXOLITINIBUM	JAKAVI	Splenomegalie, mielofibroză	Finalizat
257	TEMOZOLAMIDUM		Glioni, glioblastom	Finalizat
258	GEMCITABINUM		Neoplasm vezică urinară, pancreas, NSCLC, ovarian, mamar	Finalizat
259	PACLITAXELUM		Cancer mamar, ovarian, bronho-pulmonar	Finalizat
260	DOCETAXELUM		Cancer mamar, prostata, bronho-pulmonar	Finalizat
261	FILGRASTIMUM		Neutropenie	Finalizat
262	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratatamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
263	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg	Tratatamentul pacienților adulți cu boala Crohn, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală	Finalizat
264	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA 5 mg comprimate filmate	indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic în terapia combinată, în asociere cu insulină (cu sau fără metformin), când acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
265	SAXAGLIPTIN	ONGLYZA 5 mg comprimate filmate	indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2, în scopul îmbunătățirii controlului glicemic: în terapia orală triplă în asociere cu: metformin și o sulfoniluree, atunci când doar acest tratament, împreună cu dieta și exercițiile fizice, nu asigură un control adecvat al glicemiei.	Finalizat
266	ELVITEGRAVIR / COBICISTAT / EMTRICITABINE / TENOFOVIR ALAFENAMIDE	GENVOYA	tratatamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir.	Finalizat
267	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)	DESCOVY 200 mg/10 mg comprimate filmate	indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
268	COMBINATII (EMTRICITABINUM+TENOFOVIRUM)	DESCOVY 200 mg/25mg comprimate filmate	indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat

269	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	Finalizat
270	SECUKINUMAB	COSENTYX 150 mg	Cosentyx este indicat în tratamentul spondiliiei anchilozante active la adulții care au răspuns necorespunzător la terapia convențională.	Finalizat
271	COMBINATII (FLUTICASONUM+FORMOTEROLUM)	FLUTIFORM	tratamentul de întreținere al astmului bronșic în cazul în care este indicată utilizarea unui medicament combinat (un corticosteroid inhalator și un β2 agonist cu durată lungă de acțiune): La pacienții la care nu se obține control adecvat cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agoniști cu durată scurtă de acțiune, administrați la nevoie. Sau La pacienții la care s-a obținut deja control adecvat atât cu corticosteroizi inhalatori și cu β2 agoniști cu durată lungă de acțiune.	Finalizat
272	OSIMERTINIB MESYLATE	TAGRISSO	tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat
273	DELAMANID	DELTIBA 50 MG	indicat pentru utilizare în cadrul unui regim terapeutic asociat adecvat pentru tuberculoza pulmonară plurirezistentă la pacienții adulți atunci când un regim terapeutic eficace nu poate fi altfel constituit din motive de rezistență sau tolerabilitate	Finalizat
274	APIXABAN	ELIQUIS	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitor (AIT) în antecedente; vârstă ≥ 75 ani; hipertensiune arterială; diabet zaharat; insuficiență cardiacă simptomatică (clasa NYHA ≥ II)	Finalizat
275	NIVOLUMAB	OPDIVO	indicat ca monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal după terapie anterioară, la adulți.	Finalizat
276	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	indicat pentru tratamentul carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), local avansat sau metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 și cărora li s-a administrat anterior cel puțin o schemă de chimioterapie. Pacienților cu mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament aprobat pentru aceste mutații înaintea administrării KEYTRUDA.	Finalizat
277	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al mielomului multiplu în asociere cu prednison, la pacienți cu vârsta peste 65 de ani, care nu sunt eligibili pentru transplantul autolog de celule stem și care prezintă neuropatie clinică în momentul diagnosticului, ceea ce exclude tratamentul cu talidomidă sau bortezomib	Finalizat
278	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Ca monoterapie în limfomul non-Hodgkin latent , la pacienții cu progresie a bolii în timpul sau în decurs de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă terapeutică care conține rituximab.	Finalizat
279	BENDAMUSTINUM	BENDAMUSTINA ZENTIVA	Tratament de primă linie al leucemiei limfatice cronice (stadiul B sau C Binet) la pacienții la care nu este indicată chimioterapia care conține fludarabină.	Finalizat
280	COMBINATII (SAXAGLIPTIN+DAPAGLIFLOZINUM)	QTERN	Qtern, combinație în doză fixă de saxagliptin și dapagliflozin este indicat la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2: - pentru îmbunătățirea controlului glicemic atunci când metformin și/sau sulfoniluree (SU) și una din monocomponentele din Qtern nu asigură un control adecvat al glicemiei, - atunci când sunt deja tratați cu combinația liberă de dapagliflozin și saxagliptin	Finalizat
281	LANREOTIDUM	SOMATULINE AUTOGEL 120mg	Tratamentul tumorilor neuroendocrine gastroenteropancreatice (GEP-NETs) de gradul 1 și un subset al gradului 2 (indice Ki67 până la 10%) de origine mezenterică, pancreatică sau necunoscută (acolo unde a fost exclusă originea în hemicolonul stang și rect), la pacienții adulți cu boală local avansată nerezecabilă sau la cei cu boală metastatică	Finalizat
282	BLINATUMOMAB	BLINCYTO	tratamentul adulților cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, cu cromozom Philadelphia negativ	Finalizat
283	IDEBENONUM	RAXONE	tratamentul tulburărilor de vedere la pacienții adolescenți și adulți cu neuropatie optică ereditară Leber (LHON)	Finalizat
284	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.03% ung	Tratamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârsta peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici. Copii (cu vârsta peste 2 ani) Tratamentul dermatitelor atopice moderate până la severe la copiii care nu au răspuns adecvat la terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici.	Finalizat

285	TACROLIMUS	PROTOPIC 0.1% ung	Tratamentul recurențelor Adulți și adolescenți (cu vârsta peste 16 ani) Tratamentul dermatitelor atopice de gravitate moderată până la severă la adulții care nu au răspuns adecvat la sau nu au tolerat terapiile convenționale, cum sunt corticosteroizii topici	Finalizat
286	ALEMTUZUMAB	LEMTRADA	indicat la pacienți adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR), cu boală activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	Finalizat
287	CABAZITAXELUM	JEVTANA	în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel	Finalizat
288	ABACAVIR SULFATE / DOLUTEGRAVIR SODIUM / LAMIVUDINE	TRIUMEQ	indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat
289	EMPAGLIFLOZIN	JARDIANCE	tratamentul diabetului zaharat de tip 2 pentru a îmbunătăți controlul glicemic la adulți, ca: Monoterapie Atunci când numai dieta și exercițiul fizic nu asigură un control adecvat al glicemiei la pacienții la care utilizarea metforminei este considerată inadecvată din cauza intoleranței. Terapie asociată suplimentară În asociere cu alte medicamente hipoglicemizante, incluzând insulina, atunci când acestea, împreună cu dieta și exercițiul fizic, nu asigură un control adecvat al glicemiei)	Finalizat
290	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL	EMTRICITABINA/TENOFOVIR DISOPROXIL MYLAN 200mg/245mg	tratamentul antiretroviral combinat în tratarea adulților infectați cu VIH-1; antiretroviral pentru utilizare sistemică; antiretrovirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații	Finalizat
291	PALIPERIDONUM	Trevicta	injecție cu o administrare la 3 luni, este indicată în tratamentul de întreținere al schizofreniei la pacienții adulți care sunt stabiliizați clinic cu palmitat de paliperidonă injectabil cu o administrare lunară	Finalizat
292	TOCILIZUMABUM	RoActemra	în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat pentru: tratamentul pacienților adulți cu PR activă, moderată până la severă, care au avut fie un răspuns inadecvat, fie nu au tolerat tratamentul cu unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD) sau cu inhibitori ai factorului de necroză tumorală (TNF).La acești pacienți, RoActemra poate fi administrat ca monoterapie, în cazul intoleranței la MTX sau unde continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată. S-a demonstrat că RoActemra scade rata de progresie a leziunilor articulare, evaluată radiologic și îmbunătățește funcția fizică atunci când este administrat în asociere cu metotrexat.	Finalizat
293	COMBINAȚII(BRINZOLAMIDUM+BRIMONIDINUM)	SIMBRINZA	Scăderea presiunii intraoculare (PIO) crescute, la pacienți adulți cu glaucom cu unghi deschis sau hipertensiune oculară, la care monoterapia nu asigură o reducere suficientă a PIO	FINALIZAT
294	COMBINAȚII (SACUBITRILUM+VALSARTANUM)	ENTRESTO 24 mg/26 mg ENTRESTO 49 mg/51 mg mg ENTRESTO 97 mg/103 mg	pacienții adulți în tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejeție redusă	Finalizat
295	IBRUTINIBUM	IMBRUVICA	ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu macroglobulinemie Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau ca terapie de primă linie la pacienții care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie.	Finalizat
296	TRASTUZUMABUM EMTANSINUM	KADCYLA	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar HER2-pozitiv metastatic sau local avansat inoperabil, care au urmat anterior tratament cu trastuzumab și un taxan, separat sau în asociere. Pacienții trebuie: • să fi urmat anterior tratament pentru boală metastatică sau local avansată, sau • să fi dezvoltat o recurență a bolii în timpul tratamentului adjuvant sau în intervalul așase luni de la terminarea tratamentului adjuvant.	Finalizat
297	BELIMUMAB	BENLYSTA	tratament asociat la terapiile existente la pacienții adulți cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard	Finalizat
298	COMBINAȚII (AZELASTINUM+FLUTICASONUM)	DYMISTA 137 micrograme/50 micrograme/doza	Ameliorarea simptomelor de rinită alergică sezonieră și perenă moderate până la severe dacă monoterapia cu antihistaminice intranasale sau glucocorticoizi nu este considerată suficientă.	Finalizat
299	COMBINAȚII (EMTRICITABINUM+TENOFIVIRUM)	Dunotrisin	o combinație cu doză fixă de emtricitabină și succinat de tenofovir disoproxil. Este indicat în terapia antiretrovirală combinată pentru tratamentul adulților cu vârsta de 18 ani și peste, infectați cu HIV-1.	Finalizat
300	Apixabanum	Eliquis	Prevenirea evenimentelor tromboembolice venoase (ETV) la pacienții adulți care sunt supuși unei intervenții chirurgicale de artroplastie a șoldului	Finalizat
301	Romiplostim	Nplate	Nplate este indicat pentru pacienții cu purpură trombocitopenică imună (idiopatică) cronică (PTI) cu vârsta de un an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline).	Finalizat
302	Osimertinibum	TAGRISSO 80 mg comprimate filmate	tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, cu mutație pozitivă T790M a receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	Finalizat

303	Elbasvir/grazoprevir	Zepatier	în tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adulți. Pentru activitatea specifică genotipului virusului hepatic C (VHC)	RETRAS
304	Darunavir 800mg/cobicista 150 mg	Rezolsta 800mg/150 mg	în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV-1) la adulți, începând cu vârsta de 18 ani.	Finalizat
305	Ixekizumab	Taltz 80 mg soluție injectabilă în seringă preumplută	tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.	Finalizat
306	Ramucirumab	Cyramza 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	în asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat	Finalizat
307	RILPIVIRINUM	Edurant 25mg	în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane tip 1 (HIV-1) la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, netratați anterior cu medicamente antiretrovirale, cu o încărcătură virală ARN HIV-1 ≤ 100000 copii/ml.	Finalizat
308	Secukinumabum	Cosentyx	în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți când răspunsul la terapia anterioară, de modificare a afecțiunii, cu medicamente antireumatice (DMARD), a fost inadecvat	FINALIZAT
309	Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat	Foster 100/6 mcg/doză	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS<50%din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienții care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu acțiune de lungă durată	Finalizat
310	Dipropionat de beclometazonă anhidru+Fumarat de formoterol dihidrat	Foster Nexthaler 200/6 mcg/doză	Tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu lungă durată de acțiune) este adecvată: - pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie - pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2-adrenergic cu durată lungă de acțiune	Finalizat
311	PERTUZUMABUM	PERJETA 420mg	indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.	Finalizat
312	LAPATINIBUM	TYVERB	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar, ale căror tumori exprimă HER2 (ErbB2) în exces: ☒ în asociere cu capecitabina, la pacienții cu neoplasm mamar avansat sau metastatic, progresiv în urma unor terapii anterioare, care trebuie să fi inclus antracicline și taxani și terapie cu trastuzumab, în context metastatic	Finalizat
313	BEVACIZUMAB	AVASTIN	1. Bevacizumab administrat în asociere cu carboplatină și paclitaxel este indicat ca tratament de primă linie al pacienților adulte cu neoplasm ovarian epitelial (stadiile FIGO (Federația Internațională de Ginecologie și Obstetrică) IIIB, IIIC și IV), al trompelor uterine sau cu neoplasm peritoneal primar în stadii avansate. 2. Bevacizumab, administrat în asociere cu carboplatină și gemcitabină , este indicat pentru tratamentul pacienților adulte la care s-a diagnosticat prima recidivă de neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, sensibile la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-a administrat anterior tratament cu bevacizumab sau alți inhibitori ai factorului de creștere a endoteliului vascular (FCEV) sau terapie țintă asupra receptorului FCEV 3. Bevacizumab administrat în asociere cu paclitaxel, topotecan sau doxorubicină lipozomală polietilenglicată este indicat pentru tratamentul pacienților adulte cu neoplasm ovarian epitelial, neoplasm al trompelor uterine sau neoplasm peritoneal primar, recurente, rezistente la chimioterapia cu săruri de platină, cărora nu li s-au administrat mai mult de două scheme chimioterapice și care nu au fost tratate anterior cu bevacizumab sau cu alți inhibitori ai FCEV sau cu terapie țintă asupra receptorului FCEV	Finalizat
314	TRASTUZUMABUM	HERCEPTIN	în asociere cu capecitabină sau 5-fluorouracil și cisplatină este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu adenocarcinom gastric metastatic HER2 pozitiv sau a joncțiunii gastroesofagiene, cărora nu li s-a administrat anterior tratament împotriva cancerului pentru boala lor metastatică	Finalizat
315	PEMBROLIZUMABUM	KEYTRUDA 50mg	indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC, non-small cell lung carcinoma), metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un scor tumoral proporțional (STP) ≥ 50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.	Finalizat

316	ELVITEGRAVIR/COBICISTAT/EMTRICITABINĂ/ FUMARAT TENOFOVIR ALAFENAMIDA	GENVOYA	Tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutate corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără orice mutații cunoscute a fi asociate cu rezistența la clasa inhibitorilor integrazei, emtricitabină sau tenofovir	Finalizat
317	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Artrită psoriazică Cimzia în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la adulți când răspunsul la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice modificatoare ale evoluției bolii a fost inadecvat. Cimzia poate fi administrat ca monoterapie în cazul intoleranței la MTX sau când continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată	Finalizat
318	CERTOLIZUMAB PEGOL	CIMZIA	Spondilartrită axială severă, incluzând: Spondilita anchilozantă (SA) - Adulți cu spondilită anchilozantă activă severă care au un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS Spondilartrită axială fără dovadă radiografică de SA- Adulți cu spondilartrită axială activă severă fără dovadă radiografică de SA, dar cu semne obiective de inflamație manifestate prin proteina C reactivă (PCR) crescută și/sau rezonanță magnetică nucleară (RMN), care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la AINS	Finalizat
319	DOLUTEGRAVIR+ABACA VIR+LAMIVUDINU M	TRIUMEQ	indicat în tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (HIV) la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de cel puțin 40 kg	Finalizat
320	DARATUMUMAB	DARZALEX	1) în monoterapie, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și refractar, care au fost tratați anterior cu un inhibitor de proteazom și un agent imunomodulator și care au înregistrat progresia bolii sub ultimul tratament.; 2) în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă sau cu bortezomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
321	EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDĂ	DESCOVY 250mg/25 mg	Descovy este indicat în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
322	EMTRICITABINA/TENOFOVIR ALAFENAMIDĂ	DESCOVY 200mg/10 mg	în asociere cu alte medicamente antiretrovirale pentru tratamentul adulților și adolescenților (cu vârsta de 12 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 35 kg) infectați cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1)	Finalizat
323	BARICITINIB	OLUMIANT	Tratamentul poliartritei reumatoide active moderat până la severă la pacienții adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală	Finalizat
324	DULAGLUTIDUM	TRULICITY	indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic, sub formă de: Monoterapie Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. Terapie combinată În combinație cu alte medicamente hipoglicemizante, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
325	COMBINATII (INSULINE GLARGINE+LIXISENATIDUM)	SULIQUA	indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală	Finalizat
326	TAFLUPROSTUM	SAFLUTAN	Scăderea tensiunii intraoculare crescute la pacienții cu glaucom cu unghi deschis și la pacienții cu hipertensiune oculară. Ca monoterapie la pacienții: o care pot avea beneficii din utilizarea picăturilor oftalmice fără conservanți o care nu răspund suficient la tratamentul de primă linie o care prezintă intoleranță sau contraindicații la tratamentul de primă linie Ca adjuvant în tratamentul cu beta-blocante. SAFLUTAN este indicat la adulți cu vârsta ≥18 ani.	Finalizat
327	CARFILZOMIB	KYPROLIS	în combinație ori cu lenalidomida și cu dexametazona sau numai cu dexametazona este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu (MM) la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.	Finalizat

328	ALIROCUMABUM	PRALUENT	indicat la adulți cu hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă și non-familială) sau cu dislipidemie mixtă, ca adjuvant la dietă: - în asociere cu o statină sau cu o statină împreună cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți la care nu s-au putut atinge valori țintă ale LDL-colesterolului cu o statină administrată în doza maximă tolerată, sau - singur sau în asociere cu alte terapii hipolipidemiante la pacienți cu intoleranță la statine sau la care este contraindicată administrarea de statine.	Finalizat
329	ELTROMBOPAG	REVLADE	indicat pentru tratamentul purperei trombocitopenice imune (idiopatice) (PTI) cronice la pacienții cu vârsta de 1 an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	Finalizat
330	IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA, CU ADMINISTRARE EXTRAVASCULARA	GAMMANORM 165 mg/mL	Terapie de substitutie la adulti, adolescenti si copii (cu varsta intre 0 si 18 ani) cu sindroame de imunodeficienta primara cum sunt: - agamaglobulinemie si hipogamaglobulinemie congenitale; - imunodeficienta comuna variabila (IDCV); - imunodeficienta severa combinata; - deficite de subclasa IgG cu infectii recurente;	Finalizat
331	Secukinumabum	Cosentyx	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever , la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Finalizat
332	USTEKINUMABUM	STELARA	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu psoriazis în plăci , forme moderate până la severe, care au prezentat fie rezistență, fie contraindicații, fie intoleranță la alte terapii sistemice incluzând ciclosporina, metotrexatul (MTX) sau PUVA (psoralen și ultraviolete A)	FINALIZAT
333	Nivolumabum	Opdivo	în monoterapie este indicat pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic recidivat sau refractar după transplant autolog de celule stem (TACS) și tratament cu brentuximab vedotin la adulți	Finalizat
334	ELIGLUSTAT	CERDELGA	tratamentul de lungă durată la pacienții adulți cu boala Gaucher de tip 1 (BG1), care sunt metabolizatori lenți (ML), metabolizatori intermediari (MI) sau metabolizatori rapizi (MR) prin intermediul CYP2D6	Finalizat
335	VANDETANIB	CAPRELSA	tratamentul neoplasmului medular tiroidian (NMT) agresiv și simptomatic la pacienți cu forma de boală local avansată, inoperabilă sau cu forma de boală metastazată.	Finalizat
336	CRIZOTINIB	XALKORI	Xalkori este indicat pentru tratamentul de prima intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv)	FINALIZAT
337	RITUXIMAB	MABTHERA	Granulomatoză cu poliangieită și poliangieită microscopică în asociere cu glucocorticoizi este indicat pentru inducerea remisiunii la pacienții adulți cu granulomatoză cu poliangieită Wegener GPA activă, severă și poliangieită microscopică MPA	FINALIZAT
338	AFLIBERCEPTUM	EYLEA	afectării acuității vizuale determinată de edemul macular secundar occludiei venei retinei (OVR de ram sau OVR centrală)	FINALIZAT
339	BRIVARACETAM	BRIVIACT	terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți și adolescenți, începând cu vârsta de 16 ani.	FINALIZAT
340	LIRAGLUTIDUM	VICTOZA	pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului	FINALIZAT
341	ALFA ELOSULFAZA	VIMIZIM	tratamentul mucopolizaharidozei tip IVA (sindromul Morquio A, MPS IVA) la pacienții de orice vârstă	FINALIZAT
342	TOFACITINIB	XELJANZ	• în asociere cu metotrexat (MTX) este indicat în tratamentul artritei reumatoide (AR) active, moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la, sau care nu tolerează unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii; • administrat ca monoterapie în caz de intoleranță la MTX sau atunci când tratamentul cu MTX nu este adecvat	Finalizat
343	ETIONAMIDUM	ETIONAMIDA 250 mg	Medicament tuberculostatic de linia a 2a la pacienții cu rezistență la medicamentele de linia 1	Finalizat
344	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă	Boala Crohn	Finalizat
345	VEDOLIZUMABUM	ENTYVIO 300 mg pulbere pentru concentrat pentru soluție perfuzabilă	Colita Ulcerativă	Finalizat
346	COMBINATII (EFAVIRENZUM/ EMTRICITABINUM/ TENOFOVIRUM)	EFAVIRENZ/EMTRICITABINA/TENOFOVIR disoproxil MYLAN 600 mg /200 mg /245 mg	infecția HIV	Finalizat
347	OMALIZUMAB	XOLAIR 150 mg	tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienți adulți și adolescenți (12 ani și peste această vârstă) cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1	Finalizat

348	ETIONAMIDUM	NA	în combinație cu alte medicamente tuberculostatice ca medicament de linia a doua la pacienții cu Mycobacterium tuberculosis (MT) în condițiile în care s-a instalat rezistența la medicamentele de primă intenție (izoniazidă și rifampicină).	Finalizat
349	LEVOFLOXACINUM	NA	tratamentul infecțiilor bacteriene	Finalizat
350	CLOFAZIMUN	NA	TBC	Finalizat
351	LINEZOLID	NA	TBC	Finalizat
352	Combinatii (Rifampicina+Pirazinamida+Izoniazida)	NA	TBC	Finalizat
353	Combinatii (Amoxicilina+Acid clavulanic)	NA	TBC	Finalizat
354	Combinatii (Imipenem+Cilastatin)	NA	TBC	Finalizat
355	Rifamycin	NA	TBC	Finalizat
356	Combinatii(Rifampicin+Pirazinamid+Izoniazid +Etambutol)	NA	TBC	Finalizat
357	Natrii Cromoglicas		MASTOCITOZA	Finalizat
358	Palbociclib	IBRANCE 75 mg capsule IBRANCE 100 mg capsule IBRANCE 125 mg capsule	tratamentul cancerului mamar avansat local sau metastatic pozitiv pentru receptorul pentru hormoni (HR) i negativ pentru receptorul 2 pentru factorul uman de creștere epidermală (HER2): - în asociere cu un inhibitor de aromatază - în asociere cu fulvestrant la femei cărora li s-a administrat tratament endocrin anterior La femeile în pre- sau perimenopauză, tratamentul endocrin trebuie combinat cu un agonist al hormonului de eliberare al hormonului luteinizant (LHRH).	Finalizat
359	BECLOMETASONE / FORMOTEROL / GLYCOPYRRONIUM BROMIDE	TRIMBOW 87/5/9 mg	BPOC	Finalizat
360	OLARATUMAB	LARTRUVO	în combinație cu doxorubicina pentru tratamentul pacienților adulți cu sarcom de țesuturi moi în stadii avansate care nu sunt eligibili pentru tratamentul curativ prin intervenție chirurgicală sau radioterapie și care nu au fost tratați anterior cu doxorubicină	Finalizat
361	VENETOCLAX	VENCLYXTO	1. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul leucemiei limfocitare cronice (LLC) în prezența deleției 17p sau a mutației TP53 la pacienți adulți care nu sunt eligibili pentru sau au avut eșec la un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B. 2. Venclyxto în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu LLC în absența deleției 17p sau a mutației TP53 care au avut eșec atât la chimioterapie și imunoterapie cât și la tratamentul cu un inhibitor al căii de semnalizare a receptorilor celulelor B.	Finalizat
362	BRENTUXIMAB VEDOTIN	ADCETRIS	tratamentul pacienților adulți cu limfom cutanat cu celule T CD30+ (LCCT) după cel puțin 1 tratament sistemic anterior	Finalizat
363	ARSENICUM TRIOXIDUM	TRISENOX 1mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii și consolidare la pacienții adulți care prezintă: ⊗ leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la intermediar, nou diagnosticată(număr de leucocite ≤10 x 103/μl) în asociere cu acidul all-trans retinoic (AATR) ⊗ leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară (tratamentul anterior trebuie să fi inclus un retinoid și chimioterapie) caracterizată prin prezența translocăției t(15;17) și / sau prezența genei leucemiei promielocitare/receptorului-alfa al acidului retinoic (LPM/RAR-alfa). Nu a fost studiată rata de răspuns a altor subtipuri de leucemii acute mieloblastice la trioxidul de arsen.	Finalizat
364	LIPEGFILGRASTIMUM	LONQUEX 6 mg soluție injectabilă	Reducerea duratei neutropeniei și a apariției neutropeniei febrile la pacienți adulți tratați cu chimioterapie citotoxică pentru afecțiuni maligne (cu excepția leucemiei mieloid cronice și a sindroamelor mielodisplazice).	Finalizat
365	EVEROLIMUS	AFINITOR	tratamentul tumorilor neuroendocrine, nefuncționale, nerezectabile sau metastatice, bine diferențiate (de gradul 1 sau gradul 2), de origine gastro-intestinală sau pulmonară, la adulți cu boală progresivă	Finalizat
366	NIVOLUMAB	OPDIVO 10 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul cancerului scuamos de cap și gât la adulți la care boala progresează în timpul sau după terapie pe bază de săruri de platină	Finalizat
367	COMBINATII (TRIFLURIDINUM+TIPIRACILUM)	LONSURF 15 mg/ 6,14 mg comprimate filmate LONSURF 20 mg/ 8,19 mg comprimate filmate	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm colorectal metastatic (CCR –cancer colorectal), cărora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe bază de fluoropirimidină, oxaliplatină și irinotecan, tratamentele anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) și anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)	Finalizat

368	NUSINERSEN	SPINRAZA	tratamentul atrofiei musculare spinale 5q	Finalizat
369	COLISTIMETAT DE SODIU	COLOBREATHE 1662500 UI capsule cu pulbere de inhalat	Colobreathe este indicat în abordarea terapeutică a infecțiilor pulmonare cronice cauzate de Pseudomonas aeruginosa, la pacienții cu fibroză chistică (FC), cu vârsta de cel puțin 6 ani	Finalizat
370	PERTUZUMABUM	PERJETA	Perjeta este indicat pentru utilizare în asociere cu trastuzumab și docetaxel la pacienții adulți cu neoplasm mamar metastatic HER2-pozitiv sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică	Finalizat
371	DOLUTEGRAVIR	TIVICAY 10 mg, 25 mg	în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.	Finalizat
372	DOLUTEGRAVIR	TIVICAY 50 mg	în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta peste 6 ani.	Finalizat
373	CABOZANTINIB	CABOMETYX 40mg, 60mg	tratamentul carcinomului celular renal (CCR) în stadiu avansat, la adulți care au urmat anterior o terapie țintită asupra factorului de creștere al endoteliului vascular (FCEV).	Finalizat
374	CERITINIB	ZYKADIA	a în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat (NSCLC), pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), tratați anterior cu crizotinib	Finalizat
375	AZACITIDINE	VIDAZA	tratamentul pacienților adulți, neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice (TCSH), cu LAM cu > 30 % blasti medulari conform clasificării OMS	Finalizat
376	BEVACIZUMAB	AVASTIN	în asociere cu paclitaxel și cisplatină sau, în mod alternativ, cu paclitaxel și topotecan la pacientele cărora nu li se poate administra chimioterapie cu săruri de platină, este indicat pentru tratamentul pacientelor adulte cu carcinom de col uterin persistent, recurent sau metastazat	Finalizat
377	DIMETHYL FUMARATE	Tecfidera 120 mg capsule gastrorezistente Tecfidera 240 mg capsule gastrorezistente	Tecfidera este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă forma recurentremisivă	Finalizat
378	OBINUTUZUMAB	GAZVVARO	Gazyvaro administrat în asociere cu bendamustină, urmat de tratament de întreținere cu Gazyvaro, este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfom folicular (LF) care nu au răspuns la tratament sau au prezentat progresia bolii în timpul sau în interval de 6 luni după tratamentul cu rituximab sau cu o schemă de tratament care a inclus rituximab	Finalizat
379	PEGINTERFERON BETA 1A	PLEDIGRY	Plegridy este indicat la pacienții adulți pentru tratamentul sclerozei multiple recurent remisie	Finalizat
380	COMBINATII (CARVEDILOLUM+IVABRADINUM)	CARIVALAN	1. tratamentul simptomatice arangeri pectorale cronice stabile la pacienți cu boala coronariană 2. tratamentul insuficienței cardiace cronice (clasa II-IV NYHA) cu disfuncție sistolică	Finalizat
381	APREMILAST	OTEZLA	tratamentul psoriazisului în plăci cronic, moderat până la sever, la pacienții adulți care nu au răspuns sau cărora le este contraindicată ori prezintă intoleranță la altă terapie sistemică, inclusiv ciclosporină, metotrexat sau psoralen și raze ultraviolete A (PUVA)	Finalizat
382	APREMILAST	OTEZLA	administrat ca monoterapie sau în asociere cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active (APs) la pacienții adulți care au obținut un răspuns inadecvat sau au prezentat intoleranță la o terapie anterioară cu MARMB	Finalizat
383	ERIBULIN	HALAVEN	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm mamar local în stadiu avansat sau metastatic, la care boala a progresat după cel puțin un regim chimioterapic pentru boală în stadiu avansat. Tratamentul anterior trebuia să includă o antraciclină și un taxan fie în context adjuvant, fie în context metastatic, cu excepția cazului în care pacienții nu îndeplineau criteriile pentru administrarea acestor medicamente	Finalizat
384	USTEKINUMAB	STELARA	tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai răspundă sau au dezvoltat intoleranță la tratamentele convenționale, fie la antagoniști TNFα, sau aceste tratamente le sunt contraindicate din punct de vedere medical.	Finalizat

385	MIDOSTAURIN	RYDAPT	1) la pacienții adulți nou diagnosticați cu leucemie granulocitară acută (LGA), cu mutație FLT3 în asociere cu chimioterapia standard de inducție cu daunorubicină și citarabină și de consolidare cu doză mare de citarabină, iar la pacienții cu răspuns complet, ca tratament de întreținere cu Rydapt în monoterapie; 2) în tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă (MSA), mastocitoză sistemică cu neoplazie hematologică asociată (MS-NHA) sau leucemie cu celule de tip mastocit (LCM) în monoterapie	Finalizat
386	SILTUXIMABUM	SYLVANT	SYLVANT este indicat în tratamentul pacienților adulți cu boala Castleman multicentrică (BCM) fără infecție cu virusul imunodeficienței umane (HIV) și fără infecție cu virusul herpetic uman de tip 8 (VHU-8)	Finalizat
387	PANOBINOSTATUM	FARYDAK	Farydak, administrat în combinație cu bortezomib și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivant și/sau refractar cărora li s-au administrat cel puțin două scheme anterioare de tratament incluzând bortezomib și o substanță imunomodulatoare.	Finalizat
388	ATEZOLIZUMAB	TECENTRIQ	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie cu săruri de platină sau care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatină	Finalizat
389	EFTRENONACOG ALFA	ALPROLIX	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilia B (deficit congenital de factor IX).	Finalizat
390	ABIRATERONE	ZYTIGA	●tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy) ● tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la castrare (mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer), la bărbații adulți asimptomatici sau ușor simptomatici, după eșecul terapiei de deprivare androgenică și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic (vezi pct. 5.1)	finalizat
391	ATEZOLIZUMAB	TECENTRIQ	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul neoplasmului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie. Pacienților cu mutații activatoare ale EGFR sau mutații tumorale ALK pozitive trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratament specific, înaintea administrării Tecentriq	Finalizat
392	ALECTINIB	ALECENSA	indicat ca monoterapie pentru tratamentul de primă linie al pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat, cu status pozitiv pentru kinaza din limfomul anaplastic (ALK). Alecensa este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu NSCLC avansat, cu status pozitiv ALK, tratați anterior cu crizotinib	Finalizat
393	RIBOCICLIB	KISQALI	în asociere cu un inhibitor de aromatază este indicat pentru tratamentul femeilor aflate la postmenopauză, cu cancer mamar, în stadiu avansat sau metastazat local , cu receptori hormonali (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică (HER2), ca terapie hormonală inițială	Finalizat
394	PEMBROLIZUMAB	KEYTRUDA	în monoterapie pentru tratamentul carcinomului urotelial local avansat sau metastatic, la adulți cărora li s-a administrat anterior chimioterapie care conține săruri de platină	Finalizat
395	IBRUTINIB	IMBRUVICA	în asociere cu bendamustină și rituximab (BR) în tratamentul pacienților adulți cu LLC cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară	Finalizat
396	OCRELIZUMAB	OCREVUS	Ocrevus este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu forme recurente de scleroză multiplă (SMR), cu boală activă definită prin caracteristici clinice și imagistice	Finalizat
397	DASATINIBUM	Sprycel	SPRYCEL este indicat pentru tratamentul copiilor și adolescenților: ☑ nou-diagnosticați cu LMC Ph+ în fază cronică (LMC Ph+-FC) sau cu LMC Ph+-FC cu rezistență sau intoleranță la terapii anterioare, inclusiv imatinib.	Finalizat
398	ATALUREN	Translarna	Translarna este indicat în tratamentul pacienților ambulatorii cu vârsta de 2 ani și peste cu distrofie musculară Duchenne determinată de o mutație de tip nonsens la nivelul genei distrofinei	Finalizat

399	EVOLOCUMAB	Repatha 140 mg	Se utilizează pentru reducerea nivelurilor de lipide din sânge la pacienți care suferă de hipercolesterolemie primară (niveluri ridicate de colesterol în sânge, provocate de o anomalie genetică), de hipercolesterolemie familială homozigotă (o formă severă de colesterol ridicat în sânge, moștenită de la ambii părinți) și de dislipidemie mixtă (niveluri anormale de diferite lipide, inclusiv colesterol). Medicamentul se utilizează și pentru reducerea riscului de probleme cardiace la pacienții cu ateroscleroză (pereți îngroșați ai arterelor) care au avut un atac de cord, un accident vascular cerebral sau alte probleme ale sistemului circulator (boală cardiacă aterosclerotică). Repatha se utilizează în asociere cu o statină, sau cu o statină și alte medicamente pentru scăderea nivelurilor de lipide. Repatha se poate utiliza și fără statină la pacienții care nu pot lua statine. La unii pacienți este necesară și o dietă slabă în grăsimi.	Finalizat
400	DARATUMUMAB	Darzalex	in asociere cu bortezomib, melfalan si prednison pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu nou diagnosticat si care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem	Finalizat
401	PEMBROLIZUMABUM	Keytruda	limfom Hodgkin clasic, o formă de cancer al limfocitelor (un tip de globule albe). Keytruda se utilizează numai după ce tratamentul cu brentuximab vedotin și transplantul autolog de celule stem (un tip de transplant utilizat pentru a înlocui măduva osoasă cu celulele stem ale pacientului) nu au dat rezultate, ori după ce tratamentul cu brentuximab vedotin nu a dat rezultate și nu este posibilă efectuarea unui transplant	Finalizat
402	REGORAFENIBUM	STIVARGA	Monoterapie pt tratamentul pacientilor adulti cu carcinom hepatocelular , care au fost tratati anterior cu sorafenib.	Finalizat
403	EMICIZUMAB	Hemlibra	tratament profilactic de rutină pentru prevenirea sângerărilor sau reducerea frecvenței episoadelor de sângerare la pacienți cu hemofilie A care prezintă inhibitor de factor VIII	Finalizat
404	INSULINA GLARGINE+LIXISENATIDUM	Suliqua	Suliqua este indicat la adulți, în asociere cu metformină, pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2, pentru a îmbunătăți controlul glicemic atunci când acesta nu a fost obținut cu metformina administrată în monoterapie sau cu metformina administrată în asociere cu un alt medicament antidiabetic oral sau cu insulină bazală	Finalizat
405	INSULINA DEGLUTEC	Tresiba	Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 1 an.	Finalizat
406	DABIGATRAN ETEXILAT	Pradaxa 110 mg Pradaxa 150 mg	ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral sau	Finalizat
407	GOLIMUMABUM	Simponi	Colita ulcerativa	Finalizat
408	NETUPITANTUM+PALONOSTERONUM	Akynzeo	prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen accentuat ce conține cisplatină - prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen moderat.	Finalizat
409	TUOCTOCOG ALFA	Novoeight	Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).	Finalizat
410	PERTUZUMABUM	Perjeta	tratament neoadjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc înalt de recurență si tratament adjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER 2 pozitiv, în stadiu incipient, cu risc înalt de recurență	Finalizat
411	BAZOMIB	NINLARO 2,3 mg capsule NINLARO 3 mg capsule NINLARO 4 mg capsule	Ixazomib, în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu care au urmat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
412	AVELUMABUM	Bavencio	carcinom metastatic cu celulu Merkel	Finalizat
413	CLADRIBINUM	MAVENCLAD 10 mg comprimate	MAVENCLAD este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă (SM) recurentă foarte activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	Finalizat
414	DENOSUMAB	Prolia	tratamentul osteoporozei la femeile in postmenopauza cu risc crescut de fractura dupa tratamentul in initiat cu bifosfonati sau care au intoleranta sau contraindicatie la bifosfonati.	Finalizat
415	Cilostazol	Dilvas	claudicație intermitentă	în așteptare
416	LENALIDOMIDUM	LENALIDOMIDA ALVOGEN 10 mg, 25 mg, 15 mg, 5 mg	Lenalidomidă Alvogen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem. Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomidă Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	Finalizat
417	Cerliponază alfa	Brineura 150 mg soluție perfuzabilă	tratamentul afecțiunii de lipofuscină ceroidă neuronală de tip 2 (LCN2), cunoscută și sub denumirea de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1).	Finalizat

418	Velmanază alfa	Lamzedo 10 mg	Terapia de substituție enzimatică în tratamentul manifestărilor non-neurologice la pacienți cu alfa-manozidoză ușoară până la moderată.	Finalizat
419	SOFOSBUVIRUM +VELPATASVIRUM + VOXILAPREVIRUM	VOSEVI 400 mg/100 mg/100 mg	Vosevi este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitic C (VHC) la adulți	Finalizat
420	COMBINATII(SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM)	EPCLUSA 400mg/100mg	Epclusa este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la adulți	Finalizat
421	BECLOMETASONUM+FORMOTEROLUM	FOSTER NEXTHALER 100/6 micrograme pe doza	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbari repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune.	finalizat
422	Benralizumabum	Fasenra	Fasenra este indicat ca tratament de întreținere la pacienții adulți cu astm bronșic eozinofilic sever, care nu este controlat în mod adecvat prin administrarea inhalatorie a unei doze mari de corticosteroizi plus β-agoniști cu durată lungă de acțiune	Finalizat
423	Empagliflozin	Jardiance	tratamentul adulților cu diabet de tip 2 insuficient controlat, ca adjuvant la dieta și exercițiu fizic și ca monoterapie atunci când metformina este considerată inadecvată din cauza intoleranței în plus față de alte medicamente pentru tratamentul DZ	Finalizat
424	Pembrolizumab	KEYTRUDA	KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al carcinomului pulmonar, altul decât cel cu celule mici(NSCLC, non-small cell lung carcinoma),metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1cu un scor tumoral proporțional (STP)≥50%, fără mutații tumorale EGFR sau ALK pozitive.	Finalizat
425	Turoctocog alfa, factor de coagulare VIII	NovoEight ®	Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).NovoEight poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.	Finalizat
426	Lenalidomidă	Lenalidomidum	Este indicat în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu carora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	Finalizat
427	Trametinib	Mekinist	administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib , este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic , cu mutație BRAF V600	Finalizat
428	Dabrafenib	Tafinlar	administrat în monoterapie sau în asociere cu dabrafenib , este indicat pt tratarea pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastatic , cu mutație BRAF V600	Finalizat
429	Propranololum	Hemangioli	Hemangiomi infantili	Finalizat
430	Burosumabum	CRYSVITA 10 mg	CRYSVITA este indicat pentru tratamentul hipofosfatemiei X-linkate (HXL), cu evidențe radiografice de boală osoasă, la copii cu vârsta de 1 an și peste și adolescenți al căror schelet este în creștere.	Finalizat
431	Lenalidomidă Sandoz	Lenalidomidum	Mielom multiplu Lenalidomidă Alvogen, ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem. Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, (vezi pct. 4.2), este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomidă Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
432	Icatibant	Firazyr	Firazyr este indicat pentru tratamentul simptomatic al crizelor de angioedem ereditar (AEE) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste cu deficit de inhibitor al C1-esterazei.	Finalizat
433	Darvadstrocel	Alofisel	Alofisel este indicat pentru tratamentul fistulelor perianale complexe la pacienții adulți cu boala Crohn	Finalizat
434	Ruxolitinib	Jakavi	tratamentul pacienților adulți cu policitemia vera care prezintă rezistență sau intoleranță la hidroxiuree.	Finalizat
435	Combinatii Dapagliflozin + Metformin	Xigduo	Xigduo este indicat ca tratament adjuvant la dieta și exercițiu fizic pentru a ameliora controlul glicemic la pacienții adulți cu vârsta de 18 ani și peste cu diabet zaharat de tip 2; - la pacienții controlați inadecvat cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie - în asociere cu alte medicamente pentru scăderea glicemiei, inclusiv insulina, la pacienții controlați inadecvat cu metformin - pentru pacienții tratați deja cu asocierea dapagliflozin și metformin sub formă de comprimate separate	Finalizat
436	CRIZOTINIB	XALKORI	tratamentul de primă intenție al adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK pozitiv).	Finalizat

437	Guselkumab	Tremfya	Tremfya este indicat in tratamentul psoriazisului in placi, formele moderate pana la severe, la pacientii care sunt eligibili pentru terapia sistemica.	Finalizat
438	combinatii darunavir+cobicistat + emtricitabina + tenofovir alafenamida	Symtuza	Symtuza este indicat pentru tratamentul infectiei cu virusul imunodeficientei umane tip 1 (HIV-1) la adulti si adolescenti (cu varsta de 12 ani si peste, cu greutate corporala de cel putin 40 kg)	Finalizat
439	Blinatumomab	Blincto	monoterapie pentru tratamentul adultilor cu LLA precursor de celula B, cu cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitiv, in prima sau a doua remisie completa cu boala minima reziduala (minimal residual disease, MRD) mai mare sau egala cu 0,1%	Finalizat
440	Migalastat	GALAFOLD	Migalastat este indicat pentru tratamentul de lunga durata al adultilor si adolescentilor in varsta de cel putin 16 ani, cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficit de alfa-galactozidaza A) si care prezinta o mutatie sensibila	Finalizat
441	Brentuximab Vedotin	ADCETRIS	Adcetris este indicat pentru pacientii adulti cu limfom Hodgkin (LH) CD30+ stadiu IV, netratat anterior, in asociere cu doxorubicina, vinblastina si dacarbazina (AVD)	Finalizat
442	Fampridinum	Fampyra	iiimbanatirea mersului la pacientii adulti cu scleroza multipla care prezinta invaliditate (EDSS4-7)	Finalizat
443	Pomalidomida	IMNOVID	in asociere cu dexametazona pentru tratamentul pacientilor adulti cu mielom multiplu recidivat si refractar, carora li s-au administrat cel putin doua regimuri terapeutice anterioare, incluzand lenalidomida si bortezomib si care au prezentat progresia bolii la ultimul tratament	Finalizat
444	Avelumabum	Bavencio	carcinom metastatic cu celule Merkel	Finalizat
445	Comb (Ledipasvirum+Sofosbuvirum)	Harvoni	tratamentul hepatitei C cronice (HCC) la adolescenti cu varsta cuprinsa intre 12 si < 18 ani	Finalizat
446	Ixekizumabum	TALTZ	tratamentul artritei psoriazice active la adulti la care raspunsul terapeutic a fost inadecvat sau a demonstrat intoleranta dupa administrarea unuia sau a mai multor medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (DMARD)	Finalizat
447	Ixekizumabum	TALTZ	tratamentul psoriazisului in placi moderat pana la sever la adultii care sunt eligibili pentru terapie sistemica si care prezinta pe langa diagnosticul principal psoriazis afectare articulara	Finalizat
448	Patisiran	ONPATTRO	tratamentul amiloidozei ereditare mediata de transtiretina (amiloidoza hATTR) la pacientii adulti cu polineuropatie de stadiu 1 sau stadiu 2	Finalizat
449	Nivolumab	OPDIVO	in monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastazat la care s-a efectuat rezectie completa	Finalizat
450	Pembrolizumabum	Keytruda	pacienti adulti cu carcinom pulmonar, altul decat cel cu celule mici (NSCLC, non-small lung cancer) metastatic, scuamos, ale caror tumori nu prezinta mutatii EGFR sau ALK pozitive si care pot fi tratati cu medicamentul Keytruda in asociere cu carboplatina si fie paclitaxel, fie nab-paclitaxel	Finalizat
451	Abemaciclibum	Verzenios	trat femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv si receptor c pentru factorul de crestere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, in asociere cu fulvestrant ca tratament hormonal initial sau la femei carora li s-a administrat anterior tratament hormonal	Finalizat
452	Abemaciclibum	Verzenios	tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv si receptor pentru factorul de crestere epidermal uman 2 (HER 2) negativ, in asociere cu inhibitor de aromataza ca tratament hormonal initial sau la femei carora li s-a administrat anterior tratamentul hormonal	Finalizat
453	Obinutuzumab	Gazyvaro	tratamentul pacientilor cu limfom folicular in forma avansata ,netratati anterior	Finalizat
454	VENETOCLAX	VENCLYXTO	Venclyxto administrat în asociere cu rituximab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) care au primit anterior cel puțin un tratament.	Finalizat
455	Durvalumabum	Imfinzi	in monoterapie este indicat in tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decat cel cu celule mici (NSCLC) local avansat, inoperabil, pentru pacienti adulti ale caror tumori exprima PD-L1 la ≥1% dintre celulele tumorale si a caror boala nu a progresat dupa radio-chimioterapie cu compusi pe baza de platina	Finalizat
456	TISAGENLECLEUCEL	KYMRIAH	tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz, cu celulă mare de tip B, recidivant sau refractar (DLBCL), după două sau mai multe linii de terapie sistemică	Finalizat
457	TRAMETINIB	MEKINIST	Trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	Finalizat
458	DABRAFENIB	TAFINLAR	Dabrafenib în asociere cu trametinib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	Finalizat
459	TISAGENLECLEUCEL	KYMRIAH	tratamentul pacienților copii și adolescenți și pacienților adulți tineri, cu vârsta cuprinsă până la 25 ani, cu leucemie acută limfoblastică (LAL) cu celule B, refractar, în remisie post-transplant sau în a doua sau a treia recidivă	finalizat

460	Semaglutidum	Ozempic	Ozempic este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dieta și exerciții fizice: - sub forma de monoterapie atunci când administrarea de metformin este considerată inadecvată din cauza intoleranței sau a contraindicațiilor - în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat	Finalizat
461	Agalsidasum Alfa	Replagal	indicat pentru terapia de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu diagnostic confirmat de boala Fabry (deficiența de alfa-galactosidază A)	Finalizat
462	Irinotecan lipozomal	ONIVYDE 4,3 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Tratamentul adenocarcinomului pancreatic metastazat, în asociere cu 5-fluorouracil (5-FU) și leucovorin (LV), la pacienți adulți la care afecțiunea a progresat sub tratament pe bază de gemcitabină.	Finalizat
463	Sirolimus	Rapamune	Rapamune este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfangioleiomiomatoză sporadică, cu boală pulmonară moderată sau funcție pulmonară în declin	Finalizat
464	Dupilumab	Dupixent	Tratamentul dermatitei atopice forma moderată până la severă la pacienții adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Finalizat
465	Everolimus	Votubia	Tratamentul adjuvant al pacienților cu vârsta de 2 ani și peste această vârstă, ale căror convulsii referăre, cu debut parțial, cu sau fără generalizare secundară, sunt asociate cu complexul sclerozei tuberoase (CST)	Finalizat
466	Apomorfina	APO-GO	trat. Fluctuțiilor motorii la pac. cu b. Parkinson	Finalizat
467	Caplacizumab	Cablivi	Tratamentul adulților care manifestă un episod de purpură trombocitopenică trombocitopenică dobândită (PTTd), în asociere cu plasmafereză și tratament imunosupresor	Finalizat
468	Pegaspargum	ONCASPAR	indicat ca o componentă a terapiei combinate antineoplazice în leucemia limfoblastică acută (LAL) la copii și adolescenți de la naștere până la 18 ani și la pacienții adulți	Finalizat
469	Elmoroctocog alfa	Elocta	tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII). Elocta poate fi utilizată la toate grupele de vârstă	finalizat
470	Comb (Bictegravir+Emtricitabina+Tenofovir alafenamida)	Biktarvy	imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) fără evidente prezente sau anterioare de rezistență virală la clasa inhibitorilor	Finalizat
471	Insulinum degludec	Tresiba	tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 1 an	Finalizat
472	Rosuvastatină+perindopril+indapamidă	Roxiper	tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale, și care prezintă și una dintre următoarele afecțiuni concomitente: hipercolesterolemie primară (tip IIa incluzând hipercolesterolemie familială heterozigotă), dislipidemia mixtă (tip IIb) sau hipercolesterolemie familială homozigotă	finalizat
473	Pembrolizumabum	Keytruda	Introducere în compensare ambalaj nou	Finalizat
474	Lurasidona	Latuda	tratamentul este indicat pentru tratamentul schizofreniei la adulți cu vârsta de 18 ani sau mai mare	Finalizat
475	Sunitinib	Sutent	Sutent este indicat pentru tratamentul tumorilor neuroendocrine pancreatice (pNET) bine diferențiate, nerecercabile sau metastatice, la adulți care au prezentat progresia bolii.	Finalizat
476	Lenalidomide Accord	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.	Finalizat
477	Lenalidomide Accord	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	finalizat
478	Dinutuximab beta	Qarziba 4,5 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	Qarziba este indicat pentru tratamentul neuroblastomului cu grad mare de risc la pacienții cu vârsta peste 12 luni, cărora li s-a administrat anterior chimioterapie de inducție și care au obținut cel puțin un răspuns parțial, urmat de terapie mieloablativă și transplant de celule stem, precum și la pacienții cu antecedente de neuroblastom recurent sau rezistent, cu sau fără boală reziduală. Înaintea tratamentului pentru neuroblastom recurent, orice boală activă care progresează trebuie stabilizată prin alte măsuri adecvate. În cazul pacienților cu antecedente de boală recurentă/rezistentă și al pacienților care nu au obținut un răspuns complet după terapia de primă linie, Qarziba trebuie administrat în asociere cu interleukină-2 (IL-2)	Finalizat
479	AFATINIBUM	GIOTRIF 20 mg comprimate filmate GIOTRIF 30 mg comprimate filmate GIOTRIF 40 mg comprimate filmate	GIOTRIF este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC), avansat local sau metastazat, cu mutație(i) activatoare a(ale) EGFR, netratați anterior cu Receptorul Factorului de Creștere Epidermal (EGFR) TK	finalizat

480	DULAGLUTIDUM	TRULICITY	Trulicity este indicat la adulți cu diabet zaharat tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic sub formă de: Monoterapie Când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienți pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. Terapie combinată În combinație cu alte medicamente hipoglicemice, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	finalizat
481	Olaparibum	Lynparza	Monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivat cu mutație BRCA (germinală și/sau somatică) neoplazie de trompa uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe baza de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe baza de platină)	Finalizat
482	Lenalidomidum	Lenalidomidă Alvogen	Lenalidomidă Alvogen, ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant.	Finalizat
483	Lenalidomidum	Lenalidomidă Alvogen	Lenalidomida Alvogen este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	Finalizat
484	Cresemba	Isavuconazolum	Cresemba este indicat la adulți pentru tratamentul mucormicozei la pacienții la care amfotericina B este inadecvată	finalizat
485	Cresemba	Isavuconazolum	Cresemba este indicat la adulți pentru tratamentul aspergilozei invazive	finalizat
486	Briviact	brivaracetam	indicat ca terapie adjuvantă în tratamentul crizelor convulsive parțiale, cu sau fără generalizare secundară, la pacienți epileptici, adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 4 ani.	finalizat
487	Ivacaftor	Kalydeco	Kalydeco comprimate este indicat pentru tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC) cu vârsta de 6 ani și peste și cu greutatea de 25 kg sau mai mult, care prezintă una dintre următoarele mutații de sincronizare (clasa III) la nivelul genei CFTR: G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N sau S549R	finalizat
488	Lenalidomidum	Lenalidomida Sandoz	indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	finalizat
489	Gefitinib	Gefitinib Glenmark	tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici NSCLC avansat loco-regional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozininkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR_TK	Finalizat
490	Ticagrelorom	Brilique	Administrat în asociere cu acid acetilsalicilic (AAS), este indicat pentru prevenția evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți cu sindrom coronarian acut (angină instabilă, infarct miocardic fără supradenivelare de segment ST [NSTEMI] sau infarct miocardic cu supradenivelare de ST [STEMI]); pacienți tratați prin proceduri intervenționale percutane (PCI) numai după implantarea unei proteze endovasculare (stent)	Finalizat
491	Crizotinibum	Xalkori	În monoterapie este indicat pentru:Tratamentul adulților cu neoplasm bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, tratat anterior, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK-pozitiv)	Finalizat
492	Nivolumab/Ipilimumab	Opdivo/Yervoy	Opdivo în asociere cu Ipilimumab este indicat pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat cu pronostic intermediar/nefavorabil, la adulți	Finalizat
493	Dolutegravir/Lamivudina	Dovato	tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane (HIV) tip 1 la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani și greutate corporală de minim 40 kg, fără rezistență documentată sau suspectată clinic la clasa inhibitorilor de integrază sau faza de lamivudina	Finalizat
494	Telotristat	Xermelo	indicat pentru tratamentul diareei din cadrul sindromului carcinoizid, în combinație cu terapie cu analog de somatostatina (ASS), la adulții care nu sunt controlați în mod corespunzător prin terapie cu ASS>	finalizat
495	Lenalidomidum	Lenalidomida Glenmark	ca tratament combinat, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu netratat anterior care nu sunt eligibili pentru transplant. Lenalidomida este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior	finalizat
496	Dolutegravir/Rilpivirina	Juluca	indicat pentru tratamentul infecției cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) la adulți care prezintă supresie virologică (ARN HIV-1 <50 copii/ml) în prezența unui regim antiretroviral stabil timp de minimum șase luni, care nu au antecedente de eșec virologic și rezistență cunoscută sau suspectată la inhibitori non-nucleozidici de revertranscriptază sau la inhibitori de integrază	Finalizat

497	Ramucirumabum	Cyramza	în monoterapie este indicat în tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular în stadiu avansat sau nerezeceabil cu o valoare a alfa fetoproteinei serice (AFP) ≥ 400 ng/ml, care au fost tratați anterior cu sorafenib.	Finalizat
498	inhibitor de esteraza C1, umana	Cinryze	Tratamentul și prevenția pre-procedurală a episoadelor de angioedem la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 2 ani și peste) cu angioedem ereditar (AEE). Prevenția de rutină a episoadelor de angioedem la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta de 6 ani și peste) cu crize severe și recurente de angioedem ereditar (AEE), care prezintă intoleranță la tratamentele orale preventive sau sunt insuficient protejați de acestea, sau la pacienți a căror stare este inadecvat controlată prin tratamente de fază acută aplicate în mod repetat	Finalizat
499	inotuzumab ozogamicin	Besponsa	indicat ca monoterapie pentru tratamentul adulților cu leucemie acută limfoblastică recidivată sau refractară (LAL) cu precursori de celule B pozitive pentru CD22. Pentru pacienții adulți cu LAL cu precursori de celule B cu cromozom Philadelphia pozitiv (Ph+) recidivată sau refractară, la care tratamentul cu cel puțin un inhibitor de tirozin-kinază (ITK) să fi eșuat.	Finalizat
500	Mercaptamine (cysteamine bitartrate)	Procysbi	este indicat pentru tratamentul cistinozei nefropatice confirmate. Cisteamina reduce acumularea de cistină în unele celule (de exemplu leucocite, celule musculare și hepatice) la pacienții cu cistinoză nefropatică și întârzie dezvoltarea insuficienței renale, în cazul în care tratamentul este inițiat în primele faze ale bolii.	Finalizat
501	LETERMOVIRUM	PREVYMIS 240 mg	este indicat în tratamentul profilactic al reactivării infecției cu virusul citomegalic (CMV) și al bolii induse de virusul citomegalic la adulți CMV-seropozitivi [R+] la care s-a efectuat un transplant alogen de celule stem hematopoietice (TCSH).	Finalizat
502	Tofacitinib	Xeljanz	indicat în tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă (CU) activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns inadecvat, au pierdut răspunsul terapeutic sau nu au tolerat fie tratamentul convențional, fie un agent biologic	Finalizat
503	Tofacitinib	Xeljanz	în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice (APs) active la pacienții adulți care au avut un răspuns inadecvat, sau care nu au tolerat un tratament anterior cu un medicament antireumatic modificator al bolii (DMARD)	Finalizat
504	Glecaprevir/Pibrentasvir	Maviret	indicat pentru tratamentul hepatitei cronice cu virus C (HCC) la adulți și la adolescenți cu vârsta de 12 ani până la	Finalizat
505	Simoctocog alfa	Nuwiq	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).	Finalizat
506	Atorvastatinum+Ezetimibum	Zentovar	Tratament adjuvant la regimul alimentar ca tratament de substituție pentru tratamentul adulților cu hipercolesterolemie primară (heterozigotă sau homozigotă, familială și non-familială) sau hiperlipidemie mixtă deja controlată sub tratament cu atorvastatină și ezetimib administrate concomitent în aceleași doze	Finalizat
507	Brigatinibum	Aunbrig	este indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar non-microcelular (CPNMC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), tratați anterior cu crizotinib.	Finalizat
508	Baricitinib	Olumiant 2 mg	indicat în tratamentul poliartritei reumatoide active moderată până la severă la pacienți adulți care nu au răspuns adecvat sau care au intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală . Olumiant poate fi administrat ca monoterapie sau în asociere cu metotrexat	Finalizat
509	Certolizumab pegol	Cimzia	psoriazis in placi	Finalizat
510	Lumacaftor/Ivacaftor	Orkambi	tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC), cu vârsta de 12 ani și peste, cu genotip homozigot pentru mutația F508del la nivelul genei CFTR	Finalizat
511	Pancreatinum	Kreon	Tratamentul insuficienței pancreatice exocrine	Finalizat
512	Secukinumab	Cosentyx	indicat în tratamentul spondilitei anchilozante active la adulții care nu au răspuns corespunzător la terapia convențională.	Finalizat
513	Cerliponasum Alfa	Brineura	Brineura este indicat pentru tratamentul afecțiunii de lipofuscinoză ceroidă neuronală de tip 2 (LCN2), cunoscută și sub denumirea de deficit de tripeptidil peptidază 1 (TPP1).	Finalizat
514	EDOXABANUM	Roteas 30 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți	Finalizat
515	EDOXABANUM	Roteas 60 mg	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți	Finalizat
516	EDOXABANUM	Roteas 30 mg	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă ≥ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente.	Finalizat

517	EDOXABANUM	Roteas 60 mg	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă ≥ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente.	Finalizat
518	DORAVIRINUM	Pifeltro	Pifeltro este indicat, în asociere cu alte medicamente antiretrovirale, pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență la compuși din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)) în antecedente sau în prezent	Finalizat
519	DORAVIRINUM+LAMIVUDINUM+TENOFIVIRUM DISOPROXIL	DELSTRIGO 100 mg/300 mg/245 mg	Delstrigo este indicat pentru tratamentul infecției cu virusul HIV-1 la adulți, fără dovezi de rezistență în antecedente sau în prezent la compuși din clasa inhibitorilor non-nucleozidici de reverstranscriptază (INNRT; Non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors (NNRTIs)), lamivudină, sau tenofovir	Finalizat
520	LIRAGLUTIDUM	VICTOZA	Victoza este indicat pentru tratamentul adulților, adolescenților și copiilor cu vârsta de 10 ani și peste, cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice: în asociere cu metformin și insulina	Finalizat
521	LENALIDOMIDUM	LENALIDOMIDA GLENMARK	Lenalidomidă Glenmark este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior.	finalizat
522	RISANKIZUMABUM	Skyrizi 75 mg soluție injectabilă în seringă preumplută	Skyrizi este indicat în tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Finalizat
523	PALIVIZUMABUM	Synagis	Synagis este indicat pentru prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare, determinate de virusul sincițial respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR: Copii născuți la 35 săptămâni de gestație sau mai puțin și cei cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR. Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni.	finalizat
524	Abirateronum	Zytiga	este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în: tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy)	Finalizat
525	INHIBITOR DE ESTERAZA C1, UMANA	Berinert	Angioedem ereditar tip I și II (AEE) Tratamentul și procedura de prevenire prealabilă a episoadelor acute.	finalizat
526	Insulinum glarginum	Toujeo/Lantus	Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii începând cu vârsta de 6 ani.	Finalizat
527	PATISIRANUM	ONPATTRO	Onpattro este indicat pentru tratamentul amiloidozei ereditare mediate de transtiretină (amiloidoză hATTR) la pacienții adulți cu polineuropatie de stadiu 1 sau stadiu 2.	Finalizat
528	Eltrombopag	REVOLADE	Revolade este indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste, cu trombocitopenie imună primară (TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	finalizat
529	Rituximabum	Mabthera	MabThera, administrat în asociere cu glucocorticoizi, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu granulomatoză cu poliangită (Wegener) (GPA) activă, severă și poliangită microscopică (MPA).	finalizat
530	Cabozatinib	Cabometyx	indicat ca monoterapie pentru tratamentul carcinomului hepatocelular (CHC) la adulți care au fost tratați anterior cu sorafenib.	finalizat
531	Ustekinumab	Stelara	este indicat pentru tratamentul pacienților copii și adolescenți cu vârsta de 6 ani și peste, cu psoriazis în plăci, forme moderate până la severe, care nu obțin un control adecvat sau prezintă intoleranță la alte terapii sistemice sau fototerapii	finalizat
532	Daratumumab	Darzalex	în asociere cu lenalidomidă și dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu nou diagnosticat și care nu sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem în asociere cu bortezomib, talidomidă și dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu nou diagnosticat și care sunt eligibili pentru transplant autolog de celule stem	Finalizat
533	Ibrutinib	Imbruvica	indicat ca monoterapie sau în asociere cu obinutuzumab în tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratați anterior IMBRUVICA în asociere cu rituximab este indicat în tratamentul pacienților adulți cu MW.	Finalizat
534	Ibrutinib	Imbruvica	Introducerea unei forme farmaceutice noi	Finalizat

535	Alirocumab	Praluent	Boală cardiovasculară aterosclerotică stabilită - Praluent este indicat la adulți cu boală cardiovasculară aterosclerotică stabilită pentru reducerea riscului cardiovascular prin scăderea valorilor LDL-colesterolului (LDL-C), ca tratament adjuvant la corectarea altor factori de risc: - în asociere cu statină administrată în doză maximă tolerată, împreună cu sau fără alte terapii hipolipemiente sau, - singur sau în asociere cu alte terapii hipolipemiente la pacienții care nu tolerează statinele sau la care este contraindicată administrarea de statine.	finalizat
536	Trastuzumab emtasine	Kadcyla	Cancer mamar incipient ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu cancer mamar HER2-pozitiv incipient, care prezintă boală invazivă reziduală, la nivel mamar și/sau	finalizat
537	Comb (insuline glargine + lixisenatidum)	Suliqua	indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 insuficient controlat, pentru a îmbunătăți controlul glicemic, ca adjuvant al dietei și exercițiului fizic, adăugat la metformina administrată în asociere cu sau fără inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT-2)	Finalizat
538	Rurioctocog alfa pegol	Adynovi	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).	finalizat
539	Imunoglobulină umană normală	HyQvia	Terapie de substituție la adulți, adolescenți și copii (0-18 ani) în: ▯ Sindroame de imunodeficiență primară cu producere de anticorpi afectată	Finalizat
540	Eptacog alfa activatum	NovoSeven	indicat pentru tratamentul episoadelor de sângerare și pentru prevenirea sângerării legate de proceduri invazive sau intervenții chirurgicale la următoarele grupuri de pacienți: • pacienți cu hemofilie ereditară și valori ale inhibitorilor factorilor de coagulare VIII sau IX cu titru > 5 unități Bethesda (UB) • pacienți cu hemofilie ereditară la care se așteaptă un răspuns anamnestic intens la administrarea de factor VIII sau IX • pacienți cu hemofilie dobândită • pacienți cu deficit congenital de factor VII	Finalizat
541	Teduglutidum	Revestive	indicat în tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste cu sindrom de intestin scurt (SIS). Pacienții trebuie să fie stabili după o perioadă de adaptare intestinală după chirurgie.	Finalizat
542	Somatropin	Genotropin	tratamentul tulburărilor de creștere la copii și adulți	finalizat
543	Dapagliflozinum	Forxiga	ca tratament adjuvant (tripla terapie orală) asociat cu metformin și sulfoniluree	finalizat
544	Dupilumab	Dupixent	indicat la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, ca tratament adjuvant de întreținere pentru astm bronșic sever, însoțit de inflamație de tip 2 caracterizată prin eozinofilie și/sau valori crescute ale FeNO și inadecvat controlat cu doze medii până la mari de corticosteroidi inhalatori plus un alt medicament utilizat ca tratament de întreținere.	finalizat
545	Belimumabum	Benlysta	indicat ca tratament asociat la terapiile existente la pacienții cu vârsta de 5 ani și peste cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, cu autoanticorpi pozitivi, cu un grad înalt de activitate a bolii (de exemplu anticorpi anti-ADNdc pozitivi și complement seric scăzut) în ciuda terapiei standard	Finalizat
546	Triptorelinum	Diphereline	Tratamentul carcinomului de prostată metastazat. Endometrioză genitală și extragenitală Infertilitate la femei Tratament preoperator al fibromului uterin Cancer de sân	finalizat
547	Olaparibum	Lynparza	indicat în monoterapie la pacienți adulți cu mutații germinale ale genei BRCA1/2, cu neoplasm mamar în stadiu local avansat sau metastatic, HER2 negativ. Pacienții trebuiau să fi fost tratați anterior cu antraciclina și taxan în context (neo)adjuvant sau metastatic, cu excepția situației în care pacienții nu aveau indicație pentru aceste tratamente	Finalizat
548	Tocilizumab	RoActemra	adaugare forma farmaceutica intravenoasa	Finalizat
549	Ribociclib	Kisquali	tratamentul femeilor cu cancer mamar, în stadiu avansat local sau metastatic, cu receptori hormonalni (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică (HER2), în asociere cu fulvestrant, ca terapie hormonală inițială, sau la femei cărora li s-a administrat terapie hormonală anterioară.	finalizat
550	Ustekinumab	Stelara	indicat în tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratament sau au dezvoltat intoleranță la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie la contraindicații medicale la aceste terapii	retras
551	Cemiplimabum	Libtayo	indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu carcinom cutanat cu celule scuamoase metastazat sau local avansat, care nu sunt candidați eligibili pentru intervenție chirurgicală în scop curativ sau radioterapie în scop curativ.	finalizat
552	Cladribina	Mavenclad	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă (SM) recurentă foarte activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	Finalizat

553	Polatuzumab Vedotin	Polivy	în asociere cu bendamustină și rituximab, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz cu celulă mare B (DLBCL) recidivat/refractor, care nu sunt candidați pentru transplantul de celule stem hematopoietice.	finalizat
554	Ruxolitinibum	Jakavi	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu policitemia vera care prezintă rezistență sau intoleranță la hidroxiuree.	Finalizat
555	Omalizumab	Xolair	indicat ca tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienți adulți și adolescenți (12 ani și peste această vârstă), cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1.	finalizat
556	Empagliflozinum	Jardiance	în asociere cu insulina cu sau fara administrare concomitentă de metformina pentru tratamentul pacienților adulți cu diabet zaharat de tip 2 pentru îmbunătățirea controlului glicemic când acestea împreună cu dieta și exercitiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat	Finalizat
557	Venetoclax	Venclyxto	administrat în asociere cu obinutuzumab este indicat în tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior	finalizat
558	Apalutamidum	Erleada	în tratamentul cancerului de prostată non-metastatic rezistent la castrare (nmCRPC, nonmetastatic castration-resistant prostate cancer) la bărbați adulți, care prezintă un risc crescut de a dezvolta boală metastatică	finalizat
559	Olaparibum	Lynparza	indicat în monoterapie ca tratament de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian seros epitelial de grad înalt recidivat cu mutație BRCA (germinală și/sau somatică), neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară, sensibile la medicamente pe bază de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe bază de platină.	Finalizat
560	Semaglutidum	Rybelsus	indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2, insuficient controlat pentru îmbunătățirea controlului glicemic, ca terapie adăugată la dietă și exerciții fizice • sub formă de monoterapie atunci când administrarea de metformin este considerată inadecvată din cauza intoleranței sau contraindicațiilor • în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat.	finalizat
561	Nintedanibum	Ofev	indicat la adulți pentru tratamentul altor boli pulmonare interstițiale fibrozante cronice (BPI) cu fenotip progresiv	finalizat
562	Tildrakizumabum	Ilumetri	indicat pentru tratamentul adulților cu psoriazis în plăci moderat până la sever care sunt candidați pentru terapie sistemică.	Finalizat
563	Midostaurinum	Rydapt	în tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă (MSA), mastocitoză sistemică cu neoplazie hematologică asociată (MS-NHA) sau leucemie cu mastocite (LCM) în monoterapie.	Finalizat
564	Parathyroid hormone	Natpar	indicat ca tratament adăugat la pacienții adulți cu hipoparatiroidism cronic, care nu poate fi controlat în mod adecvat doar cu terapia standard.	finalizat
565	Gefitinib	Gefitinib Alvogen	indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non-small cell lung cancer)), avansat locoregional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozinkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR-TK	finalizat
566	Atezolizumab	Tecentriq	în asociere cu carboplatină și etopozidă, este indicat pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extensiv (extensive-stage small cell lung cancer, ES-SCLC), la pacienți adulți	finalizat
567	Lenalidomidum	Lenalidomide Accord	ca monoterapie, este indicat pentru tratamentul de întreținere al pacienților adulți cu mielom multiplu nou-diagnosticat care au fost supuși transplantului autolog de celule stem.	Finalizat
568	Gefitinib	Gefitinib Accord	în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC (non small cell lung cancer)), avansat locoregional sau metastatic, ale căror tumori exprimă mutații ale tirozinkinazei receptorului factorului de creștere epidermal uman EGFR-TK	finalizat
569	Apomorfium	APO-GO	tratamentul fluctuațiilor motorii (fenomenul "on-off"), la pacienții cu boala Parkinson, care nu sunt suficient de controlate de medicamente antiparkinsoniene administrate oral.	finalizat
570	Tolvaptan	Jinarc	indicat în încetinirea progresiei dezvoltării chisturilor și insuficienței renale în boala polichistică renală cu transmitere autozomal dominantă (BPRTAD) la adulți cu insuficiență renală cronică (IRC) stadiul 1 până la 4 la inițierea tratamentului, cu dovezi de progresie rapidă a bolii	finalizat
571	Alemtuzumab	Lemtrada	indicat ca tratament unic modulator al evoluției bolii la adulți cu scleroză multiplă recurent remisivă foarte activă (SMRR) pentru următoarele grupe de pacienți: • Pacienți cu boală foarte activă în ciuda administrării unui ciclu complet și adecvat cu minimum un tratament modulator al evoluției bolii (DMT) sau • Pacienți cu scleroză multiplă recurent remisivă severă cu evoluție rapidă, definită pe baza următoarelor criterii: 2 sau mai multe recidive care produc invaliditate în decurs de un an, cu 1 sau mai multe leziuni hipercaptante de gadolinium la examinarea RMN cerebrală sau o creștere semnificativă a încărcării lezionale în secvența T2 comparativ cu o examinare RMN anterioară recentă.	finalizat

572	Comb (Beclometazona + Formoterol)	Foster 100/6	Tratamentul simptomatic al pacienților cu bronhopneumopatie cronică obstructivă severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune/ soluție de inhalat	finalizat
573	Comb (Beclometazona + Formoterol)	Foster 100/6	Tratamentul simptomatic al pacienților cu bronhopneumopatie cronică obstructivă severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune/ soluție de inhalat/ pulbere de inhalat	finalizat
574	Osimertinibum	Tagrisso	adaugare concentratie noua	finalizat
575	Denosumab	Xgeva	Prevenirea evenimentelor asociate sistemului osos (fractură patologică, iradiere la nivel osos, compresie la nivelul coloanei vertebrale sau intervenție chirurgicală la nivel osos) la adulți cu afecțiuni maligne în stadiu avansat, cu interesare osoasă	finalizat
576	Dabrafenib	Tafinlar	Dabrafenib în asociere cu trametinib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă. Trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	finalizat
577	Ecuzumab	Soliris	indicat pentru tratarea adulților și copiilor cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN). Dovezi privind beneficiile clinice sunt demonstrate la pacienții cu hemoliză cu simptom(e) clinic(e) ce indică o activitate intensă a bolii, indiferent de antecedentele legate de transfuzii	finalizat
578	Dabigatran etexilat	Pradaxa	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârsta ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă, (NYHA≥ II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	finalizat
579	Dipropionat de beclometazona anhidru/fumarat de formoterol dihidrat	Foster 100/6	indicat în tratamentul de fond al astmului bronșic atunci când utilizarea unei combinații (glucocorticoid inhalator și agonist beta2- adrenergic cu durată lungă de acțiune) este adecvată: - pacienți care nu au răspuns corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2- adrenergic cu durată scurtă de acțiune administrat la nevoie sau - pacienți care au răspuns deja corespunzător la tratamentul cu glucocorticoid inhalator și agonist beta2- adrenergic cu durată lungă de acțiune.	finalizat
580	Fingolimod	Gilenya	indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroză multiplă recidivantăremitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți și pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 10 ani și peste: - Pacienți cu boală extrem de activă în ciuda administrării unei scheme complete și adecvate de tratament, cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții și informații privind perioadele de eliminare completă, vezi pct. 4.4 și 5.1). sau - Pacienți cu scleroză multiplă recidivantă-remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive debilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	finalizat
581	Fingolimod	Gilenya	indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroză multiplă recidivantăremitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți și pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 10 ani și peste: - Pacienți cu boală extrem de activă în ciuda administrării unei scheme complete și adecvate de tratament, cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții și informații privind perioadele de eliminare completă, vezi pct. 4.4 și 5.1). sau - Pacienți cu scleroză multiplă recidivantă-remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive debilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	finalizat
582	Fingolimod	Gilenya	indicat ca unic tratament de modificare a bolii pentru scleroză multiplă recidivantăremitentă extrem de activă la următoarele grupe de pacienți adulți și pacienți copii și adolescenți cu vârsta de 10 ani și peste: - Pacienți cu boală extrem de activă în ciuda administrării unei scheme complete și adecvate de tratament, cu cel puțin un tratament de modificare a bolii (pentru excepții și informații privind perioadele de eliminare completă, sau - Pacienți cu scleroză multiplă recidivantă-remitentă severă, cu evoluție rapidă, definită de 2 sau mai multe recidive debilitante într-un an și 1 sau mai multe leziuni cu captare de Gadolinium la RMN cranian sau o creștere semnificativă a leziunilor T2 comparativ cu cel mai recent RMN.	finalizat
583	Ustekinumab	Stelara	indicat în tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai răspundă sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la antagoniști TNFα, sau aceste tratamente le sunt contraindicate din punct de vedere medical.	finalizat

584	Ustekinumab	Stelara	indicat în tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratament sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie au contraindicații medicale la aceste terapii	finalizat
585	Atezolizumab	Tecentriq	Tecentriq în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului urotelial (CU) local avansat sau metastazat, la pacienți adulți care nu sunt considerați eligibili pentru tratamentul cu cisplatină și ale căror tumori prezintă un nivel înalt de expresie a PD-L $\geq 5\%$	finalizat
586	Eltrombopag	REVLADE	indicat la pacienții adulți cu anemie aplastică severă dobândită (AAS), care au fost fie refractari la terapie imunosupresoare anterioară, fie tratați anterior în mod excesiv și care nu sunt eligibili pentru transplant de celule stem hematopoietice	finalizat
587	Ustekinumab	Stelara	în monoterapie sau în asociere cu MTX este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu artrită psoriazică activă care au avut un răspuns insuficient la tratamentul anterior cu medicamente antireumatice non-biologice modificatoare ale evoluției bolii (MARMB)	finalizat
588	Givosiran	Givlaari	indicat pentru tratamentul porfiriei hepatice acute (PHA) la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste.	finalizat
589	Combinatii (Enalaprilum+Lercanidipinum)	Lercaril 10 mg /10 mg	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții a căror tensiune arterială nu este controlată în mod adecvat cu lercanidipină 10 mg, administrată în monoterapie.	finalizat
590	Combinatii (Enalaprilum+Lercanidipinum)	Lercaril 20 mg /10 mg	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții a căror tensiune arterială nu este controlată în mod adecvat cu doza de enalapril de 20 mg, administrată în monoterapie.	finalizat
591	Combinatii (Enalaprilum+Lercanidipinum)	Lercaril 20 mg /20 mg	Tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții adulți a căror tensiune arterială este controlată în mod adecvat cu asocierea enalapril 20 mg - lercanidipină 20 mg, substanțele active fiind administrate sub formă de comprimate separate.	finalizat
592	Edoxabanum	Roteas 30 mg comprimate filmate	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP), prevenirea TVP și EP recurente la adulți	finalizat
593	Edoxabanum	Roteas 30 mg comprimate filmate	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiență cardiacă congestivă, hipertensiune arterială, vârstă ≥ 75 de ani, diabet zaharat, accident vascular cerebral sau accident ischemic tranzitoriu (AIT) în antecedente	finalizat
594	Pembrolizumab	Keytruda	Indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiu III și extindere la nivelul ganglionilor limfatici, la care s-a efectuat rezecție completă	finalizat
595	Tivozanib	Fotivda	indicat în tratamentul de primă linie la pacienții adulți cu carcinom renal (CR) (renal cell carcinoma RCC) în stadiu avansat și la pacienții adulți netratați anterior cu inhibitori ai c-ăii VEGFR și mTOR, în caz de progresie a bolii după un tratament anterior cu citokine pentru RCC în stadiu avansat.	finalizat
596	Lenalidomidum	Lenalidomida Sandoz	indicat în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu carora li s-a administrat cel puțin un tratament anterior și pentru adulți cu mielom multiplu netratat anterior, care nu sunt eligibili pentru transplant	finalizat
597	Propranololum	Hemangiol 3,75 mg/ml soluție orală	Hemangiom infantil	finalizat
598	Atezolizumab	Tecentriq	În asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ (TNBC) nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, ale căror tumori prezintă o expresie a PD-L1 $\geq 1\%$ și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică.	finalizat
599	Infliximab	Remsima	tratamentul bolii Crohn activă moderată până la severă, la pacienți adulți care nu au prezentat răspuns terapeutic în pofida efectuării unei cure terapeutice complete și adecvate cu un corticosteroid și/sau un imunosupresor; sau care nu tolerează sau prezintă contraindicații pentru astfel de terapii. • tratamentul bolii Crohn active, fistulizate, la pacienți adulți care nu au prezentat răspuns terapeutic în pofida efectuării unei cure terapeutice complete și adecvate cu tratament convențional (inclusiv antibiotice, drenaj și terapie imunosupresoare).	finalizat
600	Infliximab	Remsima	indicat pentru tratamentul colitei ulcerative active moderate până la severă la pacienți adulți care au prezentat răspuns terapeutic inadecvat la terapia convențională care include corticosteroizi și 6-mercaptopurină (6-MP) sau azatioprină (AZA), sau care nu tolerează sau prezintă contraindicații pentru astfel de terapii.	finalizat
601	Tetrabenazina	Tetmodis	indicat pentru tratamentul tulburărilor motorii hiperkinetice din coreea Huntington.	finalizat

602	inhibitor al alfa1 proteinazei umane*	Respreeza	indicată în tratamentul de întreținere, pentru a încetini progresia emfizemului la adulți cu deficit sever documentat de inhibitor al alfa1 proteinazei (de exemplu genotipuri PiZZ, PiZ (null), Pi (null, null), PiSZ). Pacienții trebuie să urmeze un tratament optim farmacologic și nonfarmacologic și să prezinte semne de boală pulmonară progresivă (de exemplu valoare predictivă scăzută a 3 volumului expirator forțat pe secundă (VEMS1), afectarea capacității de mers pe jos sau creșterea numărului exacerbărilor), evaluate de către un cadru medical cu experiență în tratamentul deficitului de inhibitor al alfa1 proteinazei.	finalizat
603	Comb (Irbesartan + Amlodipinum)	Aprexevo	indicat ca terapie de substituție pentru tratamentul hipertensiunii arteriale esențiale la pacienții adulți a căror tensiune arterială este deja controlată cu irbesartan și amlodipină administrate în asociere la aceleași doze ca și cele din medicamentul combinat.	finalizat
604	Dupilumab	Dupixent	indicat pentru tratamentul dermatitei atopice forma moderată până la severă la pacienții adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	finalizat
605	Pitolisantum	Wakix	indicat la adulți pentru tratamentul narcolepsiei cu sau fără cataplexie	finalizat
606	Tafamidis	Vyndaquel	Indicat pentru tratamentul amiloidozei cu transtiretina de tip salbatic sau ereditara la pacienții adulți cu cardiomiopatie	finalizat
607	Pembrolizumab	Keytruda	indicat în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5-fluorouracil (5-FU) pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, metastatic sau recurent nerezecabil, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 1	finalizat
608	Lanadelumabum	Takhzyro	indicat pentru prevenirea de rutină a episoadelor recurente de angioedem ereditar (AEE) la pacienții cu vârsta de peste 12 ani.	finalizat
609	Abirateronum	Zytiga	tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică	finalizat
610	Esketamina	Spravato	e indicat în asociere cu un SSRI sau un SNRI la adulții cu tulburare depresivă majoră rezistentă la tratamentul care nu au răspuns la cel puțin două tratamente diferite cu antidepressiv în episodul depresiv curent moderat până la sever	finalizat
611	Dulaglutidum	Trulicity	MONOTERAPIE - când numai dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat la pacienții pentru care utilizarea tratamentului cu metformin este considerată inadecvată din cauza absenței tolerabilității sau a prezenței contraindicațiilor. TERAPIE COMBINATĂ - în combinație cu alte medicamente hipoglicemice, inclusiv insulină, când acestea, împreună cu dieta și exercițiile fizice nu asigură un control glicemic adecvat.	finalizat
612	Glyceroli Phenylbutyras	Ravicti	terapie adjuvantă pentru abordarea terapeutică cronică a pacienților cu tulburări ale ciclului ureei (TCU), inclusiv deficite de carbamil-fosfat-sintetază-I (CPS), ornitin-carbamiltransferază (OTC), argininosuccinat-sintetază (ASS), argininosuccinat-iliază (ASL), arginază I (ARG) și sindrom cu hiperornitinemie-hiperamonemie-homocitrulinemie (HHH) cu deficit de ornitin-translocază, care nu pot fi controlate doar prin regim alimentar hipoproteic și/sau suplimentare a aminoacizilor	finalizat
613	Tocilizumab	RoActemra	indicat pentru tratamentul arteritei cu celule gigante (ACG) la pacienții adulți.	finalizat
614	Comb Rosuvastatinum + Ezetimibum	Suvezen	Hipercolesterolemie primară/Hipercolesterolemie familială forma homozigotă (HoFH) Suvezen este indicat în tratamentul hipercolesterolemiei primare (familială heterozigotă și nonfamilială) sau al hipercolesterolemiei familiale forma homozigotă, ca adjuvant la regimul alimentar, pentru înlocuirea tratamentului la pacienții adulți care sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină și ezetimib administrate în asociere, în aceleași doze cum există în combinația în doză fixă, dar administrate ca medicamente diferite. 2 Prevenirea evenimentelor cardiovasculare Suvezen este indicat ca tratament de substituție la pacienții adulți, care sunt controlați în mod adecvat cu rosuvastatină și ezetimib administrate în asociere, dar ca medicamente separate, cu aceleași concentrații conținute în combinația în doză fixă, pentru a scădea riscul de apariție a evenimentelor cardiovasculare la pacienții cu boală coronariană (Coronary Heart Disease - CHD) și istoric de sindrom coronarian acut (SCA).	finalizat
615	Diosminum	Detralex	Tratamentul simptomelor legate de insuficiența veno-limfatică: - senzație de greutate la nivelul picioarelor; - durere; - sindromul picioarelor neliniștite. Tratamentul simptomelor funcționale legate de criza hemoroidală.	finalizat
616	Gilteritinib	Xospata	indicat pentru tratamentul în monoterapie al pacienților adulți cu leucemie mieloidă acută (LMA) refractară sau recidivantă cu mutație FLT3	finalizat
617	Enzalutamidum	Xtandi	tratamentul cancerului de prostată în stadiu metastatic la bărbați adulți cu simptomatologie absentă sau ușoară, după eșecul terapiei de deprivare androgenică, la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic în tratamentul CPRC în stadiu metastatic, la bărbați adulți a căror boală a evoluat în timpul sau după administrarea terapiei cu docetaxel	finalizat

618	Nonacog alpha (fact IX de coagulare)	BeneFix	Tratamentul și profilaxia hemoragiei la pacienții cu hemofilie tip B (deficit congenital de factor IX). BeneFIX poate fi utilizat la toate grupele de vârstă.	finalizat
619	Lorlatinibum	Lorviqua	administrat în monoterapie este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK) a căror boală a progresat după: ▯ alectinib sau ceritinib ca primă terapie cu inhibitor tirozin-kinazic (TKI) al ALK; sau ▯ crizotinib și cel puțin un alt ALK TKI.	finalizat
620	Tofacitinib	Xeljanz	Tofacitinib în asociere cu metotrexat (MTX) este indicat în tratamentul poliartritei reumatoide (PR) active, moderată până la severă, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la, sau care nu tolerează unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare ale bolii. 3 Classified as public by the European Medicines Agency Tofacitinib poate fi administrat ca monoterapie în caz de intoleranță la MTX sau atunci când tratamentul cu MTX nu este adecvat	finalizat
621	Denosumab	Prolia	Tratamentul osteoporozei la femeile în postmenopauză și la bărbații cu risc crescut de fracturi. La femeile în postmenopauză Prolia reduce semnificativ riscul de fracturi vertebrale, non-vertebrale și de șold.	finalizat
622	Brolucizumab	Beovu	indicat la adulți pentru tratamentul degenerescentei maculare legată de vârstă (DMLV), forma neovasculară (umedă).	finalizat
623	Upadacitinibum	Rinvoq	este indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active, moderate până la severe, la pacienții adulți care au răspuns inadecvat sau prezintă intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală (MARMB). RINVOQ poate fi utilizat în monoterapie sau în asociere cu metotrexat.	finalizat
624	Acidum Obeticholicum	Ocaliva	este indicat pentru tratamentul colangitei biliare primitive (cunoscută și sub denumirea de ciroză biliară primitivă) în combinație cu acidul ursodeoxicolic (UDCA) la adulți cu răspuns inadecvat la UDCA sau ca monoterapie la adulți care nu pot tolera UDCA.	finalizat
625	Lumacaftor+Ivacaftorum	Orkambi	este indicat pentru tratamentul pacienților cu fibroză chistică (FC) cu vârsta de 6 ani și peste, cu genotip homozigot pentru mutația F508del la nivelul genei numită „regulator de conductanță transmembranară al fibrozei chistice	finalizat
626	Enzalutamidum	Xtandi	este indicat pentru: tratamentul CPRC în stadiu metastatic la bărbați adulți cu simptomatologie absentă sau ușoară, după eșecul terapiei de deprivare androgenică, la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic	finalizat
627	Atezolizumabum	Tecentriq	în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatină este indicat pentru tratamentul de linia întâi al neoplasmului bronho-pulmonar, altul decât cel cu celule mici (NSCLC), fără celule scuamoase, metastazat, la pacienți adulți. La pacienții cu NSCLC ALK-pozitiv sau cu mutații EGFR, utilizarea Tecentriq în asociere cu bevacizumab, paclitaxel și carboplatină este indicată numai după eșecul terapiei țintite corespunzătoare	finalizat
628	Ketoconazolum	Ketoconazole HRA	indicat pentru tratamentul sindromului Cushing endogen la adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani.	finalizat
629	Luspatercept	Reblozyl	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii asociată cu beta-talasemie	finalizat
630	Luspatercept	Reblozyl	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzii ca urmare a sindroamelor mielodisplazice (SMD) cu risc foarte scăzut, scăzut și intermediar cu sideroblaști inelari, care au prezentat un răspuns nesatisfăcător la sau sunt ineligibili pentru tratamentul cu eritropoietină	finalizat
631	Dupilumab	Dupixent	indicat pentru tratamentul dermatitei atopice forma moderată până la severă la adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	finalizat
632	Avelumab	Bavencio	în asociere cu axitinib este indicat ca tratament de primă linie la pacienți adulți cu carcinom renal (CR) avansat	retras
633	Durvalumab	Imfinzi	administrat concomitent cu etopozidă și carboplatină sau cisplatină este indicat în tratamentul de primă linie pentru pacienți adulți cu cancer bronhopulmonar cu celule mici în stadiu extensiv (ES-SCLC)	finalizat
634	Metreleptin	Myalepta	indicat ca adjuvant pe lângă regimul alimentar ca terapie de substituție pentru tratamentul complicațiilor cauzate de deficitul de leptină la pacienți cu lipodistrofie (LD): • cu LD parțială familială diagnosticată sau LD parțială dobândită (sindrom Barraquer-Simons), la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste	finalizat

635	Metreleptin	Myalepta	indicat ca adjuvant pe lângă regimul alimentar ca terapie de substituție pentru tratamentul complicațiilor cauzate de deficitul de leptină la pacienții cu lipodistrofie (LD): • cu LD generalizată congenitală diagnosticată (sindrom Berardinelli-Seip) sau LD generalizată dobândită (sindrom Lawrence), confirmată, la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste 3	finalizat
636	Metyraponum	Metopirone	abordarea terapeutică a sindromului Cushing	finalizat
637	Guselkumab	Tremfya	singur sau în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți care au avut un răspuns inadecvat sau intoleranță la un tratament anterior cu medicament antireumatic modificador al bolii (DMARD)	finalizat
638	Simoctocog Alfa	Nuwiq	Tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).	finalizat
639	Ustekinumabum	Stelara	tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratament sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie au contraindicații medicale la aceste terapii	retras
640	Lenalidomida	Lenalidomida Alvogen	tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu	finalizat
641	Indacaterolum +Glicopironium Bromidum+Mometasonum	Energair Breezhaler 114 micrograme/46 micrograme/136 micrograme pulbere de inhalat capsule	tratamentul de întreținere al astmului la pacienții adulți care nu sunt controlați adecvat cu un tratament de întreținere combinat care constă în asocierea dintre un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune și o doză mare de corticosteroid în administrare inhalatorie, care au prezentat una sau mai multe exacerbări astmatice în anul anterior	finalizat
642	Indacaterolum+Mometasonum	Aectura Breezhaler 125 micrograme/62,5 micrograme, pulbere de inhalat, capsule; Aectura Breezhaler 125micrograme/127,5 micrograme, pulbere de inhalat, capsule; Aectura Breezhaler 125 micrograme/260 micrograme, pulbere de inhalat, capsule	tratamentul de întreținere al astmului la pacienții adulți și copii cu vârsta de 12 ani și peste care nu sunt controlați adecvat cu terapie cu cortizoni în administrare inhalatorie și agonști cu durată scurtă de acțiune beta2-adrenergici cu administrare inhalatorie	finalizat
643	Gemtuzumab ozogamicin	Mylotarg	indicat în asociere cu daunorubicină (DNR) și citarabină (AraC) pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 15 ani și peste, cu leucemie mieloidă acută (LMA), cu , CD33 pozitiv, de novo, netratată anterior, cu excepția leucemiei promielocitare acute (LPA)	finalizat
644	Siponimod	Mayzent	indicat pentru tratarea pacienților adulți cu scleroză multiplă secundară progresivă (SPMS), cu boală activă evidențiată prin recidive sau caracteristici imagistice ale activității inflamatorii	finalizat
645	Lanadelumabum	Takhyzo	prevenirea de rutină a episoadelor recurente de angioedem ereditar (AEE) la pacienții cu vârsta de peste 12 ani.	finalizat
646	dipropionat de beclometazonă	Trimbow 87/5/9	Tratament de întreținere pentru astm bronșic, la adulții a căror afecțiune nu este controlată în mod adecvat cu o terapie de întreținere cu asocierea între un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune și un corticosteroid în doză medie, cu administrare inhalatorie, care au prezentat una sau mai multe exacerbări ale astmului bronșic în anul anterior	finalizat
647	dipropionat de beclometazonă	Trimbow 87/5/9	Tratament de întreținere la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) moderată până la severă, care nu sunt tratați în mod adecvat cu ajutorul unei asocieri între un corticosteroid cu administrare inhalatorie și un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată sau cu o asociere dintre un beta2-agonist cu acțiune de lungă durată și un antagonist muscarinic cu durată lungă de acțiune (pentru efectele asupra controlului simptomelor și prevenirea exacerbări	finalizat
648	Treprostinil	Tresuvi	Tratamentul hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) idiopatică sau ereditară, pentru a îmbunătăți toleranța la efort și simptomele bolii la pacienții incluși în clasa funcțională III, conform clasificării New York Heart Association (NYHA).	finalizat
649	Bavencio	Avelumab	în asociere cu axitinib este indicat ca tratament de primă linie la pacienții adulți cu carcinom renal (CR) avansat	finalizat
650	Ibrutinibum	Imbruvica	LLC	finalizat
651	Opium	Dropizol	indicat în tratamentul diareei severe, cum este diareea provocată de medicamente citostatice, radioterapie sau tumori neuroendocrine, în care administrarea altor tratamente anti-diareice nu determină un efect suficient.	documentatie incompleta
652	Eltrombopag	Revolade	indicat pentru tratamentul pacienților cu vârsta de 1 an și peste, cu trombocitopenie imună primară (TIP), cu o durată de 6 luni sau mai mult de la diagnosticare, și care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	finalizat

653	Ramucirumabum	Cyramza	în monoterapie este indicat în tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular în stadiu avansat sau nerezecabil cu o valoare a alfa fetoproteinei serice (AFP) ≥ 400 ng/ml, care au fost tratați anterior cu sorafenib.	finalizat
654	Ramucirumabum	Cyramza	în asociere cu paclitaxel este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină. este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric în stadiu avansat sau adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică care prezintă progresia bolii după chimioterapie anterioară pe bază de săruri de platină sau fluoropirimidină, pentru care tratamentul în asociație cu paclitaxel nu este adecvat	finalizat
655	Ramucirumabum	Cyramza	în combinație cu erlotinib este indicat ca primă linie de tratament a pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici care prezintă mutații activatoare ale receptorului factorului de creștere epidermal (EGFR)	finalizat
656	Olaparibum	Lynparza	în asociere cu bevacizumab este indicat ca tratament de întreținere la pacientele adulte cu carcinom ovarian epitelial de grad înalt în stadiu avansat (stadiile III și IV FIGO), neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară, care prezintă răspuns (complet sau parțial) după finalizarea primei linii de tratament cu chimioterapie pe bază de platină în combinație cu bevacizumab și tumori cu status pozitiv 21 pentru deficitul de recombinare omologă (DRO), definitiv fie ca mutație BRCA1/2 și/sau instabilitate genomică	finalizat
657	Olaparibum	Lynparza	ca monoterapie în tratamentul de întreținere la paciente adulte cu carcinom ovarian epitelial de grad înalt recidivat, neoplazie de trompă uterină sau neoplazie peritoneală primară recidivată, sensibile la medicamente pe bază de platină, cu răspuns (complet sau parțial) la chimioterapie pe bază de platină.	finalizat
658	Combinatii (Insulinum Degludec + Liraglutidum)	Xultophy	indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, în vederea îmbunătățirii controlului glicemiei, ca tratament adăugat la regimul alimentar și exerciții fizice, în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat	finalizat
659	Combinatii (Insulinum Degludec + Insulinum Aspart)	Ryzodeg	Tratamentul diabetului zaharat la adulți, adolescenți și copii de la vârsta de 2 ani.	finalizat
660	Treprostinilum	Trepulmix	indicat în tratamentul pacienților adulți cu Clasa Funcțională (CF) III sau IV conform OMS și: – hipertensiune arterială pulmonară cronică tromboembolică (HTAPCT) inoperabilă sau – HTAPCT persistentă sau recurentă post-tratament chirurgical în vederea îmbunătățirii capacității de efort	finalizat
661	Ixekizumabum	Taltz	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever la copii începând cu vârsta de 6 ani și cu greutate corporală de minim 25 kg și la adolescenți care sunt eligibili pentru terapie sistemică.	finalizat
662	Ixekizumabum	Taltz	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu spondiloartrită axială non-radiografică, cu semne obiective de inflamație indicate de concentrațiile crescute de proteină C reactivă (PCR) și/sau de examenul imagistic prin rezonanță magnetică nucleară (RMN), al căror răspuns la tratamentul cu medicamente antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) a fost inadecvat	finalizat
663	Galcanzumab	Emgality	indicat pentru profilaxia migrenei la adulții care au cel puțin 4 zile de migrenă pe lună.	finalizat
664	Brigatinibum	Alunbrig	indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu CPNMC avansat, pozitiv pentru ALK, tratați anterior cu crizotinib.	finalizat
665	Brigatinibum	Alunbrig	indicat în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar non-microcelular (CPNMC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), care nu au fost tratați anterior cu un inhibitor de ALK.	finalizat
666	Brentuximab vedotin	Adcetris	în asociere cu ciclofosamidă, doxorubicină și prednison (CHP) este indicat pentru 3 pacienții adulți cu limfom anaplastic cu celule mari sistemic (LACMs) netratat anterior	finalizat
667	Vedolizumab	Entyvio	colita ulcerativă și boala Crohn	finalizat
668	Dapagliflozin	Forxiga	indicat pentru tratamentul pacienților adulți simptomatici cu insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejeecție redusă.	finalizat
669	Combinatii (Formoterolum+Glicopirionium+Budesonidum)	Trixeo Aerosphere	este indicat ca tratament de întreținere la pacienții adulți cu boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC) moderată până la severă, care nu sunt tratați în mod adecvat cu o asociere dintre un corticosteroid cu administrare inhalatorie și un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune sau cu o asociere dintre un beta2-agonist cu durată lungă de acțiune și un antagonist muscarinic cu durată lungă de acțiune	finalizat
670	Secukinumab	Cosentyx	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la copii și adolescenți, începând cu vârsta de 6 ani, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	finalizat

671	Palivizumabum	Synagis	indicat pentru prevenirea bolilor severe ale tractului respirator inferior care necesită spitalizare, determinate de virusul sincițial respirator (VSR), la copii cu risc crescut de îmbolnăvire cu VSR: • Copii născuți la 35 săptămâni de gestație sau mai puțin și cei cu vârstă mai mică de 6 luni la începutul sezonului de îmbolnăvire cu VSR. • Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și care au necesitat tratament pentru displazie bronhopulmonară în ultimele 6 luni. • Copii cu vârstă mai mică de 2 ani și cu boli cardiace congenitale semnificative din punct de vedere hemodinamic.	finalizat
672	imunoglobulină umana normala	Hyqvia	Terapie de substituție la adulți, adolescenți și copii (0-18 ani) în: • Sindroame de imunodeficiență primară cu producere de anticorpi afectată (vezi pct. 4.4). • Imunodeficiențe secundare (IDS) la pacienții care suferă de infecții grave sau recurente, cu tratament antimicrobian ineficient și, fie cu insuficiență confirmată de anticorpi specifici (PSAF)*, fie cu un nivel de IgG seric de < 4 g/l. *PSAF = incapacitatea de a crește de cel puțin două ori titrul de anticorpi IgG la vaccinurile pneumococic polizaharidic și cu antigene polipeptidice	finalizat
673	Benralizumabum	Fasenra	astm bronșic - schimbare lista de compensare	finalizat
674	Mogamulizumab	Poteligeo	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu micozis fungoid (MF) sau sindrom Sézary (SS) c ăroră li s-a administrat anterior cel puțin o terapie sistemică.	finalizat
675	Ertugliflozinum + Sitagliptinum	Steglujan	indicat la adulți cu vârsta de 18 ani și peste, diagnosticați cu diabet zaharat de tip 2, ca adjuvant la dietă și exercițiu fizic, pentru îmbunătățirea controlului glicemic: ☐ atunci când utilizarea metforminului și/sau a unei sulfoniluree (SU) și a uneia dintre substanțele active ale Steglujan nu asigură un control glicemic adecvat. ☐ la pacienții care sunt deja sub tratament cu asocierea dintre ertugliflozin și sitagliptin, sub formă de comprimate separate	finalizat
676	Selexipagum	Upravi	indicat pentru tratamentul de lungă durată al hipertensiunii arteriale pulmonare (HTAP) la pacienți adulți cu clasă funcțională (CF) OMS II–III fie ca tratament asociat la pacienții controlați insuficient cu un antagonist al receptorilor endotelinei (ARE) și/sau cu un inhibitor al fosfodiesterazei de tip 5 (PDE-5) fie în monoterapie la pacienții care nu sunt candidați pentru aceste tratamente	finalizat
677	Glasdegib	Daurismo	indicat, în asociere cu citarabina în doză mică, pentru tratamentul leucemiei acute mieloid (LAM) nou diagnosticate de novo sau secundară la pacienți adulți care nu sunt eligibili pentru chimioterapia de inducție standard.	finalizat
678	Vedolizumabum	Entyvio	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală (TNFα). indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală (TNFα).	finalizat
679	pertuzumab / trastuzumab	Phesgo	Cancer mamar incipient (CMI) indicat pentru utilizare în asociere cu chimioterapie pentru: • tratamentul neoadjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv, avansat local, inflamator sau în stadiu incipient cu risc crescut de recurență (vezi pct. 5.1) • tratamentul adjuvant la pacienții adulți cu cancer mamar HER 2 pozitiv, în stadiu incipient, cu risc crescut de recurență (vezi pct. 5.1). Cancer mamar metastazat (CMM) Phesgo este indicat pentru utilizare în asociere cu docetaxel la pacienții adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv metastazat sau recurent local inoperabil, care nu au urmat anterior tratament anti-HER2 sau chimioterapie pentru boala lor metastatică.	finalizat
680	Susoctocog alfa	Obizur	Tratamentul hemoragiilor în cazul pacienților cu hemofilia dobândită, determinată de anticorpii față de factorul VIII.	finalizat
681	Ropeginterferonul alfa-2b	Besremi	indicat pentru tratamentul în monoterapie al policitemiei vera fără splenomegalie simptomatică, la adulți.	finalizat
682	Dupilumab	Dupixent	dermatita atopică severă	finalizat

683	Combinatii(Levodopum+Carbidopum+Entacaponum)	Lecigon	Tratamentul bolii Parkinson avansate cu fluctuatii motorii severe si hiperkinezie, atunci cand tratamentul cu asocieri de medicamente cu administrare orala disponibile pt boala Parkinson nu a dat rezultate satisfacatoare	finalizat
684	Abirateron	Zytiga	la bărbații adulți a căror boală a evoluat în timpul sau după administrarea unei scheme de tratament chimioterapic pe bază pe docetaxel.	finalizat
685	Combinatii(Trifluridinum+Tipiracilum)	Lonsurf	ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastic metastatic, inclusiv adenocarcinom de jonctiune esogastrică, cărora li s-au administrat anterior cel puțin două regimuri de tratament sistemic pentru boală avansată.	finalizat
686	Secukinumab	Cosentyx	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică. Cosentyx, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei. Cosentyx este indicat în tratamentul spondilitei axiale-spondilită anchilozantă activă la adulții care nu au răspuns corespunzător la terapia convențională. psoriazice active la pacienții adulți atunci când răspunsul la terapia anterioară cu medicamente antireumatice modificatoare ale bolii (MARMB), a fost inadecvat	finalizat
687	Cabozantinib	Cabometyx	indicat ca monoterapie pentru carcinomul cu celule renale (CCR) în stadiu avansat 3 - ca tratament de primă linie la pacienții adulți netratați anterior, cu risc intermediar sau crescut/nefavorabil	finalizat
688	Olaparibum	Lynparza	indicat în monoterapie la pacienți adulți cu cancer de prostată rezistent la castrare în stadiu metastatic și mutație BRCA1/2 (germinală și/sau somatică), care prezintă progresie după tratamentul anterior care a inclus un agent hormonal nou.	finalizat
689	Combinatii (Ivacaftor+Ttezacaftor +Elexacaftor)	Kaftrio	indicat, în cadrul unei scheme terapeutice în asociere cu ivacaftor 150 mg comprimate, pentru tratamentul fibrozei chistice (FC) la pacienți cu vârsta de 12 ani și peste, care prezintă cel puțin o mutație F508del a genei regulatorului de conductanță transmembranară al fibrozei chistice (CFTR) sau caresunt heterozigoti pentru mutatia F508del a genei CFTR cu o mutație cu funcție minimă(FM)	finalizat
690	Risdiplamum	Evrysdi	indicat pentru tratamentul amiotrofiei spinale (atrofie musculară spinală, AMS) 5q la pacienți cu vârsta de 2 luni și peste, cu un diagnostic clinic de AMS tip 1, tip 2 sau tip 3 sau cu una până la patru copii ale genei SMN2.	finalizat
691	Blinatumomab	Blincto	indicat ca monoterapie pentru tratamentul adulților cu leucemie limfoblastică acută (LLA) cu precursor de celulă B, refractară sau recidivată, CD19 pozitivă. Pacienții cu LLA cu precursor de celulă B și cu cromozom Philadelphia pozitiv trebuie să fi înregistrat un eșec la tratamentul cu cel puțin 2 inhibitori de tirozin-kinază (ITK) și să nu aibă opțiuni alternative de tratament	finalizat
692	Carfilzomibum	Kyprolis	administrat în asociere cu daratumumab și cu dexametazonă, cu lenalidomidă și cu dexametazonă sau numai cu dexametazonă este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară	finalizat
693	Romiplostimum	Nplate	Adulți: indicat pentru tratamentul trombocitopeniei imune primare (PTI) la pacienți adulți care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline) Copii și adolescenți: Nplate este indicat pentru tratamentul trombocitopeniei imune primare cronice (PTI) la pacienți copii și adolescenți cu vârsta de un an și peste, care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu: corticosteroizi, imunoglobuline).	finalizat
694	Baricitinib	Olumiant	Dermatita atopică -este indicat in tratamentul dermatitei atopice moderate pana la severe la pacienti adulti care sunt candidati pentru terapie sistemică	finalizat
695	Emicizumabum	Hemlibra	este indicat ca tratament profilactic de rutină pentru episoadele de sângerare la pacienți cu:hemofilia A severă (deficiență congenitală de factor VIII, FVIII < 1%) care nu prezintă inhibitori de factor VIII	finalizat
696	Lumasiranum	Oxlumo	este indicat pentru tratamentul hiperoxaluriei primare tip 1 (HP1) la toate categoriile de vârstă.	finalizat
697	Selpercatinib	Retsevmo	în monoterapie este indicat pentru tratamentul adulților cu: – cancer pulmonar fără celule mici (non-small cell lung cancer, NSCLC) în stadiu avansat, cu fuziunea genei RET, care necesită terapie sistemică după tratamentul anterior cu imunoterapie și/sau chimioterapie pe bază de săruri de platină	finalizat
698	Selpercatinib	Retsevmo	în monoterapie este indicat pentru tratamentul adulților cu cancer tiroidian avansat, cu fuziunea genei RET, care necesită terapie sistemică după tratamentul anterior cu sorafenib și/sau lenvatinib	finalizat
699	Selpercatinib	Retsevmo	în monoterapie este indicat pentru tratamentul adulților și adolescenților cu vârsta de 12 ani și peste, care prezintă cancer tiroidian medular (CTM) avansat cu mutații RET și care necesită terapie sistemică după tratamentul anterior cu cabozantinib și/sau vandetanib.	finalizat

700	Combinatii (empagliflozin+clorhidrat de metformină)	Synjardy	indicat în tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2, ca terapie adăugată la dietă și exercițiu fizic în la pacienți controlați insuficient numai cu doza maximă tolerată de metformină în asociere cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat, la pacienți controlați insuficient cu metformină și aceste medicamente la pacienți cărora li s-a administrat deja o asociere de empagliflozin și metformină sub formă de comprimate separate.	finalizat
701	Ribociclibum	Kisqali	este indicat pentru tratamentul femeilor, cu cancer mamar, în stadiu avansat local sau metastatic, cu receptori hormonalni (RH) pozitivi și fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică (HER2), în asociere cu un inhibitor de aromatază sau fulvestrant, ca terapie hormonală inițială, sau la femei cărora li s-a administrat terapie hormonală anterioară. La femeile în premenopauză sau perimenopauză, terapia hormonală trebuie asociată cu un agonist al hormonului de eliberare a hormonului luteinizant (LHRH).	finalizat
702	Ciclosporinum	Ikervis	Tratamentul cheratitei severe la pacienții adulți cu xerofthalmie, care nu s-a ameliorat în pofida tratamentului cu substitute lacrimale	finalizat
703	Canakinumabum	Ilaris	Sindroame febrile periodice Ilaris este indicat pentru tratamentul sindroamelor febrile autoinflamatorii periodice, la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste această vârstă. Sindrom periodic asociat cu receptorul factorului de necroză tumorală (TRAPS) Ilaris este indicat pentru tratamentul sindromului periodic asociat cu receptorul factorului de necroză tumorală (TNF) (TRAPS). Sindromul hiperimunoglobulinemiei D (HIDS)/deficitului de mevalonat kinază (MKD) Ilaris este indicat pentru tratamentul sindromului hiperimunoglobulinemiei D (HIDS)/deficitului de mevalonat kinază (MKD). Febră familială mediteraneană (FMF) Ilaris este indicat pentru tratamentul febrei familiale mediteraneene (FMF). Ilaris trebuie administrat în în asociere cu colchicina, dacă este cazul.	finalizat
704	Canakinumabum	Ilaris	Sindroame periodice asociate cu criopirină Ilaris este indicat pentru tratamentul sindroamelor periodice asociate cu criopirină (CAPS), incluzând: în Sindromul Muckle-Wells (MWS) în Boala inflamatorie multisistemică cu debut neonatal (NOMID)/sindromul infantil neurologic, cutanat și articular cronic (CINCA) în Forme severe ale sindromului familial autoimun inflamator la rece (FCAS)/sindromului familial al urticariei la rece (FCU), care se manifestă prin alte semne și simptome, în afară de urticaria indusă de frig.	finalizat
705	Brivacetam	Briviact	adaugare concentratie noua	finalizat
706	Onasemnogen abeparvovec	Zolgensma	indicat pentru tratamentul: - pacienților cu amiotrofie spinală (atrofie musculară spinală, AMS) asociată cu cromozomul 5q cu o mutație bialelică la nivelul genei SMN1 și diagnostic clinic de AMS de tipul 1, sau - pacienților cu AMS asociată cu cromozomul 5q cu o mutație bialelică la nivelul genei SMN1 și maximum 3 copii ale genei SMN2.	finalizat
707	Alpelisib	Piqray	indicat în asociere cu fulvestrant pentru tratarea femeilor aflate în postmenopauză și a bărbaților cu cancer mamar local avansat sau metastatic, cu receptori hormonalni (HR) pozitivi, fără receptor 2 al factorului uman de creștere epidermică (HER2), cu mutație PIK3CA, după progresia bolii în urma administrării unui tratament endocrin în monoterapie	finalizat
708	Daratumumab	Darzalex	în asociere cu pomalidomidă și dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin un tratament anterior conținând un inhibitor de proteazom și lenalidomidă și care au fost refractari la lenalidomidă, sau care au primit cel puțin două terapii anterioare care au inclus lenalidomidă și un inhibitor proteazom și care au înregistrat progresia bolii în timpul sau după ultimul tratamen	finalizat
709	Burosumabum	Crysvita	indicat pentru tratamentul hipofosfatemiei X-linkate (HXL), cu evidențe radiografice de boală osoasă, la copii cu vârsta de 1 an și peste și adolescenți ai căror schelet este în creștere.	finalizat
710	Fedratinibum	Inrebic	indicat pentru tratamentul splenomegaliei sau al simptomelor asociate bolii la pacienții adulți cu mielofibroză primară, mielofibroză post-policitemie vera sau mielofibroză post-trombocitemie esențială care nu au fost expuși anterior la inhibitori ai familiei Janus kinazelor (JAK) sau care au fost tratați cu ruxolitinib.	finalizat
711	Ustekinumabum	Stelara	indicat în tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratamentul sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie au contraindicații medicale la aceste terapii	finalizat
712	Semaglutidum	Rybelsus	DZ	finalizat

713	Conestat alfa	Ruconest	indicat pentru tratamentul episoadelor acute de angioedem la adulți, adolescenții și copiii (cu vârsta de 2 ani sau mai mari) cu angioedem ereditar (AEE) cauzat de deficitul de inhibitor al C1-esterazei.	finalizat
714	Dapagliflozinum	Forxiga	indicat la pacienții adulți pentru tratamentul insuficient controlat al diabetului zaharat de tip 2, în asociere cu dieta și programul de exerciții fizice - în monoterapie, dacă utilizarea metformin nu este adecvată din cauza intoleranței. - în asociere cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2.	finalizat
715	Paclitaxelum	Pazenir	în asociere cu gemcitabina este indicat în tratamentul de primă linie la pacienți adulți cu adenocarcinom pancreatic metastatic.	finalizat
716	Paclitaxelum	Pazenir	Monoterapia este indicată pentru tratamentul cancerului de sân metastatic la pacienți adulți la care tratamentul de primă linie pentru boala metastatică nu a fost eficient și pentru care tratamentul standard conținând antraciclină nu este indicat	finalizat
717	Semaglutidum	Ozempic	indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice: • sub formă de monoterapie atunci când administrarea de metformin este considerată inadecvată din cauza intoleranței sau contraindicațiilor • în asociere cu alte medicamente utilizate pentru tratamentul diabetului zaharat - adăugare forma farmaceutică nouă	finalizat
718	Vortioxetinum	Brintellix	indicat pentru tratamentul episoadelor depresive majore la adulți.	finalizat
719	Adalimumabum	Humira	indicat în tratamentul colitei ulcerative active, forma moderată până la severă, la pacienții adulți care nu au avut un răspuns adecvat la tratamentul convențional, inclusiv la corticosteroizi și 6-mercaptopurină (6-MP) sau azatioprină (AZA) sau care au intoleranță la aceste tratamente sau cărora aceste tratamente le sunt contraindicate.	finalizat
720	Adalimumabum	Humira	indicat în tratamentul colitei ulcerative active, forma moderată până la severă, la pacienții adulți care nu au avut un răspuns adecvat la tratamentul convențional, inclusiv la corticosteroizi și 6-mercaptopurină (6-MP) sau azatioprină (AZA) sau care au intoleranță la aceste tratamente sau cărora aceste tratamente le sunt contraindicate din motive medicale.	finalizat
721	Atezolizumab	Tecentriq	în asociere cu bevacizumab, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular avansat sau nerezecabil (HCC) cărora nu le-a fost administrat anterior tratament sistemic	finalizat
722	Omalizumab	Xolair	indicat la adulți, adolescenți și copii (cu vârsta cuprinsă între 6 până la < de 12 ani). Tratamentul cu Xolair trebuie avut în vedere numai la pacienții cu astm bronșic mediat cu certitudine de IgE (imunoglobulină E)	finalizat
723	Avelumabum	Bavencio	indicat ca monoterapie pentru tratamentul de primă linie al pacienților adulți cu carcinom urotelial (CU) avansat local sau metastatic care nu manifestă progresie după chimioterapia pe bază de platină	finalizat
724	Turoctocog Alfa Pegol	Esperoct	tratamentul și profilaxia sângerărilor la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, cu hemofilie A (deficit congenital de factor VIII).	finalizat
725	Ariprazinum	Reagila	tratamentul schizofreniei la pacienții adulți	finalizat
726	Osimertinib	Tagrisso	tratamentul adjuvant după rezecția tumorală completă la pacienții adulți cu cancer bronhopulmonar altul decât cu celule mici (NSCLC) în stadiul IB-IIIA, ale căror tumori prezintă deleții în exonul 19 sau mutație de substituție în exonul 21 (L858R) ale receptorului pentru factorul de creștere epidermal (EGFR)	finalizat
727	Lenalidomidum	Lenalidomida Accord	ca monoterapie, indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom cu celule în manta recidivant sau referacter	finalizat
728	Lenalidomidum	Lenalidomida Accord	ca monoterapie, indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu anemie dependentă de transfuzie de sânge din cauza sindroamelor mielodisplazice cu risc scăzut sau intermediar -1, asociate cu o anomalie citogenetică prin depleția 5q izolată, când alte opțiuni terapeutice sunt insuficiente sau inadecvate	finalizat
729	Abemaciclib	Verzenios	indicat în tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv și receptor pentru factorul de creștere epidermal uman 2 (HER2) negativ, în asociere cu fulvestrant ca tratament hormonal inițial sau la femei cărora li s-a administrat anterior tratament hormonal	finalizat
730	Abemaciclib	Verzenios	indicat în tratamentul femeilor cu cancer mamar metastatic sau local avansat cu receptor hormonal (HR) pozitiv și receptor pentru factorul de creștere epidermal uman 2 (HER2) negativ, în asociere cu un inhibitor de aromatază ca tratament hormonal inițial sau la femei cărora li s-a administrat anterior tratament hormonal	finalizat

731	Pomalidomidum	Imnovid	indicat în asociere cu bortezomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin o schemă de tratament anterioară, inclusiv lenalidomidă	finalizat
732	Apalutamida	Erleada	în tratamentul cancerului de prostată non-metastatic rezistent la castrare (nmCRPC, nonmetastatic castration-resistant prostate cancer) la bărbați adulți, care prezintă un risc crescut de a dezvolta boală metastatică	finalizat
733	Ofatumumab	Kesimpta	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu forme recidivante de scleroză multiplă (SMR), cu boală activă, definită în funcție de caracteristicile clinice sau de rezultatele investigațiilor de imagistică medicală	finalizat
734	Avelumabum	Bavencio	monoterapie pt.tratamentul de prima linie al pacienților adulți cu carcinom urotelial (CU) avansat local sau metastatic, care nu manifesta progresie după chimioterapie pe baza de platina	finalizat
735	Daratumumabum	Darzalex	indicat în asociere cu ciclofosamidă, bortezomib și dexametazonă pentru tratamentul pacienților adulți cu amiloidoză sistemică cu lanțuri ușoare (AL) nou diagnosticată	finalizat
736	Apalutamidum	Erleada	în tratamentul cancerului de prostată metastatic sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer) la bărbați adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy)	finalizat
737	Mekinist	Trametinib	trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici, cu mutație BRAF V600.	finalizat
738	Tafinlar	Dabrafenib	trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici, cu mutație BRAF V600.	finalizat
739	Acalabrutinibum	Calquence	Calquence în monoterapie sau în asociere cu obinutuzumab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior. Calquence în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.	finalizat
740	Darolutamidum	Nubeqa	e indicat pentru tratamentul cancerului de prostată non-metastatic rezistent la castrare (nmCRPC, non-metastatic castration resistant prostate cancer) la bărbați adulți care prezintă un risc crescut de apariție a bolii metastatice	finalizat
741	Empagliflozinum	Jardiance	indicat pentru tratamentul adulților cu insuficiență cardiacă cronică simptomatică, cu fracție de ejeție redusă.	finalizat
742	Pembrolizumabum	Keytruda	Limfom clasic Hodgkin adaugarea unui nou segment populațional și modificarea liniei de tratament	finalizat
743	Bosutinibum	Bosulif	leucemie mieloidă cronică cu cromozom Philadelphia pozitiv (LMC Ph+) în fază cronică (FC) nou diagnosticată.	finalizat
744	Tofacitinib	Xeljanz	în asociere cu MTX este indicat în tratamentul artritei psoriazice (APs) active la pacienții adulți care au avut un răspuns inadecvat, sau care nu au tolerat un tratament anterior cu un medicament antireumatic modificator al bolii (DMARD)	finalizat
745	Talazoparibum	Talzenna	este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu mutații germinale BRCA1/2, care au cancer mamar metastatic sau avansat local, HER2-negativ. Pacienții trebuie să fi fost anterior tratați cu antraciclină și/sau un taxan în context (neo)adjuvant, avansat local sau metastatic, exceptând situația în care aceste tratamente nu erau adecvate pentru pacienți. Pacienții cu cancer mamar cu receptori hormonalni (RH) pozitivi trebuie să fi fost tratați anterior cu o terapie endocrină sau să fi fost considerați neadecvați pentru terapia endocrină.	finalizat
746	Naproxenum	Naldorex	utilizat în tratamentul simptomatic al: ▫ poliartritei reumatoide, artrozei (artrită degenerativă), spondilitei anchilozante, artritei idopatie juvenile ▫ tulburărilor musculoscheletice acute (cum sunt entorsele și întinderile musculare, traumatismele directe, durerea lombosacrată, tenosinovita și bursita) ▫ gutei acute ▫ dismenoreei ▫ durerii acute postoperatorii și tumefacțiilor (de exemplu după intervenții chirurgicale, extracții dentare).	finalizat
747	Oxihidroxid sucrofenic	Velphoro	indicat pentru controlul valorilor fosforului plasmatic la pacienți adulți cu boală renală cronică (BRC) care efectuează hemodializă (HD) sau dializă peritoneale (DP)	finalizat
748	Pembrolizumabum	Keytruda	indicat în monoterapie pentru tratamentul de primă linie al cancerului colorectal metastatic cu instabilitate microsatelită de grad înalt (MSI-H, microsatellite instability-high) sau cu deficiență de reparare a nepotrivirii ADN-ului (dMMR, mismatch repair deficient), la adulți.	finalizat
749	Vaccin BCG	Onko BCG 100	este utilizat pentru tratarea tumorilor vezicale superficiale epiteliale, neinvazive	finalizat
750	Ozanimodum	Zeposia	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR) cu boală activă, așa cum este definită pe baza caracteristicilor clinice sau imagistice.	finalizat
751	Blinatumomab	Blinicyto	este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților copii și adolescenți cu vârsta de minim 1 an cu LLA cu precursor de celulă B și cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă, la prima recidivă, cu risc crescut, ca parte a terapiei de consolidare	finalizat

752	Natalizumabum	Tysabri	este indicat ca unic tratament de modificare a bolii la adulții cu scleroză multiplă recidivantă remitentă (SMRR)	finalizat
753	Apremilast	Otezia	Artrita psoriazică	finalizat
754	Venetoclax	Venclyxto	administrat în asociere cu un agent hipometilant este indicat pentru tratamentul pacienților adulți nou diagnosticați cu leucemie acută mieloidă (LAM), care nu sunt eligibili pentru chimioterapie intensivă.	finalizat
755	Sartralizumab	Enspryng	indicat în monoterapie sau în asociere cu terapie imunosupresoare (TIS) pentru tratamentul tulburărilor din spectrul neuromielitei optice (TSNMO) la pacienți adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani care sunt seropozitivi la anticorpii anti-aquaporina 4 IgG (AQP4-IgG)	finalizat
756	Inclisiran	Leqvio	adulți cu hipercolesterolemie primară (familială heterozigotă și non-familială) sau dislipidemie mixtă, ca adjuvant la regimul alimentar: în asociere cu o statină sau cu o statină împreună cu alte terapii hipolipemiente, la pacienți care nu pot atinge obiectivele LDL-C la administrarea dozei maxime tolerate dintr-o statină, sau în monoterapie sau în asociere cu alte terapii hipolipemiente, la pacienți care nu tolerează statine sau la care administrarea unei statine este contraindicată.	finalizat
757	Tocilizumab	RoActemra	tratamentul arteritei cu celule gigante (ACG) la pacienții adulți	finalizat
758	Atezolizumab	Tecentriq	în asociere cu bevacizumab, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular avansat sau nerezecabil (HCC) cărora nu le-a fost administrat anterior tratament sistemic	finalizat
759	Lipegfilgrastim	Lonquex	este indicat la adulți pentru reducerea duratei neutropeniei și a apariției neutropeniei febrile la pacienții tratați cu chimioterapie citotoxică pentru afecțiuni maligne (cu excepția leucemiei mieloid cronice și a sindroamelor mielodisplazice).	finalizat
760	Isatuximabum	Sarclisa	în asociere cu pomalidomidă și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, care au beneficiat de minim două tratamente anterioare, inclusiv lenalidomidă și un inhibitor de proteazom și care au demonstrat progresia bolii sub ultimul tratament administrat. - în asociere cu carfilzomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară	retras
761	Rivaroxabanum	Xarelto	Tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP) și prevenirea recurenței TVP și a EP la adulți	finalizat
762	Rivaroxabanum	Xarelto	administrat concomitent cu acid acetilsalicilic (AAS), este indicat pentru prevenirea evenimentelor aterotrombotice la pacienții adulți care prezintă boală arterială coronariană (BAC) sau boală arterială periferică simptomatică (BAP) cu risc crescut de evenimente ischemice.	finalizat
763	Selumetinib	Koselugo	în monoterapie este indicat la copii și adolescenți cu vârsta de 3 ani și peste, pentru tratamentul neurofibroamelor plexiforme (NP) simptomatice inoperabile din neurofibromatoza de tip 1 (NF1)	finalizat
764	Anakinra	Kineret	tratamentul bolii provocate de coronavirusul 2019 la pacienții adulți cu pneumonie care necesită aport suplimentar de oxigen și la care există riscul de evoluție a bolii până la insuficiența respiratorie severă	finalizat
765	Isatuximabum	Sarclisa	În asociere cu pomalidomidă și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, care au beneficiat de minim două tratamente anterioare, inclusiv lenalidomidă și un inhibitor de proteazom și care au demonstrat progresia bolii sub ultimul tratament administrat.	finalizat
766	Nivolumabum	Opdivo	în asociere cu ipilimumab și 2 cicluri de chimioterapie pe bază de săruri de platină este indicat pentru tratamentul de primă linie al cancerului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici metastazat, la adulții ale căror tumori nu prezintă mutație sensibilizantă EGFR sau translocție ALK.	finalizat
767	Secukinumabum	Cosentyx	este indicat în tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la copii și adolescenți, începând cu vârsta de 6 ani, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	finalizat
768	Trastuzumab Deruxtecan	Enhertu	în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer mamar nerezecabil sau metastazat HER2 pozitiv, cărora li s-au administrat anterior două sau mai multe scheme de tratament anti-HER2.	finalizat
769	Vandetanib	Caprelsa	indicat în tratamentul neoplasmului medular tiroidian (NMT) agresiv și simptomatic la pacienți cu forma de boală local avansată, inoperabilă sau cu forma de boală metastazată. Caprelsa este indicat la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 5 ani și peste	finalizat
770	Upadacitinibum	Rinvoq	indicat pentru tratamentul dermatitei atopice moderate până la severe la adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste, care sunt candidați pentru terapie sistemică.	finalizat

771	Upadacitinibum	Rinvoq	indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți care au răspuns inadecvat sau prezintă intoleranță la unul sau mai multe MARMB. RINVOQ poate fi utilizat în monoterapie sau în asociere cu metotrexat.	finalizat
772	Upadacitinibum	Rinvoq	indicat pentru tratamentul spondilitei anchilozante active la pacienții adulți care au răspuns inadecvat la terapia convențională	finalizat
773	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu boală cronică de rinichi.	finalizat
774	Vandetanibum	Caprelsa	indicat în tratamentul neoplasmului medular tiroidian (NMT) agresiv și simptomatic la pacienți cu forma de boală local avansată, inoperabilă sau cu forma de boală metastazată. Caprelsa este indicat la adulți, adolescenți și copii cu vârstă de 5 ani și peste.	finalizat
775	Venicog	Veyvondi	indicat la adulți (cu vârsta de 18 ani și peste) cu boala von Willebrand (BVW), când tratamentul cu desmopresină (DDAVP) în monoterapie este ineficace sau nu este indicat pentru - tratarea hemoragiei și a sângerărilor chirurgicale; - prevenirea sângerărilor chirurgicale	finalizat
776	Pomalidomidum	Imnovid	indicat, în asociere cu borteomib și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu cărora li s-a administrat cel puțin o schemă de tratament anterioară, inclusiv lenalidomidă. Imnovid este indicat, în asociere cu dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-au administrat cel puțin două scheme de tratament anterioare, incluzând lenalidomidă și borteomib, și care au prezentat progresia bolii la ultimul tratament	finalizat
777	Afliberceptum	Eylea	indicată la adulți pentru tratamentul afectării acuității vizuale determinată de neovascularizația coroidală miopică (NVC miopică)	finalizat
778	Trifluridinum+Tipiracilum	Lonsurf	indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu neoplasm gastric metastatic, inclusiv adenocarcinom de joncțiune eso-gastrică, cărora li s-au administrat anterior cel puțin două regimuri de tratament sistemic pentru boală avansată.	finalizat
779	Enzalutamidum	Xtandi	tratamentul bărbaților adulți cu cancer de prostată metastatic sensibil la terapie hormonală (mCPSH) în asociere cu terapia de deprivare androgenică	finalizat
780	Enzalutamidum	Xtandi	tratamentul bărbaților adulți cu cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare (CPRC) cu risc crescut	finalizat
781	Dapagliflozinum	Forxiga	indicat la pacienții adulți și la copii cu vârsta de 10 ani și peste, pentru tratamentul insuficient controlat al diabetului zaharat de tip 2, în asociere cu dieta și programul de exerciții fizice - în monoterapie, dacă utilizarea metformin nu este adecvată din cauza intoleranței. - în asociere cu alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2.	finalizat
782	Atezolizumab	Tecentriq	în monoterapie este indicat pentru tratamentul NSCLC local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, după tratament anterior cu chimioterapie. Pacienților cu mutații ale EGFR sau cu NSCLC ALK-pozitiv trebuie, de asemenea, să li se fi administrat tratamente specifice, înaintea administrării Tecentriq	finalizat
783	Empagliflozinum	Jardiance	Tratamentul diabetului zaharat de tip 2 la adulți, insuficient controlat, ca adjuvant la dieta și exercitiul fizic: • ca monoterapie atunci când metformina este considerată inadecvată din cauza intoleranței, în plus față de alte medicamente pt.tratamentul diabetului zaharat; • în plus față de alte medicamente pt.tratamentul diabetului zaharat	finalizat
784	Pembrolizumabum	Keytruda	Carcinom esofagian KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie pe bază de săruri de platină și fluoropirimidină pentru tratamentul de primă linie al carcinomului esofagian local avansat nerezecabil sau metastatic, sau adenocarcinomului joncțiunii gastro-esofagiene HER-2 negativ, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 10	finalizat
785	Ramucirumabum	Cyramza	Cyramza în asociere cu docetaxel este indicat în cancerul pulmonar fără celule mici, la pacienți adulți, la nivel avansat local sau metastatic, la care boala a progresat ulterior chimioterapiei pe baza de platină.	finalizat
786	Xospata	Gilteritinib	Xospata poate fi reluat pentru pacienții în urma unui transplant de celule stem hematopoietice (TCSH)	finalizat
787	Bulevertidă	Hepcludex	Hepcludex este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitic delta (VHD) la pacienții adulți cu boală hepatică compensată care au ARN VHD plasmatic (seric) pozitiv.	finalizat
788	Dupilumabum	Dupixent	Rinosinuzita cronică însoțită de polipoza nazală. Dupixent este indicat ca terapie adăugată împreună cu corticosteroizii administrați intranasal pt.tratamentul adulților cu RSCcPN severă, în cazul cărora terapia cu corticosteroizi sistemici și/sau intervenția chirurgicală nu asigură controlul adecvat al bolii.	finalizat

789	Nitisinonum	Orfadin	indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu alkaptonurie.	finalizat
790	Canakinumabum	Ilaris	Ilaris este indicat pentru tratamentul sindroamelor febrile autoinflamatorii periodice, la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste această vârstă: Sindrom periodic asociat cu receptorul factorului de necroză tumorală (TRAPS), Sindromul hiperimunoglobulinemiei D (HIDS)/deficitului de mevalonat kinază (MKD) Febră familială mediteraneană (FMF)	finalizat
791	Dupilumabum	Dupixent	Copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani și 11 ani Dupixent este indicat la copii cu vârsta cuprinsă între 6 ani și 11 ani, ca terapie adăugată de întreținere pentru astmul bronșic sever, însoțit de inflamație de tip 2 caracterizat prin eozinofilie și/sau valori crescute ale fracției de oxid nitric din aerul expirat (FeNO), care este inadecvat controlat cu doze medii până la mari de corticosteroizi inhalatori (CSI) plus un alt medicament utilizat ca tratament de întreținere.	finalizat
792	Isatuximabum	Sarclisa	în asociere cu carfilzomib și pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu c ârora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.	finalizat
793	Ivacaftor+Tezacaftor+Elexacaftor Ivacaftor	Kaftrio/ Kalideco	Kaftrio este indicat, în cadrul unei scheme terapeutice în asociere cu ivacaftor, pentru tratamentul fibrozei chistice (FC) la pacienți cu vârsta de 6 ani și peste, care prezintă cel puțin o mutație F508del a genei regulatorului de conductanță transmembranară al fibrozei chistice (CFTR) Kalydeco comprimate este indicat în cadrul unei scheme terapeutice cu combinația ivacaftor/tezacaftor/elexacaftor comprimate, pentru tratamentul adulților, adolescenților și copiilor cu vârsta de 6 ani și peste cu fibroză chistică, care prezintă cel puțin o mutație F508del la nivelul genei CFTR	finalizat
794	Siponimod	Mayzent 1 mg	Mayzent este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu scleroză multiplă secundară progresivă (SPMS), cu boală activă evidențiată prin recidive sau caracteristici imagistice ale activității inflamatorii	finalizat
795	Mosunetuzumab	Lunsumio	Lunsumio trebuie administrat numai sub supravegherea unui medic cu experiență în utilizarea tratamentelor antineoplazice, într-un spațiu cu dotări medicale corespunzătoare pentru gestionarea reacțiilor severe, precum sindromul eliberării de citokine (SEC)	finalizat
796	Rituximab	Mabthera	MabThera este indicat pentru tratamentul pacienților cu pemfigus vulgar (PV) moderat până la sever.	finalizat
797	Polatuzumab vedotin	Polivy	Polivy în asociere cu rituximab, ciclofosamidă, doxorubicină și prednison (R-CHP) este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz cu celulă mare B (DLBCL), netratat anterior	finalizat
798	Ravulizumab	Ultomiris	Ultomiris este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, copii și adolescenți cu o greutate corporală de 10 kg sau mai mult cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN): - la pacienții cu hemoliză cu simptom(e) clinic(e) sugestiv(e) pentru activitatea crescută a bolii. - la pacienții care sunt stabili clinic după ce au fost tratați cu eculizumab cel puțin în ultimele 6 luni	finalizat
799	Ravulizumab	Ultomiris	Ultomiris este indicat în tratamentul pacienților cu greutate corporală de 10 kg sau mai mult cu sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa), care nu au fost tratați anterior cu inhibitori de complement sau au fost tratați cu eculizumab pe o perioadă de cel puțin 3 luni și prezintă dovezi de răspuns la eculizumab	finalizat
800	Anifrolumab	Saphnelo	Saphnelo este indicat ca terapie adăugată pentru tratamentul pacienților adulți cu lupus eritematos sistemic (LES) activ, moderat până la sever, cu titru pozitiv de autoanticorpi în pofida utilizării tratamentului standard.	finalizat
801	Atezolizumab	Tecentriq	ca tratament adjuvant după rezecție completă și chimioterapie cu săruri de platină la pacienții adulți cu NSCLC cu un risc înalt de recurență, ale căror tumori exprimă PD-L1 pe suprafața a ≥ 50% din celulele tumorale (CT) și care nu au NSCLC ALK-pozitiv sau mutații EGFR	finalizat
802	Vedolizumabum	Entyvio	tratamentul pacienților adulți cu boala Crohn, moderat până la sever activă, care au prezentat un răspuns inadecvat, nu au mai prezentat răspuns sau au prezentat intoleranță la tratamentul convențional sau la un antagonist al factorului alfa de necroză tumorală (TNFα)	finalizat
803	Dolutegravirum	Tivicay	indicat în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus -HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de cel puțin 6 ani sau peste și care cântăresc cel puțin 14 kg	finalizat
804	Nintedanib	Ofev	indicat la adulți pentru tratamentul bolii pulmonare interstițiale asociate sclerodermiei (BPI-S).	finalizat

805	Filgotinib	Jyseleca	indicat pentru tratamentul poliartritei reumatoide active moderată până la severă la pacienți adulți care au obținut un răspuns inadecvat sau care prezintă intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală (MARB). Jyseleca poate fi administrat în monoterapie sau în asociere cu metotrexat (MTX).	finalizat
806	Ibrutinibum	Imbruvica	este indicat ca monoterapie sau în asociere cu rituximab sau obinutuzumab sau venetoclax în tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratați anterior	finalizat
807	Nivolumabum	Opdivo	OPDIVO în asociere cu ipilimumab este indicat pentru tratamentul cancerului colorectal metastazat cu deficiență de reparare a nepotrivirii ADN-ului sau cu instabilitate microsatelită de grad înalt, după chimioterapie anterioară pe bază de asocieri de fluoropirimidine, la adulți	finalizat
808	Nivolumabum	Opdivo	OPDIVO în asociere cu ipilimumab este indicat pentru tratamentul de primă linie al mezoteliomului pleural malign nerezecabil, la adulți.	finalizat
	Eculizumab	Soliris	Soliris este indicat pentru tratarea adulților cu: - Miastenie gravă generalizată (MG) refractară la pacienții cu status pozitiv pentru anticorpii anti-receptori de acetilcolină (RAC)	finalizat
809	Vismodegib	Erivedge	Erivedge este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu: • carcinom bazocelular metastazat simptomatic • carcinom bazocelular avansat local, inadecvat pentru intervenție chirurgicală sau radioterapie	finalizat
810	Tucatinib	Tukysa	TUKYSA este indicat în asociere cu trastuzumab și capecitabină pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer mamar HER2 pozitiv în stadiu avansat la nivel local sau metastatic cărora li s-au administrat cel puțin 2 scheme anterioare de tratament anti-HER2.	finalizat
811	Bimekizumabum	Bimzelx	Bimzelx este indicat în tratamentul psoriazisului în plăci moderat până la sever, la adulții care sunt eligibili pentru terapie sistemică.	finalizat
812	Osilodrostatum	Isturisa	Isturisa este indicat pentru tratamentul sindromului Cushing endogen la adulți.	finalizat
813	Trientinum	Cuprior	Cuprior este indicat pentru tratamentul bolii Wilson la adulți, adolescenți și copii ≥ 5 ani cu intoleranță la terapia cu D-penicilamină.	finalizat
814	Pembrolizumabum	Keytruda	este indicat în asociere cu axitinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulți	finalizat
815	Pembrolizumabum	Keytruda	este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului avansat (nerezecabil sau metastatic) la pacienți adulți.	finalizat
816	Pembrolizumabum	Keytruda	este indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu melanom stadiul III și extindere la nivelul ganglionilor limfatici, la care s-a efectuat rezecție completă	finalizat
817	Tisagenlecleucel	Kymriah	Tratamentul pacienților adulți cu limfom folicular recidivant sau refractar, după 2 sau mai multe linii de terapie sistemică.	finalizat
818	Vedolizumabum	Entyvio	este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu pouchită cronică activă moderată până la severă, cărora li s-a efectuat o proctocolectomie și anastomoză ileo-anală pentru colită ulcerativă și care au prezentat un răspuns inadecvat sau nu mai prezintă răspuns la tratamentul cu antibiotice.	finalizat
819	Romosumabum	Evenity	este indicat pentru tratamentul osteoporozei severe la femeile aflate în perioada de postmenopauză cu risc crescut de fracturi	finalizat
820	Cabozantinibum	Cabometyx	în asociere cu nivolumab, este indicat pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule renale în stadiu avansat la adulți	finalizat
821	Volanesorsen	Waylivra	Waylivra este indicat ca adjuvant de dietă la pacienții adulți cu sindromul chilomicronemiei familiale (SCF) confirmat genetic și aflați la risc înalt de pancreatită, la care răspunsul la dietă și tratamentul de scădere a trigliceridelor a fost inadecvat.	finalizat
822	Inotersen	Tegsedi	este indicat pentru tratamentul polineuropatiei în stadiul 1 sau 2 la pacienții adulți cu amiloidoză ereditară cu transtiretină (hATTR).	finalizat
823	Risankizumabum	Skyrizi	în monoterapie sau în asociere cu metotrexat (MTX) este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active la adulți cu răspuns inadecvat sau intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală (MARB).	finalizat
824	Nivolumabum	Opdivo	în asociere cu chimioterapia combinată pe bază de fluoropirimidine și săruri de platină este indicat pentru tratamentul de primă linie al adenocarcinomului gastric, de joncțiune eso-gastrică sau esofagian avansat sau metastazat, HER-2 negativ, la pacienții adulți ale căror tumori prezintă expresie PD-L1 cu un scor combinat (CPS, combined positive score) ³ 5	finalizat
825	Nivolumabum	Opdivo	în monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al cancerului esofagian sau de joncțiune eso-gastrică la pacienții adulți care prezintă boală patologică reziduală după tratament neoadjuvant anterior cu chimioradioterapie	finalizat

826	Cemiplimab	Libtayo	Cancer pulmonar fără celule mici LIBTAYO este indicat ca monoterapie în tratamentul de primă linie al pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici (non-small cell lung cancer NSCLC) cu exprimare a PD-L1 (în ≥ 50% din celulele tumorale), fără mutații EGFR, ALK sau ROS1, care au: • NSCLC local avansat și care nu sunt candidați pentru chimioradioterapie standard sau • NSCLC metastazat	finalizat
827	Olipudase Alfa	Xenpozyme	Xenpozyme este indicat ca terapie de substituție enzimatică pentru tratamentul manifestărilor deficitului de sfingomielinază acidă (DSMA) localizate în afara Sistemului Nervos Central (SNC) la pacienții copii, adolescenți și adulți cu tip A/B sau tip B.	finalizat
828	Anakinra	Kineret	indroame periodice asociate cu criopirina (CAPS) Kineret este indicat pentru tratamentul CAPS, inclusiv: - Boala inflamatorie multisistemică cu debut neonatal (NOMID)/sindromul cronic infantil neurologic-cutanat-articular (CINCA) - Sindromul Muckle-Wells (MWS) - Sindromul autoinflamator familial la rece (FCAS)	finalizat
829	Anakinra	Kineret	Febra mediteraneană familială (FMF) Kineret este indicat pentru tratamentul febrei mediteraneene familiale (FMF). Kineret trebuie administrat în asociere cu colchicină, dacă este cazul	finalizat
830	Anakinra	Kineret	Kineret este indicat la adulți, adolescenți, copii și sugari cu vârsta de 8 luni și peste cu o greutate corporală de 10 kg sau peste pentru tratamentul bolii Still, inclusiv artrită juvenilă idiopatică sistemică (AJIS) și boala Still cu debut la vârsta adultă (BSVA), cu caracteristici sistemice active de activitate moderată până la crescută a bolii sau la pacienții cu activitate continuă a bolii după tratamentul cu antiinflamatoare nesteroidiene (AINS) sau glucocorticoizi.	finalizat
831	Rurioctocog Alfa Pegol	Adynovi	Adynovi 3000UI este indicat pentru tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).	finalizat
832	Empagliflozin	Jardiance	Jardiance este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca adjuvant la regimul alimentar și exercițiul fizic - ca monoterapie atunci când metformina este considerat a inadecvată din cauza intoleranței - în plus față de alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat	finalizat
833	Empagliflozin	Jardiance	Insuficiență cardiacă Jardiance este indicat pentru tratamentul adulților cu insuficiență cardiacă cronică simptomatică.	finalizat
834	Adalimumabum	Humira	Humira este indicat pentru tratamentul uveitei non-infecțioase, intermediare, posterioare și panuveitei la pacienții adulți care nu au avut un răspuns adecvat la corticosteroizi, la pacienții care necesită scăderea progresivă a dozelor de corticosteroizi sau pentru care nu este potrivit tratamentul cu corticosteroizi	finalizat
835	Avatrombopag	Doptelet	Doptelet este indicat pentru tratamentul trombocitopeniei imune (TPI) primare cronice la pacienții care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline).	finalizat
836	Dacarbazinum	Deferiprone Lipomed	Deferiprone Lipomed în monoterapie este indicat pentru tratamentul supraîncărcării cu fier la pacienții cu talasemie majoră atunci când terapia prin chelare curentă este contraindicată sau inadecvată. Deferiprone Lipomed în combinație cu un alt chelator (vezi pct. 4.4) este indicat la pacienții cu talasemie majoră atunci când monoterapia cu orice alt chelator de fier este ineficientă, sau atunci când prevenirea sau tratamentul consecințelor potențial letale ale supraîncărcării cu fier (în special supraîncărcarea la nivel cardiac) justifică corectarea rapidă sau intensivă	finalizat
837	Voretigene Neparvovec	Luxturna	Luxturna este indicat în tratamentul pacienților adulți și copii și adolescenți care prezintă pierderea vederii din cauza distrofiei retiniene ereditare, determinate de mutații RPE65 bialelice confirmate, și care au un număr suficient de celule retiniene viabile.	finalizat
838	Adalimumabum	Humira	Humira este indicat pentru tratamentul hidradenitei supurative (acnee inversă) active, moderată până la severă la pacienții adulți și adolescenți de la vârsta de 12 ani care nu au răspuns corespunzător la tratamentul sistemic convențional pentru HS	finalizat

839	Entrectinib	Rozlytrek	Rozlytrek administrat în monoterapie, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 12 ani sau mai mare, cu tumori solide care exprimă o fuziune de gene de tipul receptorului neutrofic de tirozin kinază (NTRK), • care au o boală avansată local, metastază sau în cazul căreia este probabil ca rezecția chirurgicală să ducă la morbiditate severă, și • care nu au primit anterior un inhibitor NTRK • care nu au opțiuni de tratament satisfăcătoare	finalizat
840	Abirateronum	Abiraterona Mylan 1000 mg cpr film.	Solicitare adaugare concentrație 1000 mg pentru indicațiile: Abirateronă Mylan este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în: • tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT) • tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la castrare (mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer), la bărbații adulți asimptomatici sau ușor simptomatici, după eșecul terapiei de deprivare androgenică și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic • tratamentul mCRPC la bărbații adulți a căror boală a evoluat în timpul sau după administrarea unei scheme de tratament chimioterapic pe bază pe docetaxel	finalizat
841	Sebelipase alfa	Kanuma	KANUMA este indicat pentru tratamentul de substituție enzimatică (TSE) pe termen lung la pacienții cu deficit de lipază acidă lizozomală (LAL) de toate vârstele.	finalizat
842	Sacubitril+Valsartanum	Entresto	Entresto este indicat la pacienții adulți în tratamentul insuficienței cardiace simptomatice cronice, cu fracție de ejeție redusă	finalizat
843	Sacituzumab Govitecan	Trodelyv	Trodelyv administrat în monoterapie este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu cancer mamar nerezecabil sau metastazat, triplu negativ (mTNBC), care au utilizat anterior două sau mai multe terapii sistemice, incluzând cel puțin una pentru boală în stadiu avansat	finalizat
844	Fremanezumabum	Ajovy	AJOVY este indicat pentru profilaxia migrenei la adulții care prezintă cel puțin 4 zile cu migrenă pe lună.	finalizat
845	Everolimus	Afinitor	Afinitor este indicat pentru tratamentul cancerului mamar în stadiu avansat cu receptori pentru hormoni prezenți, cu HER2/neu negativ, administrat în combinație cu exemestane, la femeile în postmenopauză, fără boală viscerală simptomatică, după recurența sau progresia bolii în urma administrării unui inhibitor de aromatază non-steroidal.	finalizat
846	Azacitidina	Onureg	Onureg este indicat ca tratament de întreținere la pacienții adulți cu leucemie mieloidă acută (LMA), care au obținut remisiune completă (RC) sau remisiune completă cu recuperare incompletă a trombocitelor (RCI) în urma terapiei de inducție cu sau fără tratament de consolidare, și care sunt neeligibili pentru transplantul de celule stem hematopoietice (TCSH) sau care nu intenționează să îl efectueze.	finalizat
847	Migalastat	Galafold	Galafold este indicat pentru tratamentul de lungă durată al adulților și adolescenților în vârstă de cel puțin 12 ani, cu diagnostic confirmat de boală Fabry (deficit de α -galactozidază A) și care prezintă o mutație sensibilă	finalizat
848	Nivolumabum	Opdivo	în asociere cu cabozantinib pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat, la adulți	finalizat
849	Asciminib	Scemblix	Scemblix este indicat în tratarea pacienților adulți cu leucemie mieloidă cronică, cu cromozom Philadelphia, în faza cronică (LMC-FC Ph+) tratați anterior cu doi sau mai mulți inhibitori de tirozin kinază	finalizat
850	Asfotase alfa	Strensiq	Strensiq este indicat pentru tratamentul de substituție enzimatică pe termen lung, la pacienții cu hipofosfatazie cu debut în copilărie și adolescență, pentru tratamentul manifestărilor osoase ale bolii	finalizat
851	Trastuzumab Deruxtecan	Enhertu	Enhertu în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer mamar nerezecabil sau metastazat HER2 pozitiv, cărora li s-au administrat anterior una sau mai multe scheme de tratament anti-HER2.	finalizat
852	Voxritidum	Voxzogo	Voxzogo este indicat în tratamentul acondroplaziei la pacienți cu vârsta de cel puțin 2 ani, ale căror epifize nu sunt închise. Diagnosticul de acondroplazie trebuie confirmat prin testare genetică corespunzătoare	finalizat
853	Somatogronum	Ngenla	Ngenla este indicat pentru tratamentul copiilor și adolescenților începând cu vârsta de 3 ani cu tulburări de creștere cauzate de secreția insuficientă de hormon de creștere.	finalizat
854	Lorlatinibum	Lorviqua 25mg si 100mg	Lorviqua administrat în monoterapie este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu NSCLC avansat, pozitiv pentru ALK, a căror boală a progresat după: ▯ alectinib sau ceritinib ca primă terapie cu inhibitor tirozin-kinazic (TKI) al ALK; sau 3 ▯ crizotinib și cel puțin un alt ALK TKI.	finalizat
855	Lorlatinibum	Lorviqua 25mg si 100mg	Lorviqua administrat în monoterapie este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) avansat, pozitiv pentru kinaza limfomului anaplastic (ALK), netratată anterior cu un inhibitor al ALK.	finalizat

856	Nivolumabum	Opdivo 120mg	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul cancerului bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici local avansat sau metastazat, după tratamentul anterior cu chimioterapie, la adulți.	finalizat
857	Nivolumabum	Opdivo 120mg	OPDIVO în asociere cu ipilimumab este indicat pentru tratamentul de primă linie al carcinomului renal avansat cu prognostic intermediar/nefavorabil, la adulți	finalizat
858	Nivolumabum	Opdivo 120mg	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul limfomului Hodgkin clasic recidivat sau refractar după transplant autolog de celule stem (TACS) și tratament cu brentuximab vedotin la adulți.	finalizat
859	Ozanimod	Zeposia	Zeposia este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă (CU) activă moderată și severă, care au obținut un răspuns inadecvat, au pierdut răspunsul sau au manifestat intoleranță la terapia convențională sau la un medicament biologic.	finalizat
860	Nivolumabum	Opdivo 120mg	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastazat, la adulții la care s-a efectuat rezecție completă	finalizat
861	Nivolumabum	Opdivo 120mg	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul cancerului scuamos de cap și gât recurent sau metastazat, la adulți la care boala progresează în timpul sau după terapie pe bază de săruri de platină	finalizat
862	Nivolumabum	Opdivo 120mg	OPDIVO este indicat în monoterapie pentru tratamentul melanomului în stadiu avansat (nerezecabil sau metastazat) la adulți	finalizat
863	Nivolumabum	Opdivo 120mg	OPDIVO este indicat ca monoterapie pentru tratamentul carcinomului renal avansat după terapie anterioară, la adulți.	finalizat
864	Pembrolizumabum	Keytruda	KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru adulții cu cancer colorectal MSI-H sau dMMR, în următoarele situații: - tratamentul de primă linie al cancerului colorectal metastatic;	finalizat
865	Nirmatrelvir / ritonavir	Paxlovid	Paxlovid este indicat pentru tratamentul bolii cauzate de coronavirusul 2019 (COVID-19), la adulții care nu necesită administrarea suplimentară de oxigen și care prezintă risc crescut de evoluție spre o formă severă de COVID-19	finalizat
866	Vutrisiranum	Amvuttra	Amvuttra este indicat pentru tratamentul amiloidozei ereditare mediate de transtiretină (amiloidoză hATTR) la pacienții adulți cu polineuropatie stadiul 1 sau 2.	finalizat
867	Pembrolizumabum	Keytruda	KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie pentru tratamentul cancerului mamar triplu negativ local recurent nerezecabil sau metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 10 și cărora nu li s-a administrat anterior chimioterapie pentru boala metastatică	finalizat
868	Dabigatranum etexilatam	Telexer	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale (AVC) și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedente de AVC sau atac ischemic tranzitor (AIT), vârsta ≥75 ani, insuficiență cardiacă (clasa NYHA ≥II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	finalizat
869	Dapagliflozinum	Forxiga	Forxiga este indicat pentru tratamentul pacienților adulți simptomatici cu insuficiența cardiacă cronică	finalizat
870	Odevixibatam	Bylvay	Bylvay este indicat pentru tratamentul colestazei intrahepatice familiale progresive (CIFP) la pacienți cu vârsta de 6 luni sau peste	finalizat
871	Pazopanibum	Pazopanib Zentiva	necompletata în cerere	finalizat
872	Pazopanibum	Pazopanib Zentiva	necompletata în cerere	finalizat
873	Abirateronum	Abiraterona Zentiva	ABIRATERONĂ ZENTIVA este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în: tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy) (vezi pct. 5.1) tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, rezistent la castrare (mCRPC, metastatic castration resistant prostate cancer), la bărbații adulți asimptomatici sau ușor simptomatici, după eșecul terapiei de deprivare androgenică și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic (vezi pct. 5.1) tratamentul mCRPC la bărbații adulți a căror boală a evoluat în timpul sau după administrarea unei scheme de tratament chimioterapic pe bază pe docetaxel.	finalizat
874	Abirateronum	Bixodalan	tratamentul neoplasmului de prostată, în stadiu metastazic, cu nivel crescut de risc, recent diagnosticat, care răspunde la tratament (mHSPC), la bărbații adulți, în combinație cu terapie de priver de hormoni androgeni (TPA)	finalizat
875	Abirateronum	Bixodalan	tratamentul neoplasmului de prostată metastatic, rezistent la orhiectomie (mCRPC), la bărbații adulți care sunt asimptomatici sau ușor simptomatici, după eșecul terapiei de priver de hormoni androgeni și la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic	finalizat
876	Cemiplimabum	Libtayo	Carcinom bazocelular LIBTAYO este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu carcinom bazocelular metastazat sau local avansat (CBCLA sau CBCm), care prezintă progresie a bolii sau care nu tolerează un inhibitor al căii de semnalizare Hedgehog (IHH).	finalizat

877	PLANTE (MESTEACAN)	FILSUVEZ GEL	Tratamentul plăgilor cu grosime parțială asociate cu epidermoliză buloasă (EB) distrofică și joncțională la pacienți cu vârsta de 6 luni și peste.	finalizat
878	PALIPERIDONUM	BYANNU	adăugare concentrație, în indicația: BYANNU, administrat sub formă de injecție la interval de 6 luni, este indicat în tratamentul de întreținere al schizofreniei la pacienții adulți stabiliți în clinic cu palmitat de paliperidonă administrat injectabil la 1 lună sau 3 luni	finalizat
879	OLAPARIBUM	LYNPARZA 100 mg comprimate filmate LYNPARZA 150 mg comprimate filmate	• în asociere cu abirateronă și prednison sau prednisonol pentru tratamentul pacienților adulți cu CPRcm la care chimioterapia nu este indicată clinic	finalizat
880	DOLUTEGRAVIRUM	TIVICAY 5 mg	Tivicay este indicat în asociere cu alte medicamente anti-retrovirale pentru tratamentul infecției cu Virusul Imunodeficienței Umane (Human Immunodeficiency Virus - HIV) la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de cel puțin 4 săptămâni sau peste și care cântăresc cel puțin 3 kg.	finalizat
881	RANIBIZUMABUM	Ximluci 10 mg/ml	Ximluci este indicat la adulți pentru tratamentul neovascularizației (forma umedă) din cadrul degenerescenței maculare senile (DMS).	finalizat
882	RANIBIZUMABUM	Ximluci 10 mg/ml	Ximluci este indicat la adulți pentru tratamentul afectării acuității vizuale determinate de edem macular diabetic (EMD)	finalizat
883	TRASTUZUMAB DERUXTECAN	ENHERTU 100 mg	Enhertu în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer mamar nerezecabil sau metastazat cu HER2 scăzut, cărora li s-a administrat anterior chimioterapie în contextul metastazelor sau au manifestat recidiva bolii pe parcursul sau în termen de 6 luni de la finalizarea chimioterapiei adjuvante	finalizat
884	Emicizumab	Hemlibra	Hemlibra este indicat ca tratament profilactic de rutină pentru episoadele de sângerare la pacienți cu hemofilie A (deficiență congenitală de factor VIII): • care prezintă inhibitori de factor VIII • care nu prezintă inhibitori de factor VIII având: - forme severe ale bolii (FVIII < 1%) - forme moderate ale bolii (FVIII ≥ 1% și ≤ 5%), cu fenotipul sângerării sever.	finalizat
885	ARSENICUM TRIOXIDUM	Trisenox 2 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii și consolidare la pacienții adulți care prezintă:leucemie acută promielocitară (LAP) recurentă/refractară (tratamentul anterior trebuie să fi inclus un retinoid și chimioterapie) caracterizată prin prezența translocației t(15;17) și / sau prezența genei leucemiei promielocitare/receptorului-alfa al acidului retinoic (LPM/RAR-alfa).	finalizat
886	ARSENICUM TRIOXIDUM	Trisenox 2 mg/ml concentrat pentru soluție perfuzabilă	TRISENOX este indicat pentru inducerea remisiunii și consolidare la pacienții adulți care prezintă: • leucemie acută promielocitară (LAP) cu risc scăzut până la intermediar, nou diagnosticată (număr de leucocite ≤10 x 10 ³ /μl) în asociere cu acidul all-trans-retinoic (AATR)	finalizat
887	Tofacitinib	XELJANZ	Tofacitinib este indicat în tratamentul artritei idiopatice juvenile poliarticulare active (poliartrită cu factor reumatoid pozitiv [RF+] sau negativ [RF-] și oligoartrită extinsă) și al artritei psoriazice juvenile (APs), la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste, care au răspuns inadecvat la terapia anterioară cu DMARD. Tofacitinib poate fi administrat în asociere cu metotrexat (MTX) sau ca monoterapie, în caz de intoleranță la MTX sau în cazul în care continuarea tratamentului cu MTX este inadecvată.	finalizat
888	ISAVUCONAZOLUM	XELJANZ	Cresemba este indicat indicat la adulți pentru tratamentul mucormicozei la pacienții la care amfotericina B este inadecvată	finalizat
889	ISAVUCONAZOLUM	Cresemba	Cresemba este indicat indicat la adulți pentru tratamentul aspergilozei invazive	finalizat
890	BUDESONIDUM	KINPEYGO	Kinpeygo este indicat în tratamentul nefropatiei primare (IgAN) cu imunoglobulină A (IgA) la adulți cu risc de progresie rapidă a bolii, cu un raport proteine - creatinină în urină (UPCR) ≥1,5 g/gram	finalizat
891	PEMBROLIZUMABUM	KEYTRUDA 25 mg/ml	KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie ca tratament neoadjuvant, iar apoi continuat în monoterapie ca tratament adjuvant după o intervenție chirurgicală, pentru tratamentul adulților cu cancer mamar triplu negativ local avansat sau în stadiu incipient, cu risc crescut de recurență	finalizat
892	DAUNORUBICINUM	DAUNORUBICINA KEMEX 20 mg	Daunorubicina HCL în asociere cu alte medicamente antineoplazice este indicată pentru inducerea remisiunii în leucemia limfocitară acută (mielogenă, monocitară, eritroidică) la adulți și pentru inducerea remisiunii în leucemia limfocitară acută la copii și adulți	finalizat
893	AVATROMBOPAG	DOPTELET 20 mg comprimate filmate	Doptelet este indicat pentru tratamentul trombocitopeniei severe la pacienți adulți cu boală hepatică cronică care sunt programați pentru a li se efectua o procedură invazivă.	finalizat
894	MARALIXIBAT	LIVMARLI 9,5 mg/ml sol.orală	Livmarli este indicat pentru tratamentul pruritului colestatic la pacienți cu sindrom Alagille (SALG) cu vârsta de 2 luni și peste	finalizat

895	FARICIMABUM	Vabysmo 120 mg/ml soluție injectabilă	Vabysmo este indicat pentru tratamentul adulților pacienți cu afectare a acuității vizuale determinată de edemul macular diabetic (EMD).	finalizat
896	ABROCITINIBUM	Cibinqo 50 mg, 100 mg, 200 mg	Cibinqo este indicat pentru tratamentul dermatitei atopice, forma moderată până la severă, la pacienții adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică.	finalizat
897	Sotorasib	Lumykras	LUMYKRAS administrat în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici (NSCLC) avansat care prezintă mutația KRAS G12C și a căror boală a progresat după cel puțin o linie anterioară de terapie sistemică.	finalizat
898	Rinvoq	Upadacitinibum	RINVOQ este indicat pentru tratamentul colitei ulcerative active, moderată până la severă, la pacienții adulți care au avut un răspuns inadecvat, nu au mai răspuns sau au prezentat intoleranță la terapia convențională sau la un medicament biologic.	finalizat
899	Rivaroxabanum	Xarelto	Xarelto 10mg este indicat în tratamentul trombozei venoase profunde (TVP) și al emboliei pulmonare (EP) și prevenirea recurenței TVP și a EP la adulți	finalizat
900	Pembrolizumabum	KEYTRUDA 25 mg/ml	KEYTRUDA este indicat în monoterapie pentru tratamentul adjuvant al adulților cu carcinom renal cu risc de recurență crescut după nefrectomie, sau în urma nefrectomiei și rezecției leziunilor metastatice	finalizat
901	TERIFLUNOMIDUM	Aubagio	AUBAGIO este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 10 ani și peste, cu scleroză multiplă recurent-remisivă (SM).	finalizat
902	Cabozantinib	Cabometyx	CABOMETYX® comprimate filmate în monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom tiroidian diferențiat (DTC) avansat local sau metastazat, refractari sau neeligibili la terapia cu iod radioactiv (RAI), care au prezentat progresie în cursul terapiei sistemice administrate anterior.	finalizat
903	OLAPARIBUM	LYNPARZA 100 mg comprimate filmate LYNPARZA 150 mg comprimate filmate	în monoterapie sau în asociere cu tratament endocrin în context adjuvant la pacienții adulți cu neoplasm mamar, în stadiu incipient, cu risc crescut, HER2 negativ, cu mutații germinale ale genei BRCA1/2, tratați anterior cu chimioterapie în context neoadjuvant sau adjuvant	finalizat
904	Tebentafusp	Kimmtrak	KIMMTRAK este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu rezultat pozitiv la antigenul leucocitar uman (HLA)-A*02:01 cu melanom uveal nerezecabil sau metastatic	finalizat
905	Pegcetacoplan	Aspaveli	Tratamentul pacienților adulți cu hemoglobinurie paroxistică nocturnă (HPN) care sunt anemici după tratamentul cu un inhibitor al C5 timp de cel puțin 3 luni.	finalizat
906	Caplacizumabum	Cablivi	Cablivi este indicat pentru tratamentul adulților și adolescenților cu vârsta de 12 ani și peste și greutatea corporală de minim 40 kg, care manifestă un episod de purpură trombocitopenică trombotică dobândită (PTTd), în asociere cu plasmafereză și tratament imunosupresor	finalizat
907	Ravulizumabum	Ultomiris	Hemoglobinurie paroxistică nocturnă	finalizat
908	Regorafenibum	Stivarga	Neoplasm colorectal (CCR – cancer colorectal) metastazat, cărora li s-au administrat anterior tratamentele disponibile sau care nu sunt considerați candidați pentru tratamentele disponibile. Acestea includ chimioterapia pe bază de fluoropirimidină, un tratament anti-VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor) și un tratament anti-EGFR (Epidermal Growth Factor Receptor)	finalizat
909	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40 mg/ml	Eylea este indicată la adulți pentru tratamentul afectării acuității vizuale determinată de neovascularizația coroidală miopică (NVC miopică)	finalizat
910	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40 mg/ml	Eylea este indicată la adulți pentru tratamentul afectării acuității vizuale determinată de edemul macular secundar occluziei venei retinei (OVR de ram sau OVR centrală)	finalizat
911	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40 mg/ml	Eylea este indicată la adulți pentru tratamentul afectării acuității vizuale determinată de edemul macular diabetic (EMD)	finalizat
912	AFLIBERCEPTUM	EYLEA 40 mg/ml	Eylea este indicată la adulți pentru tratamentul degenerescenței maculare legată de vârstă (DMLV) forma neovasculară (umedă)	finalizat
913	RISANKIZUMABUM	Skyrizi 360 mg soluție injectabilă în cartuș	Skyrizi este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă moderată până la severă care au avut un răspuns inadecvat, au pierdut răspunsul sau au manifestat intoleranță la terapia convențională sau o terapie biologică.	finalizat
914	FARICIMABUM	Vabysmo 120 mg/ml soluție injectabilă	Vabysmo este indicat pentru tratamentul adulților pacienți cu: • degenerescență maculară legată de vârstă (DMLV), forma neovasculară (umedă)	finalizat
915	Galcanezumabum	Emgality	Emgality este indicat pentru profilaxia migrenei la adulții care au cel puțin 4 zile de migrenă/lună	finalizat
916	Eptinezumabum	VYEPTI	VYEPTI este indicat pentru profilaxia migrenei la adulți care au cel puțin 4 zile cu migrenă pe lună.	finalizat

917	Cenobamatum	Ontozry	Ontozry este indicat ca tratament adăugat în cazul crizelor convulsive cu debut focal, cu sau fără generalizare secundară, la pacienții adulți cu epilepsie care nu a fost controlată adecvat având un istoric de tratament cu cel puțin 2 medicamente antiepileptice.	finalizat
918	Avalglucosidasum alpha	NEXVIADYME	Nexviadyme (alfa avalglucozidază) este indicat pentru tratamentul de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu boală Pompe (deficit de α -glucozidază acidă)	finalizat
919	Eltrombopag	Revolade 50 mg	Adaugare segment populațional reprezentat de grupul populațional devenit refractar mai devreme de 6 luni de la diagnostic, în cadrul indicației: Revolade este indicat pentru tratamentul pacienților adulți, cu trombocitopenie imună primară (TIP) și care sunt refractari la alte tratamente (de exemplu corticosteroizi, imunoglobuline)	finalizat
920	UPADACITINIBUM	RINVOQ	RINVOQ este indicat pentru tratamentul bolii Crohn active, moderată până la severă, la pacienți adulți care au avut un răspuns inadecvat, nu au mai răspuns sau au prezentat intoleranță la terapia convențională sau la un medicament biologic.	finalizat
921	Ravulizumabum	Ultomiris	Sindrom hemolitic uremic atipic (SHUa)Ultomiris este indicat în tratamentul pacienților adulți și copii și adolescenți cu greutate corporală de 10 kg sau mai mult cu SHUa, care nu au fost tratați anterior cu inhibitori de complement sau au fost tratați cu eculizumab pe o perioadă de cel puțin 3 luni și prezintă dovezi de răspuns la eculizumab.	finalizat
922	Fenfluraminum	Fintepla	Fintepla este indicat în tratamentul crizelor convulsive din sindromul Lennox Gastaut ca terapie asociată la alte medicamente antiepileptice la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste	finalizat
923	Fenfluraminum	Fintepla	Fintepla este indicat în tratamentul crizelor convulsive din sindromul Dravet ca terapie asociată la alte medicamente antiepileptice la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste	finalizat
924	Ravulizumabum	Ultomiris	Adaugare segment populațional reprezentat de grupul populațional cu SHUa care au fost tratați cu eculizumab pe o perioadă de cel puțin 3 luni și prezintă dovezi de răspuns la eculizumab.	finalizat
925	Pembrolizumabum	Keytruda	KEYTRUDA este indicat în asociere cu chimioterapie, cu sau fără bevacizumab, pentru tratamentul cancerului cervical persistent, recurent sau metastatic, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 1	finalizat
926	Tezepelumab	Tezspire	Tezspire este indicat ca terapie adăugată de întreținere la adulții și adolescenții cu vârsta de 12 ani și peste, cu astm bronșic sever care este inadecvat controlat prin administrarea unor doze mari de corticosteroizi inhalatori plus un alt medicament utilizat ca tratament de întreținere.	finalizat
927	AVAPRITINIBUM	AYVAKYT	Tumoare gastro-intestinală stromală (GIST) nerezecabilă sau metastazată AYVAKYT este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu tumori gastrointestinale stromale (GIST) nerezecabile sau metastazate care prezintă mutația D842V a receptorului alfa al factorului de creștere derivat din trombocite (PDGFRA).	finalizat
928	AVAPRITINIBUM	AYVAKYT	Masocitoză sistemică avansată (AdvSM) AYVAKYT este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu mastocitoză sistemică agresivă (ASM), mastocitoză sistemică cu neoplasm hematologic asociat (SM-AHN) sau leucemie cu celule mastocitare (MCL), după cel puțin o terapie sistemică.	finalizat
929	COBIMETINIBUM	Cotellic	în asociere cu vemurafenib pentru tratamentul pacienților adulți cu melanom inoperabil sau metastazat cu mutație BRAF V600	finalizat
930	Atezolizumab	Tecentriq	Adăugare concentrație pentru Tecentriq în asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul TNBC nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, ale căror tumori prezintă o expresie a PD-L1 $\geq 1\%$ și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică.	finalizat
931	Luspatercept	Reblozyl	tratamentul anemiei asociată cu beta-talasemie non-dependentă de transfuzii	finalizat
932	EMPAGLIFLOZINUM	JARDIANCE	Jardiance este indicat pentru tratamentul adulților cu boală renală cronică	finalizat
933	DUPILUMABUM	Dupixent	Dupixent este indicat ca terapie adăugată împreună cu corticosteroizi administrați intranasal pentru tratamentul adulților cu RSCcPN severă, în cazul cărora terapia cu corticosteroizi sistemici și/sau intervenția chirurgicală nu asigură controlul adecvat al bolii.	finalizat
934	BROLUCIZUMABUM	BEOVU	Beovu este indicat la adulți pentru tratamentul afectării acuității vizuale, cauzată de edemul macular diabetic (EMD)	finalizat
935	DURVALUMABUM	IMFINZI	IMFINZI administrat concomitent cu gemcitabină și cisplatină este indicat în tratamentul de primă linie pentru pacienți adulți cu carcinom de tract biliar (biliary tract cancer, BTC) nerezecabil sau în stadiu metastazat.	finalizat
936	NIVOLUMABUM	OPDIVO	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul carcinomului scuamos esofagian avansat, nerezecabil, recurent sau metastazat, după chimioterapie anterioară pe bază de fluoropirimidine în asociere cu săruri de platină, la adulți.	finalizat
937	NIVOLUMABUM	OPDIVO	OPDIVO în asociere cu ipilimumab este indicat pentru tratamentul de primă linie al carcinomului scuamos esofagian avansat, nerezecabil, recurent sau metastazat, cu expresie PD-L1 $\geq 1\%$ la nivelul celulelor tumorale, la adulți	finalizat

938	NIVOLUMABUM	OPDIVO	OPDIVO în asociere cu chimioterapie combinată pe bază de fluoropirimidine și săruri de platină este indicat pentru tratamentul de primă linie al carcinomului scuamos esofagian avansat, nerezecabil, recurent sau metastazat, cu expresie PD-L1 $\geq 1\%$ la nivelul celulelor tumorale, la adulți.	finalizat
939	TENOFOVIRUM ALAFENAMIDA	VEMLIDY	Vemlidy este indicat pentru tratamentul hepatitei cronice B (HCB) la adulți și copii și adolescenți cu vârsta de cel puțin 6 ani și peste, cu greutatea corporală de cel puțin 25 kg	finalizat
940	GLICOPIRONIUM BROMIDUM	SIALANAR	Tratamentul simptomatic al sialoreei severe (salivare excesivă patologică cronică) la copii și adolescenți cu vârsta peste 3 ani cu tulburări neurologice cronice	finalizat
941	FINERENONA	KERENDIA	Kerendia este indicat pentru tratamentul bolii renale cronice (cu albuminurie) asociate cu diabetul zaharat de tip 2 la adulți.	finalizat
942	FINERENONA	KERENDIA	Kerendia este indicat pentru tratamentul bolii renale cronice (cu albuminurie) asociate cu diabetul zaharat de tip 2 la adulți.	finalizat
943	ATEZOLIZUMAB	Tecentriq	Adăugare concentrație: Tecentriq în asociere cu nab-paclitaxel este indicat pentru tratamentul TNBC nerezecabil, local avansat sau metastazat, la pacienți adulți, ale căror tumori prezintă o expresie a PD-L1 $\geq 1\%$ și care nu au primit tratament anterior cu chimioterapie pentru boala metastatică.	finalizat
944	ACALABRUTINIB	CALQUENCE	Calquence în monoterapie sau în asociere cu obinutuzumab este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) netratată anterior. Calquence în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.	finalizat
945	FILGOTINIBUM	JYSELECA	Jyseleca este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu colită ulcerativă activă moderată până la severă, care au prezentat un răspuns inadecvat, au pierdut răspunsul sau nu au tolerat terapia convențională, respectiv un agent biologic	finalizat
946	Glofitamabum	COLUMVI	Columvi în monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz cu celule B mari (diffuse large B-cell lymphoma, DLBCL) recidivat sau refractar după două sau mai multe linii de terapie sistemică.	finalizat
947	Isatuximabum	Sarclisa	SARCLISA este indicat: - în asociere cu pomalidomidă și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, care au beneficiat de minim două tratamente anterioare, inclusiv lenalidomidă și un inhibitor de proteazom și care au demonstrat progresia bolii sub ultimul tratament administrat.	finalizat
948	Caplacizumabum	CABLIVI	Cablivi este indicat pentru tratamentul adulților și adolescenților cu vârsta de 12 ani și peste și greutatea corporală de minim 40 kg, care manifestă un episod de purpură trombocitopenică trombocită dobândită (PTTD), în asociere cu plasmafereză și tratament imunosupresor.	finalizat
949	ZANUBRUTINIBUM	BRUKINSA	ca monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu macroglobulinemie Waldenström (MW) cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară sau în tratamentul de primă linie pentru pacienții care nu sunt eligibili pentru chimio-imunoterapie	finalizat
950	TECLISTAMABUM	TECVAYLI	TECVAYLI este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-au administrat cel puțin trei terapii anterioare, inclusiv un agent imunomodulator, un inhibitor de proteazom și un anticorp anti-CD38 și care au înregistrat progresia bolii sub ultima schemă terapeutică	finalizat
951	LUMACAFORUM+IVACAFTORUM	ORKAMBI	Orkambi granule este indicat pentru tratamentul fibrozei chistice (FC) la pacienții cu vârsta de 1 an și peste, cu genotip homozigot pentru mutația F508del la nivelul genei numită „regulator de conductanță transmembranară al fibrozei chistice” (CFTR)	finalizat
952	DABIGATRANUM ETEXILATUM	DABIGATRAN ETEXILATE ACCORD	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale (AVC) și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială non-valvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de AVC sau atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârsta ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă (clasa NYHA $\geq$ II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	finalizat
953	LENVATINIBUM	LENVIMA	LENVIMA administrat sub formă de monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom tiroidian diferențiat (CTD) (papilar/folicular/cu celule Hürthle) progresiv, local avansat sau metastatic, refractar la tratamentul cu iod radioactiv (IRA)	finalizat
954	LENVATINIBUM	LENVIMA	LENVIMA în asociere cu pembrolizumab este indicat în tratamentul pacienților adulți cu carcinom endometrial (CE) avansat sau recidivant care manifestă progresia bolii în timpul sau după un tratament anterior cu o terapie pe bază de platină, în orice context, și care nu sunt eligibili pentru intervenții chirurgicale curative sau radioterapie.	finalizat
955	APOMORFINUM	APO-GO	Tratamentul fluctuațiilor motorii (fenomenul „on-off”) la pacienții cu boală Parkinson insuficient controlată prin administrarea altor medicamente antiparkinsoniene.	finalizat
956	RISDIPLAMIUM	EVRYSDI	Evrysdi este indicat pentru tratamentul amiotrofiei spinale (atrofie musculară spinală, AMS) Sq la pacienți cu un diagnostic clinic de AMS tip 1, tip 2 sau tip 3 sau cu una până la patru copii ale genei SMN2	finalizat

957	BICTEGRAVIRUM+EMTRICITABINUM+TENOF OVIRUM	BIKTARVY	Biktarvy este indicat pentru tratarea infecției cu virusul imunodeficienței umane de tip 1 (HIV-1) la pacienți adulți, copii și adolescenți cu vârsta minimă de 2 ani și cu o greutate minimă de 14 kg fără evidențe prezente sau anterioare de rezistență virală la clasa inhibitorilor integrazelor, emtricitabină sau tenofovir	finalizat
958	CANAKINUMABUM	ILARIS	Ilaris este indicat pentru tratamentul bolii Still active, inclusiv boala Still cu debut la vârsta adultă (BSDA) și artritei idiopatice juvenile sistemice (SJIA) la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste, care au avut un răspuns necorespunzător la tratamentul anterior cu medicamente antiinflamatorii nesteroidiene (AINS) și cu corticosteroizi sistemici.	finalizat
959	DABRAFENIBUM	TAFINLAR	Dabrafenib în asociere cu trametinib este indicat în tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cu celule mici, cu mutație BRAF V600	finalizat
960	TRAMETINIBUM	MEKINIST	Trametinib în asociere cu dabrafenib este indicat în tratamentul pacienților adulți cu cancer bronho-pulmonar altul decât cel cu celule mici, cu mutație BRAF V600	finalizat
961	BEROTRALSTATUM	ORLADEYO	Orladeyo este indicat pentru prevenirea de rutină a episoadelor recurente de angioedem ereditar (AEE) la pacienți adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și peste	finalizat
962	PAZOPANIBUM	PAZOPANIB ZENTIVA	Sarcom de țesuturi moi	finalizat
963	SOFOSBUVIRUM+VELPATASVIRUM	EPCLUSA	Adaugare segment populațional în indicația: Eplusa este indicat pentru tratamentul infecției cronice cu virusul hepatitei C (VHC) la pacienți cu vârsta de 3 ani și peste	finalizat
964	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	Tratamentul bărbaților adulți cu cancer de prostată metastatic sensibil la terapia hormonală (mCPSH) în asociere cu terapie de deprivare androgenică.	finalizat
965	ENZALUTAMIDUM	XTANDI	Tratamentul bărbaților adulți cu cancer de prostată non-metastatic rezistent la castrare (CPRC) cu risc crescut	în așteptare
966	CANNABIDIOLUM	EPIDYOLEX	Epidyolex este indicat pentru utilizarea ca tratament adăugat în caz de crize epileptice asociate cu sindromul Lennox-Gastaut (SLG), în asociere cu clobazam, la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste.	finalizat
967	CANNABIDIOLUM	EPIDYOLEX	Epidyolex este indicat pentru utilizarea ca tratament adăugat în caz de crize epileptice asociate cu sindromul Dravet (SD), în asociere cu clobazam, la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste	finalizat
968	APALUTAMIDUM	ERLEADA	Erleada este indicat: în tratamentul cancerului de prostată non-metastatic rezistent la castrare (nmCRPC, nonmetastatic castration-resistant prostate cancer) la bărbați adulți, care prezintă un risc crescut de apariție a bolii metastatice. în tratamentul cancerului de prostată metastatic sensibil la terapia hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer) la bărbați adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy)	finalizat
969	ZANUBRUTINIBUM	BRUKINSA	Brukinsa ca monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu leucemie limfocitară cronică (LLC), care: - nu au fost tratați anterior, nu prezintă mutații și nu sunt eligibili pentru chimioterapie, sau - nu au fost tratați anterior și prezintă deleția 17p sau mutația TP53, sau - au LLC recidivantă sau refractară	finalizat
970	EPCORITAMABUM	TEPKINLY	Tepkinly este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu limfom difuz cu celulă mare B (DLBCL), recidivat sau refractar, după două sau mai multe linii de terapie sistemică.	finalizat
971	ACIDUM CARGLUMICUM	CARBAGLU	Carbaglu este indicat pentru tratamentul: în hiperamoniemie datorată deficitului primar de N-acetilglutamat sintetază; în hiperamoniemie datorată acidemiei izovalerianice; în hiperamoniemie datorată acidemiei metilmalonice; în hiperamoniemie datorată acidemiei propionice.	documentație incompletă
972	SECUKINUMABUM	COSENTYX	Artrită idiopatică juvenilă (AIJ) Artrita asociată entezitei (AAE) Cosentyx, în monoterapie sau în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei asociate entezitei active, la pacienții cu vârsta de 6 ani și peste această vârstă, a căror boală a răspuns inadecvat la terapia convențională sau care nu pot tolera terapia convențională. Artrită psoriazică juvenilă (APsJ) Cosentyx, în monoterapie sau în asociere cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice juvenile active, la pacienții cu vârsta de 6 ani și peste această vârstă, a căror boală a răspuns inadecvat la terapia convențională sau care nu pot tolera terapia convențională	finalizat
973	LENACAPAVIRUM	SUNLENCA	Sunlenca, soluție injectabilă, în combinație cu alt antiretroviral/alte antiretrovirale, este indicat pentru tratarea adulților cu infecție cu HIV-1 multi-rezistentă la medicamente pentru care altfel nu este posibilă construirea unui regim anti-viral supresor	finalizat
974	ACIDUM OBETICHOLICUM	OCALIVA	Ocaliva este indicat pentru tratamentul colangitei biliare primitive (CBP) în combinație cu acidul ursodeoxicolic (UDCA) la adulți cu răspuns inadecvat la UDCA sau ca monoterapie la adulți care nu pot tolera UDCA	în așteptare

975	KEYTRUDA	PEMBROLIZUMABUM	KEYTRUDA este indicat în asociere cu lenvatinib pentru tratamentul carcinomului endometrial avansat sau recurent, la adulți care prezintă progresie a bolii în timpul sau după tratamentul anterior cu o terapie care conține săruri de platină, indiferent de setarea administrării acesteia, și care nu sunt eligibili pentru intervenția chirurgicală curativă sau radiații.	finalizat
976	BRAFTOVI	ENCORAFENIBUM	Encorafenib, este indicat în combinație cu cetuximab, pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer colorectal (CRC) metastazat, cu mutația BRAF V600E, care s-au aflat anterior sub terapie sistemică	documentatie incompleta
977	BRAFTOVI	ENCORAFENIBUM	Encorafenib, în combinație cu binimetinib, pentru tratamentul pacienților adulți cu melanom nerezecabil sau metastazat, cu mutația BRAF V600	documentatie incompleta
978	ICOSAPENT ETHYL	VAZKEPA	Vazkepa este indicat pentru reducerea riscului de evenimente cardiovasculare la pacienți adulți cărora li se administrează statine care prezintă risc cardiovascular ridicat, cu valori crescute ale trigliceridelor (≥ 150 mg/dl [$\geq 1,7$ mmol/l]) și cu: • boală cardiovasculară diagnosticată, sau • diabet zaharat, și cel puțin un alt factor de risc cardiovascular.	documentatie incompleta
979	ERIBULINUM	HALAVEN	HALAVEN este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu liposarcom nerezecabil cărora li s-a administrat anterior terapie pe bază de antracilină (cu excepția cazului în care aceasta este inadecvată) pentru boală avansată sau metastatică	finalizat
980	NIVOLUMABUM	OPDIVO	OPDIVO în monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al carcinomului urotelial cu invazie musculară (CUIM), cu expresie PD-L1 $\geq 1\%$ la nivelul celulelor tumorale, la adulți cu risc crescut de recidivă după efectuarea rezecției radicale a CUIM	finalizat
981	SOMAPACITANUM	SOGROYA	Sogroya este indicat pentru substituția hormonului de creștere (HC) endogen la copii cu vârsta de 3 ani și peste, la adolescenți cu insuficiență de creștere din cauza deficitului de hormon de creștere (copii și adolescenți cu DHC) și la adulți cu deficit de hormon de creștere (adulți cu DHC) substituția hormonului de creștere (HC) endogen la adulți cu deficit de hormon de creștere (adulți cu DHC).	in asteptare
982	Deucravacitinib	SOTYKTU	SOTYKTU este indicat în tratamentul psoriazisului în plăci, forma moderată până la severă, la adulți eligibili pentru terapie sistemică.	in asteptare
983	INHIBITOR DE ESTERAZA C1, UMANA	BERINERT	Berinert pentru injectare subcutanată este indicat pentru prevenirea episoadelor acute de angioedem ereditar (AEE) recurent la adolescenți și adulți cu deficit de inhibitor de esterază C1.	in asteptare
984	DUPILUMABUM	DUPIXENT	Dermatita atopica: Copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 11 ani Dupixent este indicat pentru tratamentul dermatitei atopice severe la copii cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 11 ani, care sunt candidați pentru terapie sistemică. Solicitare de includere 6 luni-11 ani.	in asteptare
985	TALQUETAMABUM	TALVEY	TALVEY este indicat ca monoterapie în tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-au administrat cel puțin 3 terapii anterioare, inclusiv un agent imunomodulator, un inhibitor de proteazom și un anticorp anti-CD38 și care au înregistrat progresia bolii sub ultima schemă terapeutică	in asteptare
986	SPRAVATO	ESKETAMINUM	Solicitare de reevaluare pt: Spravato este indicat în asociere cu un SSRI sau un SNRI la adulții cu tulburare depresivă majoră rezistentă la tratament care nu au răspuns la cel puțin două tratamente diferite cu antidepresive în episodul depresiv curent moderat până la sever	in asteptare
987	TRODELVY	SACITUZUMAB GOVITECAN	Trodelvy administrat în monoterapie este indicat pentru tratarea pacienților adulți cu cancer mamar nerezecabil sau metastazat, receptor hormonal pozitiv (HR-positiv), HER2-negativ, care au utilizat anterior terapie endocrină și cel puțin două terapii sistemice suplimentare pentru boală în stadiu avansat	in asteptare
988	XELJANZ	Tofacitinib	Tofacitinib este indicat în tratamentul pacienților adulți cu spondilită anchilozantă (SA) activă, care au răspuns inadecvat la tratamentul convențional.	in asteptare
989	Xigduo	Dapagliflozinum+Metforminum	Xigduo este indicat la pacienții adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 ca tratament adjuvant la dietă și exerciții fizice: • la pacienții insuficient controlați cu doza maximă tolerată de metformin în monoterapie • în asociere cu alte medicamente, pentru tratamentul diabetului zaharat la pacienții insuficient controlați cu metformin și aceste medicamente • pentru pacienții tratați deja cu asocierea dapagliflozin și metformin sub formă de comprimate separate.	in asteptare
990	KERENDIA	Finerenonă	Kerendia este indicat pentru tratamentul bolii renale cronice (cu albuminurie) asociate cu diabetul zaharat de tip 2 la adulți	in asteptare
991	KERENDIA	Finerenonă	Kerendia este indicat pentru tratamentul bolii renale cronice (cu albuminurie) asociate cu diabetul zaharat de tip 2 la adulți	in asteptare
992	EPIDYOLEX	CANNABIDIOLUM	Epidyolex este indicat pentru utilizare ca tratament adăugat în caz de crize epileptice asociate cu complexul sclerozei tuberoase (CST) la pacienții cu vârsta de 2 ani și peste.	in asteptare

993	Stivarga	Regorafenibum	Stivarga este indicat ca monoterapie pentru tratamentul pacienților adulți cu - tumori stromale gastrointestinale (GIST – GastroIntestinal Stromal Tumour) nerezecabile sau metastazate, care au prezentat progresie a bolii sau care nu au tolerat tratamentul anterior cu imatinib și sunitinib:	in asteptare
994	Cabazitaxel Sandoz	CABAZITAXELUM	Cabazitaxel Sandoz este indicat, în asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer de prostată metastatic rezistent la castrare, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel	in asteptare
995	Jardiance	Empagliflozinum	Jardiance este indicat pentru tratamentul adulților cu boală renală cronică	in asteptare
996	ADYNOVI	RURIOCTOCOG ALFA PEGOL	Tratamentul și profilaxia hemoragiilor la pacienții cu vârsta de 12 ani și peste, cu hemofilia A (deficit congenital de factor VIII).	in asteptare
997	SARCLISA	isatuximabum	SARCLISA este indicat: - în asociere cu pomalidomidă și dexametazonă, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, care au beneficiat de minim două tratamente anterioare, inclusiv lenalidomidă și un inhibitor de proteazom și care au demonstrat progresia bolii sub ultimul tratament administrat.	in asteptare
998	VYVGART	Efgartigimod alfa	VYVGART este indicat ca terapie adăugată la terapia standard la pacienții adulți cu Miastenia gravis generalizată (gMG) cu anticorpi anti-receptor acetilcolină (AChR)	in asteptare
999	Nexviadyme	Avalglucosidasum alpha	Nexviadyme (alfa avalglucozidază) este indicat pentru tratamentul de substituție enzimatică pe termen lung la pacienți cu boală Pompe (deficit de α -glucozidază acidă).	in asteptare
1000	Xanirva	Rivaroxabanum	Prevenirea accidentului vascular cerebral și a emboliei sistemice la pacienții adulți cu fibrilație atrială non-valvulară cu unul sau mai mulți factori de risc, cum sunt insuficiența cardiacă congestivă, hipertensiunea arterială, vârsta ≥ 75 ani, diabetul zaharat, accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu în antecedente.	in asteptare
1001	Stelara	Ustekinumabum	Colita ulcerativă STELARA este indicat în tratamentul pacienților adulți cu forme moderate până la severe de colită ulcerativă activă, care au avut un răspuns inadecvat, au încetat să mai răspundă la tratament sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la tratamentele biologice, fie au contraindicații medicale la aceste terapii	in asteptare
1002	Stelara	Ustekinumabum	STELARA este indicat în tratamentul pacienților adulți cu boală Crohn activă, moderată până la severă, care au avut un răspuns necorespunzător, au încetat să mai răspundă sau au dezvoltat intoleranță fie la tratamentele convenționale, fie la antagoniști TNF α , sau aceste tratamente le sunt contraindicate din punct de vedere medical.	in asteptare
1003	QINLOCK 50 mg comprimate	RIPRETINIBUM	QINLOCK este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu tumori stromale gastrointestinale (GIST) în stadiu avansat, care au făcut tratament anterior cu trei sau mai mulți inhibitori de kinaze, inclusiv cu imatinib.	in asteptare
1004	HYQVIA	IMUNOGLOBULINA UMANA NORMALA	Terapie imunomodulatoare la adulți, copii și adolescenți (0 până la 18 ani) în: polineuropatie demielinizantă inflamatorie cronică (PDIC) ca terapie de întreținere după stabilizarea cu Ig i.v.	in asteptare