

Nr. crt	DCI	DC	DAPP	Reprezentant DAPP în Romania	Indicație	Nr. Registrură ANMDMR	Nr. și data depunerii contestației	Specialitatea	Programare	Ora convocării
1.	Empagliflozinum	Jardiance	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG Viena Sucursala Bucuresti	indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat de tip 2 insuficient controlat, ca adjuvant la regimul alimentar și exercițiul fizic în plus față de alte medicamente pentru tratamentul diabetului zaharat	10793/20.12.2018	8615/16.12.2019	Diabet si boli de nutritie	11.05.2020	10:00
2.	Combinatii (Netupitantum+Palonosetronum)	Akynzeo	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd Ireland	Angelini Pharmaceutical s Romania SRL	prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen accentuat ce conține cisplatină	8470/29.10.2018	8470C/18/12/2020	Oncologie	11.05.2020	11:00
3.	Combinatii (Netupitantum+Palonosetronum)	Akynzeo	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd Ireland	Angelini Pharmaceutical s Romania SRL	prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen moderat.	8470/29.10.2018	8470C/18/12/2020	Oncologie	11.05.2020	12:00
4.	Emicizumabum	Hemlibra	Roche Registration GMBH.-Germania	Roche Romania SRL	indicat ca tratament profilactic de rutină pentru prevenirea sângerarilor sau reducerea frecvenței episoadelor de sangerare la pacienții cu hemofilie A care prezintă inhibitor de factor VIII. Hemlibra poate fi utilizat la toate grupele de varsta	29212/04.10.2018	29212C/04.11.2019	Hematologie	11.05.2020	13:30
5.	Cladribinum	Mavenclad	Merck Europe B.V.	Merck Romania SRL	Indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu scleroză multiplă (SM) recurentă foarte activă, definită prin caracteristici clinice sau imagistice	29830/08.11.2018	29830C/11.03.2020	Neurologie	11.05.2020	14:30

6.	Propranololum	Hemangioli	Pierre Fabre Dermatologie	Magnapharm Marketing & Sales Romania SRL	indicat în tratamentul hemangiomului infantil proliferativ pentru care este necesară terapie sistemică: • hemangiom care prezintă risc vital sau funcțional, • hemangiom ulcerat dureros și/sau care nu răspunde la măsuri simple de îngrijire a leziunilor, • hemangiom cu risc de cicatrici permanente sau desfigurare. Tratamentul trebuie să fie inițiat la sugari cu vârsta cuprinsă între 5 săptămâni și 5 luni	548/17.01.2019	548C/28.04.2020	Dermatologie	11.05.2020	15:30
7.	Dabigatranum Etexilatum	Pradaxa	Boehringer Ingelheim International GmbH	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & CO KG Viena Sucursala Bucuresti	Prevenția accidentelor vasculare cerebrale și a emboliei sistemice la pacienți adulți cu fibrilație atrială nonvalvulară (FANV) ce prezintă unul sau mai mulți dintre următorii factori de risc cum sunt: antecedent de accident vascular cerebral sau atac ischemic tranzitoriu (AIT), vârsta ≥ 75 ani, insuficiență cardiacă, (NYHA II), diabet zaharat, hipertensiune arterială.	7980/18.10.2018	7980C/27.11.2019	Cardiologie	12.05.2020	10:00
8.	Apremilastum	Otezla	Celgene Europe BV	GENESIS BIOPHARMA ROMANIA S.R.L.	indicat pentru tratamentul psoriazisului în plăci cronic, moderat până la sever, la pacienții adulți care nu au răspuns sau cărora le este contraindicată ori prezintă intoleranță la altă terapie sistemică, inclusiv ciclosporină, metotrexat sau psoralen și raze ultraviolete A (PUVA).	3608/10.05.2018	3608C/08.11.2019	Dermatologie	12.05.2020	11:00

9.	Apremilastum	Otezla	Celgene Europe BV	GENESIS BIOPHARMA ROMANIA S.R.L.	administrat ca monoterapie sau în asociere cu Medicamente Antireumatice Modificatoare ale Bolii (MARMB), este indicat pentru tratamentul artritei psoriazice active (APs) la pacienții adulți care au obținut un răspuns inadecvat sau au prezentat intoleranță la o terapie anterioară cu MARMB	3609/10.05.2018	3609C/08.11.2019	Reumatologie	12.05.2020	12:00
10.	Everolimus	Afinitor	Novartis Europharm Ltd Marea Britanie	NOVARTIS PHARMA SERVICES ROMANIA SRL	indicat pentru tratamentul tumorilor neuroendocrine, nefuncționale, neresectabile sau metastatice, bine diferențiate (de gradul 1 sau gradul 2), de origine gastro-intestinală sau pulmonară, la adulți cu boală progresivă	801/08.02.2018	801C/23.09.2019	Oncologie	12.05.2020	13:00
11.	Golimumab	Simponi	Janssen Biologics B.V. Olanda	MERCK SHARP & DOHME ROMANIA SRL	recomandat în tratamentul colitei ulcerative active, aflată în stadii moderate până la severe, la pacienții adulți care au prezentat un răspuns inadecvat la terapia convențională incluzând corticosteroizi și 6-mercaptopurină (6-MP) sau azatioprină (AZA), ori care prezintă intoleranță sau contraindicații pentru astfel de tratament.	751/24.10.2018	29567C/20.12.2019	Gastroenterologie	12.05.2020	14:30