



Baqsimi 3 mg pulbere nazală
în flacon cu doză unică (glucagon)

PROSPECT DE ADMINISTRARE
FIȚI PREGĂTIT ÎN CAZUL UNEI CRIZE
DE HIPOGLICEMIE

Dacă urmați tratament cu insulină, trebuie să fiți pregătit în cazul scăderii grave a glucozei (zahărului) din sânge (hipoglicemie severă).

Citiți informațiile din acest Prospect de administrare pentru a afla mai multe informații privind urgența reprezentată de scăderea nivelului de glucoză din sânge și utilizarea medicamentului BAQSIMI®

INDICAȚIE TERAPEUTICĂ
BAQSIMI® este indicat pentru tratamentul hipoglicemiei severe la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 4 ani și peste, cu diabet zaharat.

Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu BAQSIMI®.

Versiune aprobată de ANMDMR septembrie 2025

ÎN CAZUL UNEI CRIZE DE HIPOGLICEMIE, CĂUTAȚI UN TUB MIC ȘI GALBEN

AM DIABET ZAHARAT.
ÎN CAZUL UNEI CRIZE DE HIPOGLICEMIE, SUNT INCAPABIL SĂ MĂ TRATEZ.

Căutați un tub mic și galben în/pe

Nu desigilați tubul decât în momentul utilizării.

Urmați instrucțiunile de utilizare și apoi solicitați asistență medicală de urgență.

ADMINISTRAREA BAQSIMI

(CONTINUARE)

După administrarea dozei:

Dacă pacientul este inconștient, întoarceți-l pe o parte după ce i-ați administrat BAQSIMI.

Solicitați imediat asistență medicală.

Încurajați pacientul să mănânce sau să bea ceva cu mult zahar, precum dulciuri sau suc de fructe, imediat ce este posibil.

Aruncați flaconul utilizat și tubul.

Nu desigilați tubul decât în momentul utilizării.



Pentru a viziona videoclipul cu instrucțiuni privind utilizarea medicamentului **BAQSIMI**, accesați www.baqsimi.eu

Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu BAQSIMI.

CÂND SE UTILIZEAZĂ BAQSIMI

- BAQSIMI se utilizează în cazuri de hipoglicemie severă, în situație de urgență, atunci când pacientul nu este capabil să mănânce sau să bea și are nevoie de ajutorul altei persoane
- Este important ca persoanele din jur să recunoască posibilele semne de criza hipoglicemică pentru a fi pregătite să intervină dacă este nevoie de ajutorul lor

Semnele posibile ale unei crize de hipoglicemie includ:

- Amețeală
- Neatenție sau confuzie
- Convulsii sau pierderea cunoștinței
- Modificări de dispoziție
- Lipsa de coordonare
- Tremurături sau transpirații



Nu desigilați tubul decât în momentul utilizării.



baqsimi[®]
(glucagon) pulbere nazală

Ce este **BAQSIMI**

- **BAQSIMI** este o formă de glucagon care se administrează prin pulverizare în nas. Glucagonul este un hormon natural produs de pancreas. Acesta acționează în manieră opusă insulinei, crescând nivelul de zahăr din sânge
- **BAQSIMI** este gata de utilizare, nefiind necesară amestecarea sau măsurarea acestuia. Medicamentul este furnizat într-o doză premăsurată cu precizie
- **BAQSIMI** nu necesită inhalare. **Acesta trebuie administrat în cazul unei crize de hipoglicemie chiar dacă sunteți inconștient, aveți nasul congestionat sau ați luat decongestionante**
- **BAQSIMI** nu trebuie păstrat la frigider. Trebuie menținut la temperaturi de sub 30°C (86°F)



Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu **BAQSIMI**.

AJUTAȚI ALTE PERSOANE SĂ AFLE CĂ AVEȚI BAQSIMI LA DUMNEAVOASTRĂ


Medalionul și cardul BAQSIMI oferă informații ajutătoare persoanelor care vă asistă în tratarea unei crize de hipoglicemie.

Selecțați varianta pe care o preferați și păstrați-o astfel încât să fie găsită cu ușurință. Nu uitați să specificați pe rândul liber unde țineți BAQSIMI.

ÎN CAZUL UNEI CRIZE DE HIPOGLICEMIE, CĂUTAȚI UN TUB MIC ȘI GALBEN

AM DIABET ZAHARAT. ÎN CAZUL UNEI CRIZE DE HIPOGLICEMIE, SUNT INCAPABIL SĂ MĂ TRATEZ.

Căutați un tub mic și galben în/pe



Nu desigilați tubul decât în momentul utilizării. Urmăți instrucțiunile de utilizare și apoi solicitați asistență medicală de urgență.



Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în prospect.

De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București

Fax: +4 0213 163 497

tel: +4 021 317 11 02

e-mail: adr@anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

Amphastar France Pharmaceuticals

Usine Saint Charles 60590 Eragny sur Epte

Franța

email: gps@amphastar.com

tel: +40 377 880 124

Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu BAQSIMI.


8

SOLICITAȚI ASISTENȚĂ MEDICALĂ

01-512-01-RO © 2024 Amphastar
Toate drepturile rezervate.

AM DIABET ZAHARAT. ÎN CAZUL UNEI CRIZE DE HIPOGLICEMIE, SUNT INCAPABIL SĂ MĂ TRATEZ.

Căutați un tub mic și galben în/pe



Nu desigilați tubul decât în momentul utilizării. Urmăți instrucțiunile de utilizare și apoi solicitați asistență medicală de urgență.

01-512-01-RO © 2024 Amphastar
Toate drepturile rezervate

BAQSIMI este marcă comercială deținută sau sub licență Amphastar and Company și a filialelor sau societăților afiliate.
01-512-01-RO © 2024 Amphastar
Toate drepturile sunt rezervate.



Nu desigilați tubul decât în momentul utilizării.



(glucagon) pulbere nazală



Amphastar France Pharmaceuticals

CUM SE UTILIZEAZĂ BAQSIMI

Citiți Instrucțiunile de utilizare pentru Baqsimi înainte de a-l utiliza

- Arătați familiei și prietenilor unde păstrați Baqsimi și explicați-le cum să îl folosească. **Aceștia trebuie să știe cum să îl folosească înainte să aveți nevoie de el**

Nu îndepărtați folia protectoare sau deschideți tubul decât înainte de administrare. Dacă tubul a fost deschis, este posibil ca medicamentul să fi fost afectat de umezeală și să nu acționeze corespunzător

- **Nu apăsați** pistonul decât atunci când sunteți pregătit să administrați doza. În caz contrar, se va pierde doza unică din dispozitiv

- BAQSIMI nu trebuie utilizat după data expirării

Pregătirea pentru administrarea dozei:

- Îndepărtați folia protectoare trăgând de banda roșie
- Deschideți capacul și scoateți flaconul cu doza unică din tub



Consultați Instrucțiunile de utilizare furnizate împreună cu BAQSIMI.

4

ADMINISTRAREA BAQSIMI

Administrarea dozei:



- **ȚINEȚI** flaconul cu doză unică ca în imagine. **Nu apăsați** pistonul înainte de introducerea în nară

- **INTRODUCEȚI** vârful flaconului într-una din nări

- **APĂSAȚI** pistonul complet **până când linia verde nu mai este vizibilă.**


baqsimi®

(glucagon) pulbere nazală

5