Cerezyme 400 unități pulbere pentru concentrat pentru soluţie perfuzabilă (imiglucerază)

Administrarea medicamentului Cerezyme la domiciliu

Manual pentru pacienţii cu boala Gaucher care îşi administrează perfuzia de Cerezyme la domiciliu

Împreună cu medicul dumneavoastră curant, ați decissă începeți administrarea perfuziei cu medicamentul Cerezyme la domiciliu.
Obiectivul acestui ghid este de a vă oferi îndrumări privind modul de administrare a medicamentului Cerezyme la domiciliu.
Acest ghid conține instrucțiuni pas cu pas pentru a vă ajuta să pregătiți și să administrați corect tratamentul.Urmați întotdeauna cu strictețe aceste instrucțiuni și contactați medicul sau asistenta medicală care vă îngrijește la domiciliu dacă aveți întrebări.
Pentru instrucțiuni detaliate despre cum se prepară și se administrează perfuzia cu Cerezyme, vă rugăm sa consultați Ghidul pacientului pentru reconstituirea soluției cu Cerezyme.

Citiţi cu atenţie şi în întregime aceste informaţii înainte de a începe administrarea perfuziilor la domiciliu.

- Păstraţi aceste informaţii la îndemână; s-ar putea să fie necesar să le recitiţi.
- Dacă aveţi întrebări suplimentare, adresaţi-vă medicului dumneavoastră curant.
- Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră. Nu trebuie să-l daţi altor persoane. Le poate face rău, chiar dacă au simptome asemănătoare cu ale dumneavoastră.
- Pentru informaţii detaliate legate de efectele adverse vă rugăm să citiţi Prospectul medicamentului.
- Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte trebuie să spuneţi medicului curant sau asistentei medicale care vă îngrijeşte la domiciliu.

Apel la raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare către:
Agenția Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478- RO
Fax: +4 0213 163 497
Tel: +4031 423 2419
E-mail: adr@anm.ro
www.anm.ro

Reacţiile se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
Sanofi Romania SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 2C, etaj 9
Sector 2, București
România
Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Fax: +40 (0) 21 317 31 34
e-mail:pv.ro@sanofi.com

Acest material îndeplinește condițiile autorizației de punere pe piață și a fost aprobat de ANMDMR

CUPRINS

BOALA DUMNEAVOASTRĂ ŞI PERFUZIA LA DOMICILIU .....
CERINŢE ŞI ORGANIZAREA PERFUZIEI LA DOMICILIU .....
ANEXE .....
1.1 Ghidul pacientului pentru reconstituirea soluţiei 8
1.2 Jurnal de tratament 8

Boala Gaucher şi perfuzia la domiciliu

Decizia de a vă administra tratamentul la domiciliu trebuie luată de către dumneavoastră împreună cu medicul curant, după mai multe luni în care aţi efectuat tratamentul în spital, pentru a verifica dacă toleranţi bine perfuziile.

Administrarea perfuziei de Cerezyme la domiciliu vă va permite:

- Să vă administraţi tratamentul în confortului propriului domiciliu.
-
- Să aveţi o flexibilitate mai mare în privinţa momentului de administrare a tratamentului.
- Să economisiţi timpul alocat deplasărilor la şi de la spital şi timpul în care sunteţi spitalizat.
- Să respectaţi un program normal de şcolarizare.
- Să organizaţi mai uşor activităţile sociale şi profesionale.
- Să vă planificaţi mai uşor tratamentul lângă familie şi prieteni.
    - La început, o asistentă medicală care acordă îngrijire la domiciliu, instruită în mod adecvat, vă va instrui şi asista pe dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte, pentru a se asigura

Informații importante privind siguranța

În timpul perfuziei

- Perfuzia trebuie întreruptă imediat dacă vă simtiţi rău sau manifestaţi reacţii adverse,
- Adresaţi-vă imediat medicului curant sau asistentei medicale care vă îngrijeşte la domiciliu.
- Orice reacţie adversă trebuie înregistrată în Jurnalul de tratament.
- În cazul în care apar reacţii adverse grave care necesită atenţie/intervenţie imediată, apelaţi numărul naţional de urgenţă, specific ţării, scris în Jurnalul de tratament.

După perfuzie

- Adresaţi-vă imediat medicului curant sau asistentei medicale care vă îngrijeşte la domiciliu dacă manifestaţi reacţii adverse după administrarea perfuziei.
- Va fi necesar ca următoarele perfuzii să fie administrate la spital sau într-o clinică.

Greşeli de preparare/administrare

- În cazul în care constataţi că a fost făcută o greşeală în timpul preparării şi/sau administrării medicamentului, vă rugăm să contactaţi asistenta medicală care vă îngrijeşte la domiciliu sau medicul curant.

De reținut!

- Opriți imediat tratamentul dacă vă simțiți rău

administrarea optimă a tratamentului la domiciliu Cu toate acestea, dacă preferaţi asistenţă completă pentru efectuarea perfuziei la domiciliu, asistenta medicală va efectua întreaga procedură.

- Sunați imediat asistenta medicală sau medicul dacă manifestați reacții adverse
- Respectaţi cu stricteţe planul de tratament aşa cum este descris în Jurnalul de tratament
- Nu modificaţi doza sau viteza de perfuzie fără a vă consulta înainte cu medicul curant: doza şi viteza de perfuzie la domiciliu sunt stabilite de către medicul curant şi scrise în Jurnalul de tratament şi nu vor fi schimbate fără acordul prealabil al medicului curant şi al asistentei medicale care vă îngrijeşte la domiciliu.

.

Cerinţe şi organizarea perfuziei la domiciliu

Pacientul

Acordul şi înţelegerea pacientului

- Dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte trebuie să fiţi de acord cu administrarea tratamentului la domiciliu.
- Medicul curant este responsabil pentru recomandarea de a vă administra perfuziile de Cerezyme la domiciliu.
- Dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte aveţi cunoştinţe despre boala Gaucher, sunteţi capabili să recunoaşteţi reacţiile adverse şi înţelegeţi procedurile care trebuie respectate în cazul apariţiei acestora.

Locuinţa trebuie să fie un mediu curat care dispune de:

- Utilităţi: energie electrică, apă, acces la telefon
- Spaţiu curat pentru administrarea tratamentului
- Frigider pentru păstrarea Cerezyme

Tratamentul şi tot echipamentul necesar vor fi furnizate în funcţie de dispoziţiile şi reglementările locale.

Pregătirea

- Trebuie să fiţi capabil din punct de vedere fizic şi mintal să efectuaţi perfuziile la domiciliu.
- Trebuie să aveţi vene accesibile, care permit introducerea unui ac de perfuzie.
- Dacă aveţi un dispozitiv de acces venos central, trebuie să puteţi introduce acul de perfuzie în membrană.

Instruirea

Înainte de a începe tratamentul la domiciliu, dumneavoastră și/sau persoana care vă îngrijește trebuie să primiți informații complete de la medicul dumneavoastră despre:

- procedurile de reconstituire şi de administrare în perfuzie a Cerezyme.
- riscurile asociate şi posibilele complicaţii
- prevederile asistenţei medicale la domiciliu
- recunoaşterea reacţiilor adverse şi acţiunile care trebuie întreprinse în cazul apariţiei acestora

În timpul tratamentului:

- Este de preferat ca persoana care îngrijeşte pacientul/o altă persoană să fie prezentă în timpul administrării perfuziei la domiciliu.
- Contactaţi întotdeauna medicul curant sau asistenta medicală dacă aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la tratamentul la domiciliu.

Responsabilităţile asistentei medicale care vă îngrijeşte la domiciliu	**Responsabilităţile medicului curant**
• **Competențe profesionale :** Este **calificată pentru a administra perfuzii intravenoase (i.v.).** • **A fost instruită** pentru administrarea medicamentului Cerezyme şi **cunoaşte posibilele reacţii adverse** • Gestionează acţiunile care trebuie întreprinse în cazul apariţiei reacţiilor adverse • **Colaborare** Va stabili împreună cu pacientul şi/sau persoana care îl îngrijeşte nivelul de asistenţă necesar. • Va avea rolul de a coordona organizarea tratamentului la domiciliu, împreună cu medicul curant şi dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte. • **Siguranța tratamentului** Va respecta **cu stricteţe doza şi viteza de administrare** a Cerezyme prescrise, aşa cum sunt precizate în Jurnalul de tratament. • Va **înregistra fiecare administrare** de Cerezyme în Jurnalul de tratament • Vă va monitoriza în timpul tratamentului • În cazul apariţiei unei **reacţii adverse** în timpul administrării sau la scurt timp după administrarea perfuziei (de exemplu, o reacţie asociată perfuziei**) va întrerupe perfuzia şi va apela medicul curant şi/sau numărul de urgenţă naţional,** specific ţării, scris în Jurnalul de tratament. **Asistenta medicală este instruită să gestioneze orice situație care poate apărea în timpul tratamentului.**	• **Organizarea tratamentului la domiciliu Medicul curant este responsabil** pentru iniţierea tuturor acţiunilor administrative necesare **tratamentului la domiciliu** • Acest lucru va permite altor persoane implicate (farmacist, asistentă medicală, pacient, persoană care îngrijeşte pacientul) efectuarea procedurii. • **Organizarea tratamentului la domiciliu Medicul curant este responsabil** pentru **stabilirea dozei** şi **vitezei perfuziei**, pe care trebuie să le detalieze în Jurnalul de tratament. • **Modificarea tratamentului :** Orice **modificări vor fi comunicate, în mod clar**, pacientului şi vor fi descrise în Jurnalul de tratament. **Medicul curant rămâne responsabil pentru planul de tratament la domiciliu.**

Vă rugăm să citiţi cea mai recentă versiune a Prospectului pentru medicamentul Cerezyme pentru lista detaliată a reacţiilor adverse.

Jurnalul de tratament

Ce este?

• un mijloc de comunicare între toate persoanele implicate în administrarea Cerezyme la domiciliu

• trebuie păstrat la domiciliu şi actualizat de câte ori este nevoie

Ce conţine?

tratamentul prescris: doza şi viteza perfuziei, precum şi orice modificări.

fiecare administrare

evaluarea iniţială a asistentei medicale

orice constatări din timpul fiecărei vizite

orice reacţii adverse şi acţiunile întreprinse

Cine actualizează informaţiile?

medicul curant: înregistrează tratamentul şi orice modificări

asistenta medicală: înregistrează evaluările şi administrările

dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte: puteţi, de asemenea, înregistra tratamentul şi orice observaţii

De reţinut

trebuie să respectaţi cu stricteţe doza şi viteza perfuziei cu Cerezyme prescrise, aşa cum sunt scrise în Jurnalul de tratament

trebuie să luaţi Jurnalul de tratament la spital, la fiecare vizită medicală, şi să-l aduceţi acasă ulterior.

trebuie să înregistraţi orice reacţie adversă apărută şi cum a fost gestionată

Jurnalul de tratament este o parte esenţială a tratamentului dumneavoastră – ţineţi-l actualizat şi aduceţi-l la toate vizitele medicale

Instruire pentru administrarea Cerezyme

La început

instrucţiunile iniţiale vă vor fi prezentate în spital.

nivelul de asistenţă de care aveţi nevoie de la asistenta medicală va fi discutat şi convenit de către dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte împreună cu medicul curant.

Construirea încrederii: la fiecare vizită puteţi opta pentru:

1. asistenţă completă pentru administrarea perfuziei la domiciliu:

asistenta medicală va efectua în întregime procedura pentru dumneavoastră.

vă puteţi relaxa pe tot parcursul administrăarii

SAU

2. puteţi învaţa să efectuaţi procedura singur sau cu ajutorul persoanei care vă îngrijeşte:

în acest caz, veţi fi instruiţi de către asistenta medicală în timp ce vă prepară perfuzia. Asistenta medicală vă va explica şi va efectua demonstrativ procedura completă de administrare a perfuziei pentru dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte.

- asistenta medicală va fi prezentă pentru a vă ajuta, dacă este necesar
- dumneavoastră şi/sau persoana care vă îngrijeşte veţi trece treptat la efectuarea din ce în ce a mai multor etape din procesul de administrare a perfuziei, sub supravegherea asistentei medicale,
- până când vă veţi simţi capabil să efectuaţi în întregime procedura de administrare a perfuziei.

Instrucţiuni de urmat:

- respectaţi procedura aşa cum este descrisă în prospect
- prospectul conţine informaţii detaliate despre pregătirea şi administrarea soluţiei de Cerezyme
- indicaţiile privind reconstituirea şi administrarea soluţiei de Cerezyme sunt descrise în prospect şi trebuie urmate cu stricteţe

Asistenta medicală vă sprijini până când vă veţi simţi capabil să efectuaţi în întregime procedura de administrare a perfuziei.

Apel la raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare către:
Agenția Națională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
București 011478- RO
Fax: +4 0213 163 497
Tel: +4031 423 2419
E-mail: adr@anm.ro
www.anm.ro

Reacţiile se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:
Sanofi Romania SRL
Str. Gara Herăstrău, nr. 2C, etaj 9
Sector 2, București
România
Tel: +40 (0) 21 317 31 36
Fax: +40 (0) 21 317 31 34
e-mail: pv.ro@sanofi.com

Anexe

1.1 Ghidul pacientului pentru reconstituirea Cerezyme

1.2 Jurnal de tratament

Ghidul pacientului pentru reconstituirea Cerezyme
- Tratament pentru boala Gaucher –

Tratamentul la domiciliu

Locuinţa trebuie să fie propice pentru administrarea tratamentului în perfuzie la domiciliu, inclusiv să fie un mediu curat, care dispune de:

- energie electrică,
- apă,
- acces la telefon,
- frigider
- spaţiu fizic care permite păstrarea Cerezyme şi a altor materiale pentru perfuzie.

Este de preferat ca persoana care îngrijeşte pacientul/o altă persoană să fie prezentă în timpul administrării perfuziei la domiciliu.

Persoana care îngrijeşte pacientul/o altă persoană au fost instruiţi, în mod corespunzător, cu privire la procedurile de reconstituire şi administrare în perfuzie a Cerezyme.

Poate fi utilizat un sistem de perfuzie portabil, cum este un infuzomat portabil (sistem de perfuzie cu presiune pozitivă).

Dacă prezentaţi efecte adverse în timpul perfuziei trebuie să opriţi imediat perfuzia şi să contactaţi medicul sau asistenta medicală care vă îngrijeşte la domiciliu.

Pregătire

1. Flacoanele trebuie păstrate la frigider, la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C.

2. Pregătiţi echipamentul:

Medicație	Numărul necesar de flacoane de Cerezyme este determinat în funcţie de greutatea pacientului. Fiecare flacon conţine imiglucerază 400 unităţi Soateţi flacoanele din frigider cu aproximativ 30 minute înainte de preparare pentru a ajunge la temperatura camerei. Verificaţi data de expirare înscrisă în partea de jos a cutiei flaconului (nu utilizaţi Cerezyme după data de expirare).
Soluții	Apă pentru preparate injectabile Soluţie de clorură de sodiu 0,9% : 2 x 100 ml sau 1 x 250 ml, pentru administrare intravenoasă 2 x 50 ml, pentru a spăla linia de perfuzie înainte şi după perfuzie Soluţie antiseptică (clorhexidină)
Materiale necesare	Un număr corespunzător de seringi de : 10 ml şi 50 ml, în funcţie de doza de Cerezyme Ace hipodermice sterile: 3 (1,1 x 40 mm) un ac fluture Linie de perfuzie cu filtru de 0.2 microni, cu legare redusă a proteinelor
Alte materiale	Tavă pentru ace hipodermice Bandă microporoaă Tampoane sterile Recipient pentru eliminarea obiectelor ascuţite Soluţie pentru spălarea mâinilor

Reconstituire cu apă pentru preparate injectabile

3. Îndepărtaţi capacul flip-off al flaconului de Cerezyme ,dezinfectaţi dopul din cauciuc al flaconului cu soluţie de clorhexidină şi lăsaţi-l să se usuce la aer
4.

4. Deschideţi recipientul cu apă pentru preparate injectabile.

5. Extrageţi în seringă 10,2 ml apă pentru preparate injectabile. Volumul reconstituit va fi de 10.6 ml. .

6. Injectaţi uşor apa pentru preparate injectabile pe peretele din sticlă al fiecărui flacon.

7. Rotiţi cu grijă flaconul (flacoanele) pentru a amesteca soluţia (evitaţi agitarea puternică în timpul procesului de reconstituire, pentru a preveni formarea spumei).

8. După amestecare, pot apărea bule mici de aer.

9. Lăsaţi soluţia să se stabilizeze timp de câteva minute, pentru a permite eventualelor bule de aer prezente să dispară şi pentru a vă asigura că pulberea este reconstituită corect).

10. După reconstituire, soluţia trebuie inspectată vizual înainte de utilizare. Deoarece este o soluţie de proteine, apare ocazional o uşoară floculare (descrisă ca fibre subţiri, translucide) după diluare. Soluţia reconstituită trebuie să fie limpede, incoloră, fără particule străine.

11. Dacă observaţi particule străine sau modificări de culoare a soluţiei, nu utilizaţi medicamentul şi adresaţi-vă asistentei medicale care acordă îngrijire la domiciliu.

Diluare cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%

12. Dezinfectaţi cu soluţie de clorhexidină capacul/portul a 1 sau 2 pungi de soluţie de clorură de sodiu 0,9% şi permiteţi-i să se usuce la aer.

13. Calculaţi cantitatea de soluţie reconstituită Cerezyme prezentă în flacoane şi extrageţi aceeaşi cantitate din punga cu soluţie de clorură de sodiu, creând astfel spaţiu suficient pentru a adăuga soluţia reconstituită Cerezyme.

De exemplu, în cazul în care cantitatea prescrisă este de 3 flacoane de Cerezyme a câte 400 unităţi fiecare, îndepărtaţi 30 ml (= 3 x 10 ml) de soluţie de clorură de sodiu din punga cu soluţie de clorură de sodiu. Nu îndepărtaţi niciodată mai mult de jumătate din conţinutul pungii cu soluţie de clorură de sodiu, pentru a vă asigura că cel puţin jumătate din soluţia diluată este soluţie de clorură de sodiu.

Cu ajutorul uneia sau mai multor seringi de 50 ml, extrageţi câte10 ml (flacon a 400 U) din flacoanele cu soluţie reconstituită. Atunci când sunt extrase aceste cantităţi, soluţia reconstituită nu trebuie să conţină deloc spumă.

14. Injectaţi uşor volumul total al soluţiei reconstituite Cerezyme în punga cu soluţie de clorură de sodiu 0,9%și rotiți ușor pentru a evita spumarea.

15. Soluţia diluată trebuie administrată folosind o linie de perfuzie cu filtru de 0,2 microni, cu legare redusă a proteinelor.

Administrare

16. Doza de medicament Cerezyme şi viteza perfuziei vor fi stabilite de către medicul curant.

17. Cerezyme trebuie administrat în perfuzie intravenoasă.

18. IMPORTANT : Soluţia trebuie administrată în decurs de trei ore de la reconstituire.

19 Înainte de începerea perfuziei, umpleți sistemul de perfuzie cu soluția preparată pentru a îndepărta bulele de aer.

20. La sfârşitul perfuziei, pentru a vă asigura că este administrată doza totală pentru tratament, spălaţi tubulatura utilizând o pungă cu 50 ml soluţie de clorură de sodiu 0,9%, fără a creşte viteza perfuziei.

21. Din punct de vedere al siguranţei microbiologice, soluţia diluată trebuie utilizată imediat. Dacă soluţia diluată nu poate fi utilizată imediat, poate fi păstrată la frigider la temperaturi cuprinse între 2°C şi 8°C, protejată de lumină, pentru o perioadă maximă de 24 de ore.

Vă rugăm să citiţi Prospectul pentru informații detaliate legate de efectele adverse.

Apel la raportarea reacţiilor adverse

Dacă manifestaţi orice reacţii adverse, adresaţi-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacţii adverse nemenţionate în prospect. De asemenea, puteţi raporta reacţiile adverse direct prin intermediul sistemului naţional de raportare către:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Fax: +4 0213 163 497

Tel: +4031 423 2419

E-mail: adr@anm.ro

www.anm.ro

Reacțiile se pot raporta şi către reprezentanţa locală a deţinătorului autorizaţiei de punere pe piaţă, la următoarele date de contact:

Sanofi Romania SRL

Str. Gara Herăstrău, nr. 2C, etaj 9

Sector 2, București

România

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Fax: +40 (0) 21 317 31 34
e-mail: pv.ro@sanofi.com

Jurnal de tratament pentru administrarea perfuziei cu Cerezyme la domiciliu

INFORMAȚII DESPRE PACIENT

Name	
Adresa	
Oraș	
Număr de telefon	

DATE DE CONTACT MEDICALE

Asistentă medicală	**Medic curant**	**Farmacie**
Nume: Centru: Număr de telefon:	Nume: Spital: Adresă: Număr de telefon:	Nume: Adresă : Număr de telefon:

DETALII PRIVIND TRATAMENTUL DE URGENȚĂ

Acţiuni necesare în cazul apariţiei unei reacţii grave asociate perfuziei:

1. **Opriţi perfuzia**
2. **Apelaţi numărul naţional de urgenţă 112**
3. **Contactaţi medicul**

DETALII PRIVIND ADMINISTRAREA

(trebuie completate de către medicul curant)

Cerezyme se administrează de la	Data (zz-ll-aaaa):
Prima perfuzie administrată la domiciliu	Data (zz-ll-aaaa):
Motive pentru administrarea perfuziei cu Cerezyme la domiciliu	
Vă rugăm să indicaţi sprijinul care trebuie acordat de către asistenta medicală	

Schema de administrare a dozelor de Cerezyme (doza, frecvenţa şi viteza perfuziei)	

INFORMAȚII PRIVIND PERFUZIA

trebuie completate de către asistenta medicală şi/sau pacient şi/sau persoana care îngrijeşte pacientul

Data administrării perfuziei	**Data (zz-ll-aaaa):**	**Data (zz-ll-aaaa):**
Starea generală de sănătate a pacientului: probleme specifice/observaţii		
Doza administrată în perfuzie		
Număr de flacoane utilizate Lot		
Durata administrării		
Viteza de administrare		
Probleme/Observaţii (legate de perfuzie, de exemplu, reacţii adverse)		

INFORMAȚII PRIVIND PERFUZIA

trebuie completate de către asistenta medicală şi/sau pacient şi/sau persoana care îngrijeşte pacientul

Data administrării perfuziei	**Data (zz-ll-aaaa):**	**Data (zz-ll-aaaa):**
Starea generală de sănătate a pacientului: probleme specifice/observaţii		
Doza administrată în perfuzie		
Număr de flacoane utilizate Lot		

Durata administrării		
Viteza de administrare		
Probleme/Observaţii (legate de perfuzie, de exemplu, reacţii adverse)		

INFORMAȚII PRIVIND PERFUZIA

trebuie completate de către asistenta medicală şi/sau pacient şi/sau persoana care îngrijeşte pacientul

Data administrării perfuziei	**Data (zz-ll-aaaa):**	**Data (zz-ll-aaaa):**
Starea generală de sănătate a pacientului: probleme specifice/observaţii		
Doza administrată în perfuzie		
Număr de flacoane utilizate Lot		
Durata administrării		
Viteza de administrare		
Probleme/Observaţii (legate de perfuzie, de exemplu, reacţii adverse)		