

**Broșura pacientului - varianta web**  
**EURneffy 2 mg (spray nazal cu adrenalină)**

**Cum să identificați o reacție alergică severă**

Utilizați EURneffy la primele semne ale unei reacții alergice severe după expunerea la un alergen. Simptomele pot include:

- Mâncărimi ale pielii
- Eruptii în relief pe piele (precum cele provocate de urzici)
- Înroșire a feței
- Umflare a buzelor, gâtului, limbii, mâinilor și picioarelor
- Respirație șuierătoare
- Răgușeală
- Dificultate la respirație
- Greață
- Vărsături
- Crampe la stomac
- Pierderea conștienței
- Neliniște
- Bătăi rapide ale inimii
- Convulsii
- Diaree (scaune moi)
- Pierdere a controlului vezicii urinare

**NU ezitați să utilizați** deoarece severitatea simptomelor se poate schimba rapid.

Asigurați-vă că dumneavoastră, copilul dumneavoastră, familia, persoana care are grijă de dumneavoastră, colegii și profesorii, știu cum și când să utilizeze EURneffy.

**Depozitare și manipulare**

Fiecare dispozitiv EURneffy pentru o singură utilizare conține o doză de adrenalină, și este livrat într-un blister cu instrucțiuni de utilizare.

Este important să aveți la dumneavoastră a 2-a doză, dacă este necesară.

EURneffy nu necesită condiții speciale de păstrare. În caz de congelare accidentală, sprayul nazal nu va funcționa. Lăsați sprayul nazal să se decongeleze timp de cel puțin o oră; nu îl utilizați în cazul în care conținutul este încă congelat sau nu s-a decongelat complet. Congelarea nu afectează perioada de valabilitate a medicamentului.

Verificați periodic data de expirare și înlocuiți produsul EURneffy înainte de data de expirare.

### **Instrucțiuni de utilizare corectă pentru pacienți și îngrijitorii acestora**

Acest ghid este conceput pentru a vă sfătui cu privire la ce trebuie să faceți în cazul unei reacții alergice severe sau anafilaxie. Atât pacienții, cât și îngrijitorii acestora trebuie să se familiarizeze cu acest ghid pentru a se asigura că pot recunoaște simptomele unei reacții alergice și că știu cum să administreze în siguranță și eficient spray-ul nazal EURneffy 2 mg.

#### **1. Prindere**

Țineți spray-ul nazal ca în imaginea alăturată. Țineți sprayul nazal cu degetul mare pe partea de jos a pistonului și câte un deget de-o parte și de alta a duzei.

*NU trageți și nu împingeți pistonul.*

*NU efectuați pulverizări prealabile sau de încercare; fiecare spray nazal conține o singură doză*

#### **2. Poziționare**

Introduceți vârful sprayului nazal într-o nară până când degetele vă ating nasul. Țineți duza dreaptă în nas, îndreptată spre frunte.

#### **3. Apăsări**

Apăsări ferm pistonul în sus până când se declanșează și pulverizează în nară.

*NU înclinați dispozitivul spre peretele interior sau exterior al nasului.*

### **După utilizarea EURneffy**

Solicitați imediat asistență medicală de urgență pentru monitorizarea atentă a episodului anafilactic și pentru cazul în care va fi necesar un tratament suplimentar. Dacă nu puteți efectua apelul, rugați pe altcineva să sune în locul dumneavoastră.

### **Când utilizați EURneffy**

Pacienții trebuie să stea întinși pe spate, cu picioarele ridicate, dar trebuie să se ridice în șezut dacă au dificultăți respiratorii. Pacienții inconștienți trebuie întinși pe o parte, în poziția laterală de siguranță pentru a preveni sufocarea. Dacă simptomele nu dispar, ar trebui să rămâneți cu o altă persoană până primiți asistență medicală.

### **Monitorizați simptomele**

Dacă simptomele continuă să se agraveze sau reapar după aproximativ 10 minute sau în cazul oricărei erori de administrare, utilizați o a doua doză folosind un nou spray nazal EURneffy în aceeași nară.

### **Ce este EURneffy?**

EURneffy este un spray nazal cu adrenalină pentru adulți și copii cu o greutate peste 30 kg, pentru tratamentul de urgență al reacțiilor alergice, inclusiv anafilaxie (reacție alergică

bruscă, severă, care pune uneori viața în pericol), cauzate de înțepături sau mușcături de insecte, alimente, medicamente și alți alergeni (substanțe care provoacă alergii), precum și anafilaxia idiopatică (cauza alergiei nu este cunoscută) sau anafilaxia indusă de efortul fizic.

Materialele educaționale pentru EURneffy, inclusiv o copie a prospectului și instrucțiunile de utilizare, sunt disponibile online [www.EURneffy.eu](http://www.EURneffy.eu)

### **Raportarea reacțiilor adverse**

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România:

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București, 011478- RO

e-mail: [adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Website: [www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament. Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

[PV.ro@biomapass.com](mailto:PV.ro@biomapass.com)

[ALKPV.RO@biomapas.com](mailto:ALKPV.RO@biomapas.com)