

**Erelzi 25 mg soluție injectabilă în seringă preumplută**

**Erelzi 50 mg soluție injectabilă în seringă preumplută**

**Erelzi 50 mg soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut (Etanercept)**

**Cardul pacientului**

Substanța(e) activ(ă)e (DCI sau denumirea comună):	Etanercept
Produs(e) (denumire(i) ale mărcii):	Erelzi 25 mg/0,5 ml și 50 mg/1,0 ml, soluție injectabilă
Stadiul documentului:	Final
Nr. versiune RMP aplicabilă:	5.1
Data materialului educațional	05 Nov 2021

## **Cardul pacientului**

Acest card conține informații de siguranță importante pe care trebuie să le cunoașteți înainte și în timpul tratamentului cu Erelzi (etanercept).

Dacă nu înțelegeți aceste informații, vă rugăm să cereți medicului dumneavoastră să vi le explice.

- Arătați acest card oricărui medic implicat în tratamentul dumneavoastră.
- Citiți prospectul medicamentului Erelzi (etanercept) pentru mai multe informații.
- Păstrați acest card timp de 2 luni de la ultima doză de Erelzi (etanercept) deoarece pot apărea reacții adverse și după administrarea ultimei doze de Erelzi (etanercept).

## **Infecții**

Erelzi (etanercept) poate crește riscul de apariție a infecțiilor, care pot fi severe.

- Nu utilizați Erelzi (etanercept) dacă aveți o infecție. Dacă nu sunteți sigur, adresați-vă medicului dumneavoastră.
- Dacă prezentați simptome care sugerează prezența unei infecții, cum sunt febră, tuse persistentă, pierdere în greutate sau apatie, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.
- Este necesar să fiți evaluat pentru riscul de a avea tuberculoză. Cereți medicului dumneavoastră să înregistreze mai jos datele și rezultatele ultimului test efectuat pentru tuberculoză:

Test: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Rezultate: \_\_\_\_\_

Test: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_

Rezultate: \_\_\_\_\_

Cereți medicului dumneavoastră să înregistreze mai jos și alte medicamente care pot crește riscul apariției unei infecții.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Insuficiență cardiacă congestivă**

Dacă dezvoltați simptome sugestive pentru diagnosticul de insuficiență cardiacă congestivă sau pentru agravarea acestei afecțiuni pre-existente, cum sunt scurtarea respirației, umflarea gleznelor, tuse sau oboseală persistente, adresați-vă imediat medicului dumneavoastră.

### **Alte informații (vă rugăm completați)**

**Numele pacientului:** \_\_\_\_\_

**Numele medicului:** \_\_\_\_\_

**Numărul de telefon al medicului:** \_\_\_\_\_

Este important ca dumneavoastră și medicul dumneavoastră să înregistrați numele medicamentului prescris, precum și seria acestuia

**Denumirea medicamentului :** \_\_\_\_\_

**Serie:** \_\_\_\_\_