

# Ghid pentru pacienți

## COLONOSCOPIA DUMNEAVOASTRĂ

### EZICLEN®

Concentrat pentru soluție orală

Sulfat de sodiu anhidru, sulfat de magneziu heptahidrat și sulfat de potasiu

Medic:

Data:

La:

Locație:

SCHEMA TERAPEUTICĂ A PACIENTULUI  
(bifați cura recomandată):

- ☐ CURA DE O ZI: 2 doze în ziua PRECEDENTĂ efectuării procedurii
- ☐ CURA DE DOUĂ ZILE (ÎN DOZĂ DIVIZATĂ): prima doză în ziua PRECEDENTĂ efectuării procedurii, a doua doză în ziua efectuării procedurii

### ► IMPORTANȚA UNEI HIDRATĂRI ADECVATE

Deoarece diareea induce deshidratare, este foarte important să respectați cu strictețe instrucțiunile de mai sus și să beți suplimentar cât mai multe lichide limpezi pentru a menține un nivel adecvat de hidratare.



**Puteți să beți oricare dintre următoarele lichide limpezi:**

apă, ceai sau cafea (fără lapte sau frișcă), băuturi răcoritoare acidulate sau neacidulate, sucuri de fructe strecurate **fără pulpă** (cu excepția celor de culoare roșie sau violet), supă limpede sau supă strecurată pentru eliminarea părților solide.



**NU AVEȚI VOIE să beți**

Lapte, băuturi de culoare roșie sau violet, băuturi alcoolice, sucuri de fructe sau băuturi răcoritoare **cu pulpă**.

### CUM SĂ VĂ PREGĂTIȚI PENTRU PROCEDURĂ

Pentru a asigura eficacitatea golirii intestinale și prin urmare succesul procedurii, este esențial să respectați cu strictețe următoarele instrucțiuni:

În ziua precedentă efectuării procedurii puteți lua un mic dejun ușor, ulterior puteți consuma **DOAR lichide limpezi** la prânz, cină și restul meselor până la efectuarea procedurii

### CUM SĂ LUAȚI EZICLEN®?

Procedura de golire intestinală cu Eziclen® constă în administrarea a **2 doze** în conformitate cu următoarea **secvență**:

► DOZA 1 - data:

Începe la:

Prima oră



Turnați în pahar conținutul **flaconului** de EZICLEN



Adăugați apă peste medicament până la marcajul de pe pahar



Beți încet (în decurs de o jumătate de oră până la o oră) tot lichidul din pahar

A doua oră



**IMPORTANT**

În următoarea oră trebuie să beți încă 2 pahare cu apă (sau lichide limpezi permise - vezi lista de băuturi permise)

► DOZA 2 - data:

Începe la:

Prima oră



Turnați în pahar conținutul **celui de-al doilea flacon** de EZICLEN



Adăugați apă peste medicament până la marcajul de pe pahar



Beți încet (în decurs de o jumătate de oră până la o oră) tot lichidul din pahar

A doua oră



**IMPORTANT**

În următoarea oră trebuie să beți încă 2 pahare cu apă (sau lichide limpezi permise - vezi lista de băuturi permise)

#### Notă:

- În absența anesteziei, trebuie să opriți consumul de lichid cu cel puțin 1 oră înainte de începerea procedurii.
- În caz de anestezie, trebuie să opriți consumul de lichid, de obicei cu cel puțin 2 ore înainte de începerea procedurii, ținând cont de instrucțiunile anestezistului.

**VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE PROSPECTUL ÎNAINTE DE A LUA ACEST MEDICAMENT.**


Versiunea a fost aprobată de ANMMDMR în Aprilie 2024.

Partea de jos a paginii 1: acest document are două pagini. Aceasta este pagina 1.


**Nu uitați să completați acest formular și să îl returnați medicului dumneavoastră în ziua efectuării procedurii.**

Tabelul de mai jos vă va ajuta să verificați dacă ați urmat instrucțiunile în mod corect, asigurând astfel o pregătire intestinală de calitate pentru procedura efectuată de medicul dumneavoastră. Vă rugăm să notați data administrării și orele de administrare a diferitelor doze identificate în tabel.

**Trebuie să vă străduiți să beți tot preparatul și cantitatea suplimentară de lichide!**

▶ DOZA 1 - data: <input type="text"/>		
<b>PAS</b>		<b>Ora administrării</b>
<b>Începerea tratamentului – PAȘII 1-3</b> Conținutul primului flacon de EZICLEN trebuie diluat cu apă până la nivelul marcat cu o linie pe pahar		Ora la care ați băut prima doză de Eziclen diluat: <input type="text"/>
<b>Consumul suplimentar de apă sau lichide limpezi – PASUL 4</b> 2 x paharul umplut cu apă sau lichide limpezi permise		Ora la care ați băut primul pahar cu apă (sau lichide limpezi): <input type="text"/>  Ora la care ați băut al doilea pahar cu apă (sau lichide limpezi): <input type="text"/>

<b>Ați băut tot preparatul?</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Dacă NU, menționați aproximativ cantitatea băută: <input type="text"/>	
<b>Lichide limpezi băute pentru a asigura hidratarea corespunzătoare</b>	
<b>Tipul de lichid</b>	<b>Ați băut tot conținutul paharului?</b>
<b>Primul pahar</b>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Dacă NU, menționați aproximativ cantitatea băută: <input type="text"/>
<b>Al doilea pahar</b>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Dacă NU, menționați aproximativ cantitatea băută: <input type="text"/>

▶ DOZA 2 - data: <input type="text"/>		
<b>PAS</b>		<b>Ora administrării</b>
<b>A doua etapă a tratamentului – REPETAȚI PAȘII 1-3</b> Conținutul celui de-al doilea flacon de EZICLEN trebuie diluat cu apă până la nivelul marcat cu o linie pe pahar		Ora la care ați băut cea de-a doua doză de Eziclen diluat: <input type="text"/>
<b>Consumul suplimentar de apă sau lichide limpezi – PASUL 4</b> 2 x paharul umplut cu apă sau lichide limpezi permise		Ora la care ați băut primul pahar cu apă (sau lichide limpezi): <input type="text"/>  Ora la care ați băut al doilea pahar cu apă (sau lichide limpezi): <input type="text"/>

<b>Ați băut tot preparatul?</b> <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Dacă NU, menționați aproximativ cantitatea băută: <input type="text"/>	
<b>Lichide limpezi băute pentru a asigura hidratarea corespunzătoare</b>	
<b>Tipul de lichid</b>	<b>Ați băut tot conținutul paharului?</b>
<b>Primul pahar</b>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Dacă NU, menționați aproximativ cantitatea băută: <input type="text"/>
<b>Al doilea pahar</b>	<input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Dacă NU, menționați aproximativ cantitatea băută: <input type="text"/>

După procedură: pentru a înlocui lichidul pierdut în timpul pregătirii pentru procedură, vă rugăm să beți suficiente lichide pentru a menține o hidratare adecvată.

**Apel la rapoartarea reacțiilor adverse.** Este important să raportați orice reacție adversă suspectată la Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, București 011478- RO, e-mail: adr@anm.ro, Website: www.anm.ro. Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la Mayoly Romania SRL, Str. Mihai Eminescu, Nr. 108-112, București, Sector 2. Telefon: +40 371 575 757, e-mail: vigilance.ROU@mayoly.com

