

# INFORMAȚII IMPORTANTE

**ILARIS**

**150 mg injecție subcutanată  
(canakinumab)**

pentru tratamentul bolii Still active, inclusiv boala Still cu debut la  
vârsta adultă (BSDA) și al artritei idiopatice juvenile sistemice (SJIA)

*București, Str. Gara Herăstrău, Nr. 2,  
Complex Equilibrium, Clădirea 1, Etaj 10,  
Secțiunea E10.02, Sector 2, cod poștal 020334  
Tel.: 021 312 99 01; Fax: 021 312 99 07  
e-mail: [informatie.medicala@novartis.com](mailto:informatie.medicala@novartis.com)*

*RORD\_3\_09/2022*

---

## Înainte de tratamentul cu canakinumab

- **Infecții:** Nu trebuie să fiți tratat cu canakinumab, dacă aveți o infecție activă care necesită intervenție medicală.
- **Vaccinări:** Înainte de a începe tratamentul cu canakinumab, discutați cu medicul dumneavoastră despre eventualele vaccinuri de care ați putea avea nevoie.

## În timpul tratamentului cu canakinumab

- **Riscul de infecții:** Utilizarea canakinumab este asociată cu un risc crescut de apariție a infecțiilor, inclusiv de infecții grave.
- Dacă dezvoltați o infecție, poate fi necesar să vi se întrerupă tratamentul cu canakinumab. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, dacă aveți febră care durează mai mult de 3 zile sau alte simptome care pot sugera o infecție.
- Solicitați **imediat** asistență medicală, dacă prezentați simptome precum:
  - febră, tuse sau dureri de cap persistente sau
  - înroșire, încălzire sau umflare localizată a pielii sau
  - tuse persistentă, pierdere în greutate și subfebrilitate
- **Sindromul de activare macrofagică (MAS):** Pacienții cu boala Still pot manifesta o afecțiune numită sindromul activării macrofagelor (macrofagele fiind un tip de celule albe sanguine), care poate pune viața în pericol. Adresați-vă imediat medicului dumneavoastră, dacă simptomele bolii Still de care suferiți se agravează sau dacă aveți simptome ale unei infecții.
- **Sarcina:** Dacă vi s-a administrat canakinumab în timpul sarcinii, este important să informați medicul sau asistenta medicală a nou-născutului înainte de a i se administra acestuia orice vaccinuri. Copilului dumneavoastră nu trebuie să i se administreze vaccinuri vii decât după minimum 16 săptămâni de la ultima doză de canakinumab care v-a fost administrată înainte de naștere.

---

**Indicație privind tratamentul:**

**Asigurați-vă că aveți o LISTĂ CU TOATE MEDICAMENTELE pe care le luați atunci când vă prezentați la medic.**

*Numele pacientului:*

---

*În cazul copiilor: numele părintelui/tutorelui:*

---

*Data primei doze de canakinumab:*

---

*Doza de canakinumab administrată:*

---

*Numele medicului:*

*Numărul de telefon al medicului:*

---

*Versiune aprobată de ANMMDMR în august 2022*