

Cum să recunoașteți hipoglicemia

Dacă apare hipoglicemia, copilul dumneavoastră va prezenta semne de avertizare și persoanele din jurul acestuia ar trebui să fie pregătite să recunoască simptome precum schimbări de comportament sau reacții fizice.

Acestea sunt enumerate în tabelul de mai jos:

✿ Amețeală	✿ Dificultăți de concentrare
✿ Oboseală	✿ Transpirație
✿ Neliniște	✿ Greață
✿ Iritabilitate	✿ Bătăi ale inimii rapide sau neregulate
✿ Foame	

La copiii mai mici, cele mai importante simptome de care trebuie să fiți conștienți sunt următoarele: copilul devine palid, se oprește din joacă și rămâne așezat sau devine somnoros.

Dacă hipoglicemia este severă, copilul dumneavoastră poate avea conștiență redusă sau convulsii. Ambele pot fi alarmante, dar de obicei nu sunt periculoase pentru copilul dumneavoastră. În această situație, trebuie să vă asigurați că îi sunt libere căile respiratorii și că este culcat pe o parte.

Simptomele hipoglicemiei care apar în timpul nopții pot fi neliniște, anxietate sau excitabilitate, coșmaruri, enuresis nocturn (urinare în timpul somnului) sau oboseală dimineața.

Pentru a recunoaște și a confirma hipoglicemia, la inițierea tratamentului și până la stabilirea unei doze bine tolerate de Increlex, copilul dumneavoastră trebuie monitorizat prin măsurarea glicemiei la nivelul vârfului degetului, înainte de fiecare masă. Dacă apar simptome frecvente de hipoglicemie sau hipoglicemie severă, monitorizarea concentrației de zahăr din sânge trebuie

Aspecte de reținut

✿ Medicamentul Increlex poate provoca hipoglicemie, denumirea medicală pentru un nivel scăzut al zahărului din sânge

✿ Există modificări ale comportamentului și simptome fizice care vă pot ajuta să recunoașteți hipoglicemia dacă apare

✿ Hipoglicemia este cel mai probabil să apară dacă copilul dumneavoastră nu mănâncă suficient sau face exerciții fizice fără să mănânce suficient; de aceea injecțiile cu medicamentul Increlex trebuie administrate cu puțin timp înainte sau imediat după masă

✿ Dacă apare hipoglicemie, copilul trebuie să mănânce sau să bea ceva care conține zahăr, cum ar fi suc de portocale, dulciuri, lapte sau gel de glucoză sau comprimate, care pot fi cumpărate la o farmacie

✿ În cazuri foarte rare de hipoglicemie severă, copilul dumneavoastră poate să nu fie în stare de conștiență pentru a înghiți și trebuie să l se administreze o injecție cu glucagon

să continue, indiferent de momentul meselor și, dacă este posibil, în cazul simptomelor hipoglicemice. Vedeți „Cum să preveniți hipoglicemia”.

Increlex▼
mecasermină

Informații pentru părinți, persoanele care îi îngrijesc pe pacienți și pentru pacienți, privind hipoglicemia și gestionarea acesteia

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în prospectul medicamentului. Asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1, 011478 - București

Tel: + 4 0757 117 259; +4 021 317 11 02

Fax: +4 0213 163 497

e-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

IPSEN PHARMA ROMANIA SRL,
Str. Grigor Alexandrescu nr. 59, Sector 1, București
e-mail: pharmacovigilane.romania@ipsen.com
Tel: + 4 021 231 27 20

Fax: +4 0213 231 27 20

Raportarea reacțiilor adverse vă poate ajuta să furnizați mai informații privind siguranța acestui medicament.

▼ Acest medicament este supus unei monitorizări suplimentare. Aceasta va permite identificarea rapidă a noilor informații de siguranță. Puteți ajuta prin raportarea oricăror reacții adverse pe care copilul le poate avea. Pentru informații privind raportarea reacțiilor adverse, a se vedea secțiunea “Apel la raportarea reacțiilor adverse”.

Document de informare așa cum este descris în Autorizația de punere pe piață pentru Increlex

Citiți întotdeauna prospectul înainte de a utiliza Increlex.

Ce este hipoglicemia și de ce trebuie să știi despre ea?

Hipoglicemia este denumirea medicală pentru un nivel scăzut al glucozei din sânge. Dacă copilului dumneavoastră i s-a prescris medicamentul Increlex, trebuie să știți despre hipoglicemie și cum să o abordați dacă apare.

Medicamentul Increlex este înrudit cu insulina, un hormon natural din organism care controlează nivelul glucozei din sânge, astfel încât medicamentul Increlex poate afecta nivelurile de glucoză din sânge, și are efecte de promovare a creșterii. Ca urmare, hipoglicemia este o posibilă reacție adversă a tratamentului cu medicamentul Increlex.

Dacă apare hipoglicemia, acest lucru are loc de obicei în prima lună de tratament și și, problema se diminuează pe măsură ce tratamentul continuă.

Este important să citiți următoarele informații, deoarece există risc de apariție a hipoglicemiei și orice probleme care apar pot fi ușor diminuate prin luarea unor măsuri de precauție foarte simple.

Cum să preveniți hipoglicemia

Doi dintre cei mai importanți factori de risc pentru hipoglicemie sunt:

- 1. **Hrănire insuficientă, de ex. întârzierea sau lipsa meselor**
- 2. **Exercițiu fizic fără a mânca suficient**

Următoarele recomandări trebuie urmărite îndeaproape pe durata tratamentului cu medicamentul Increlex:

Injectiile cu Increlex trebuie administrate cu puțin timp înainte sau imediat după masă (în decurs de 20 de minute)

Dacă o doză de Increlex nu poate fi administrată cu puțin timp înainte sau imediat după masă, doza nu trebuie administrată. Următoarea doză trebuie să fie cea obișnuită și nu trebuie dublată pentru a compensa doza uitată

Până când medicul copilului nu vă sfătuiește altfel, trebuie evitată o activitate fizică susținută timp de 2-3 ore după injectarea medicamentului

Dacă activitatea fizică are loc după micul dejun, trebuie luată o gustare după aceea. Dacă copilul dumneavoastră este activ fizic după masa de seară, ar trebui să ia o gustare înainte de a merge la culcare .

Este important să aveți la îndemână gustări, mai ales pentru copiii mai mici, și să-l învățați să mănânce imediat ce simt foame. Dacă apare hipoglicemia, în ciuda aportului adecvat de alimente, trebuie să spuneți medicului copilului dumneavoastră, care poate reduce doza de Increlex.

La inițierea tratamentului și până la stabilirea unei doze bine tolerate, înainte de fiecare masa. copilul dumneavoastră trebuie monitorizat prin măsurarea glicemiei la nivelul vârfului degetului. Dacă apar simptome frecvente de hipoglicemie sau hipoglicemie severă, monitorizarea concentrației de zahăr din sângele prezent în capilarele de la vârful degetelor trebuie să continue, indiferent de relația cu momentul meselor și, dacă este posibil, în cazul simptomelor de hipoglicemie.

Cum să abordați hipoglicemia dacă apare

Copilul dumneavoastră trebuie să mănânce sau să bea ceva care conține zahăr, cum ar fi miere, o băutură dulce, sau tablete de glucoză care pot fi cumpărate de la o farmacie

Alimentele sau băuturile care conțin grăsimi (de exemplu, ciocolată, batoane de ciocolată, biscuiți sau lapte) nu sunt la fel de bune. Dulciurile nu sunt, de asemenea ideale, dar pot fi folosite dacă nu este disponibil nimic altceva

După 10-15 minute, copilul dumneavoastră ar trebui să se simtă mai bine. Dacă nu, ar trebui să i se dea mai mult zahăr. Poate fi administrată o gustare, cum ar fi fructe sau pâine cu brânză sau șuncă, în funcție de cât timp este până la următoarea masă

Când vizitați medicul copilului dumneavoastră, trebuie să-i spuneți lui sau ei despre toate ocaziile în care a apărut hipoglicemia de la ultima vizită. Ținerea unei evidențe poate ajuta în acest sens

Exemple de ceea ce ar trebui să i se administreze copilului dumneavoastră pentru a trata hipoglicemia:

 Glucoză gel	 Dulciuri
 Suc de portocale	 Lapte

Este important să aveți la îndemână gustări, mai ales pentru copiii mai mici, și să-l învățați să mănânce imediat ce simt foame. Dacă apare hipoglicemia, în ciuda aportului adecvat de alimente, trebuie să spuneți medicului copilului dumneavoastră, care poate reduce doza de Increlex.

În cazuri foarte rare, poate apărea hipoglicemie severă. În acest caz, copilul dumneavoastră poate să nu fie în stare de conștientă pentru a înghiți. În astfel de cazuri, nu trebuie să încercați să-i oferiți copilului dumneavoastră ceva de mâncare sau de băut, ci trebuie să i se administreze o injecție de glucagon.

Când este injectat, glucagonul crește nivelul zahărului din sânge. Echipa clinică din spitalul dumneavoastră, vă poate instrui cum să utilizați glucagon, în cazul în care trebuie să-l administrați copilului dumneavoastră.

