

Jext:


Instrucțiuni de manipulare

1.




Prindeți injectorul Jext în mâna dominantă (cea cu care scrieți) cu degetul mare aproape de capacul galben.

2.



Scoateți capacul galben cu cealaltă mână.

3.



Așezați vârful negru al injectorului pe partea exterioară a coapsei, ținând injectorul într-un unghi drept (aproximativ 90°) față de coapsă.

4.



Împingeți ferm vârful negru în coapsa exterioară până când auziți un „click” care confirmă că injecția a început, apoi țineți-l împins înăuntru. Țineți injectorul ferm pe coapsă timp de 10 secunde (o numărare lentă până la 10), apoi scoateți-l. Vârful negru se va extinde automat și va ascunde acul.

5.



Masați zona de injectare timp de 10 secunde. Căutați imediat ajutor medical. Formați 112, solicitați ambulanța, anunțați anafilaxia. Dacă nu puteți efectua apelul, cereți altcuiva să sune.

Sunt în pericol de anafilaxie care pune viața în pericol:

Dacă nu mă pot ajuta, vă rog să urmați instrucțiunile din acest prospect pentru a-mi oferi o injecție cu adrenalină.

Pentru a face acest lucru, va trebui să utilizați stiloul meu injector Jext. Formați 112, cereți o ambulanță și spuneți anafilaxie”

Locația Jext:

Nume:

Rudele apropiate/contact de urgență, nume și număr de telefon

Anafilaxie

Jext (adrenalină) Card cu informații pentru pacient

Informații de urgență despre cum și când să utilizați Jext

Ghid rapid de tratament Anafilaxie

Administrați Jext și imediat după aceea formați 112, cereți o ambulanță și spuneți „anafilaxie”

**Fii pregătit:
Folosește un al
doilea Jext
după 5-15 minute
dacă simptomele nu
se îmbunătățesc**

**TREBUIE SĂ AVEȚI STILOUL INJECTOR JEXT
CU DVS. TOT TIMPUL**

Când ar trebui să utilizez Jext?

Medicul dumneavoastră ar trebui să vă explice când și cum să utilizați Jext. Dacă începeți să aveți simptome de anafilaxie, care sunt enumerate mai jos, este important să utilizați imediat Jext. Dacă simptomele nu se ameliorează sau simptomele inițiale reapar, un al doilea Jext poate fi folosit după aproximativ 5-15 minute.

Jext injectează o singură doză de soluție de adrenalină.

Simptome de anafilaxie

- Mâncărimi ale pielii
- Eruupție cutanată extinsă (ca o erupție cutanată de urzică)
- Înroșire
- Umflarea buzelor, gâtului, limbii, mâinilor și picioarelor
- Respirație șuierătoare
- Răgușeală
- Dificultăți de respirație
- Greață
- Vărsături
- Crampe stomacale
- Pierderea conștienței

Rețineți: este important să vă asigurați că Jext se află în perioada de valabilitate


Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agencia Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România
Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1
011478 - Bucuresti
Fax: +4 0213 163 497
tel: + 4 021 317 11 02
e-mail: adr@anm.ro
Raportare online: <https://adr.anm.ro/>
Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact: alkpv.ro@biomapas.com
Raportând reacțiile adverse, puteți contribui la furnizarea de informații suplimentare privind siguranța acestui medicament.

**Asigură-te,
copilul tău,
rudele tale
și prietenii știu
cum și când
se utilizează Jext**



Jext Trainer este disponibil pentru ca tu să exersezi folosind Jext într-o situație de urgență. Adresați-vă medicului dvs. alergolog pentru a-l obține. O demonstrație video este disponibilă și puteți să vizualizați demonstrația video pe www.jext.com