

Jext 150 micrograme soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut
Jext 300 micrograme soluție injectabilă în stilou injector (pen) preumplut
(adrenalină)

Instrucțiuni de utilizare – material audio-video

Dacă credeți că dumneavoastră sau cineva aflat în îngrijirea dumneavoastră are o reacție anafilactică, cereți ajutor imediat.

Urmați acești pași...

- Stați în cea mai bună poziție pentru a utiliza Jext
 - Întindeți-vă cu picioarele ridicate, cu excepția cazului în care acest lucru vă creează probleme de respirație.
 - Dacă aveți probleme de respirație ar trebui să vă ridicați în picioare.
 - Dacă sunteți un părinte sau un îngrijitor care administrează Jext unui copil, este important să-i țineți piciorul în poziție, astfel încât să puteți administra corect Jext în exteriorul coapsei.
 - Pacienții inconștienți trebuie plasați în poziția de recuperare.
-
- Scoateți Jext din geanta de transport
 - Prindeți injectorul Jext în mâna dominantă (cea cu care scrieți) cu degetul mare aproape de capacul galben.
 - Scoateți capacul galben cu cealaltă mână.
 - Așezați vârful negru al injectorului pe partea exterioară a coapsei, ținând injectorul într-un unghi drept (90°) față de coapsă.
 - Jext a fost conceput pentru a fi injectat prin haine, dar încercați să evitați fermoarele și nasturii.
 - Împingeți ferm vârful negru în coapsa exterioară până când auziți un „click” care confirmă că injecția a început, apoi țineți-l împins înăuntru. Țineți injectorul ferm pe coapsă timp de 10 secunde (numărați lent până la 10), apoi scoateți-l. Vârful negru se va extinde automat și va ascunde acul.
 - Masați zona de injectare timp de 10 secunde.
 - Solicitați imediat ajutor medical. Formați 112, solicitați ambulanța, anunțați anafilaxia chiar dacă simptomele par să se amelioreze. Pacienții conștienți ar trebui să continue să stea întinși cu picioarele ridicate sau în picioare dacă au dificultăți de respirație. Pacienții inconștienți trebuie să rămână în poziția de recuperare.
 - Dacă este posibil, cereți ca cineva să stea cu dumneavoastră până la sosirea ambulanței în cazul în care vă simțiți din nou rău.
 - Puteți utiliza Jext o singură dată. Din acest motiv, se recomandă ca pacienților să li se prescrie două stilouri injectoare Jext pe care trebuie să le poarte mereu asupra lor.
 - Dacă nu vă simțiți mai bine sau dacă începeți să vă simțiți mai rău, o a doua injecție cu Jext poate fi administrată la 5-15 minute după prima injecție, urmând aceiași pași ca și pentru prima injecție.
 - Când sosește ambulanța, informați profesionistul din domeniul sănătății că ați primit una sau două injecții de adrenalină și predați stiloul Jext folosit unui paramedic sau departamentului de urgență.
 - După utilizare, ar trebui să vedeți în fereastra de inspecție de pe etichetă o tijă de plastic colorată, (albă la Jext 300 micrograme și albastră la Jext 150 micrograme). Aceasta confirmă că Jext s-a activat și soluția de adrenalină a fost injectată.

Ești pregătit pentru administrarea Jext?

La fel ca toate auto-injectoarele cu adrenalină, Jext este un dispozitiv care salvează vieți și, prin urmare, este important să îl păstrați în siguranță. Se recomandă ca membrii familiei dumneavoastră, îngrijitorii sau profesorii să fie, de asemenea, instruiți cu privire la utilizarea corectă a Jext.

Depozitare...

1. Păstrați întotdeauna Jext în cutia de transport rigidă în care a fost furnizat, depozitați-l la o temperatură sub 25° și nu lăsați niciodată să înghețe.
2. Verificați regulat soluția de adrenalină. Puteți face acest lucru uitându-vă prin fereastra de „vizionare” din mijlocul etichetei medicamentului Jext. Soluția de adrenalină trebuie să fie limpede și incoloră; dacă nu este, înlocuiți Jext cât mai curând posibil.
3. Țineți cont de data de expirare a medicamentului. Fiecare stilou injector Jext are o dată de expirare imprimată pe etichetă. Asigurați-vă să comandați un înlocuitor înainte de a expira - Compania care produce medicamentul Jext face acest lucru ușor cu un serviciu gratuit de alertă de expirare.

Purtați întotdeauna două stilouri injectoare Jext!

Dacă nu vă simțiți mai bine după prima injecție sau dacă începeți să vă simțiți mai rău, o a doua injecție cu un Jext suplimentar poate fi administrată la 5-15 minute după prima injecție. Din acest motiv, ar trebui să purtați cu tine două stilouri Jext în orice moment.

Jext Trainer (Stilou de instruire)

Puteți folosi Jext Trainer pentru a vă învăța cum să utilizați Jext. Jext Trainer este la fel ca stiloul Jext-ul adevărat, cu excepția a trei lucruri: nu conține adrenalină; nu are ac și poate fi folosit în mod repetat în scop de instruire.

Și amintiți-vă... este important să vă mențineți cunoștințele la zi, vă rugăm să consultați acest videoclip la intervale regulate de timp pentru a vă asigura că sunteți întotdeauna pregătit pentru administrarea Jext

Pentru mai multe informații: vizitați www.jext.com

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nementionate în prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct

prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 - București

Fax: +4 0213 163 497

tel: + 4 021 317 11 02

e-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact: alkpv.ro@biomapas.com