

**Olumiant 1 mg – comprimate filmate**

**Olumiant 2 mg – comprimate filmate**

**Olumiant 4 mg – comprimate filmate**

**(baricitinib)**

**Ghidul profesioniștilor din domeniul sănătății  
pentru indicația dermatită atopică și alopecie  
areata**

**Acest material educațional conține informații importante pentru discuția inițială cu pacienții dumneavoastră atunci când le prescrieți medicamentul Olumiant. Acesta trebuie citit împreună cu Rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), atașat.**

Medicamentul Olumiant (baricitinib) este un inhibitor selectiv și reversibil al kinazei Janus (JAK1 și JAK2) indicat pentru tratamentul dermatitei atopice (DA) moderate până la severe la pacienții adulți, copii și adolescenți în vârstă de 2 ani și peste care sunt candidați pentru terapie sistemică și pentru tratamentul alopeciei areata (AA) severe la pacienții adulți și adolescenți cu vârsta de 12 ani și mai puțin de 18 ani.

În cadrul discuției inițiale cu pacienții dumneavoastră, vă rugăm să:

- Oferiți un **Card de avertizare al pacientului** fiecărui pacient.
- Recomandați pacienților să citească Cardul de avertizare împreună cu **Prospectul cu informații pentru pacient**.

#### **Adulți:**

Doza recomandată de baricitinib este de 4 mg o dată pe zi.

O doză de 2 mg o dată pe zi este recomandată pacienților:

- cu risc mai mare de tromboembolism venos, evenimente adverse cardiovasculare majore (MACE) și afecțiuni maligne,
- în vârstă de 65 de ani și peste și
- cu istoric de infecții cronice sau recurente.

O doză de 4 mg o dată pe zi poate fi luată în considerare pentru pacienții care nu au obținut un control adecvat al activității bolii cu doza de 2 mg o dată pe zi.

O doză de 2 mg o dată pe zi trebuie luată în considerare pentru pacienții care au obținut un control susținut al activității bolii cu 4 mg o dată pe zi și care sunt eligibili pentru reducerea dozei.

Copii și adolescenți (cu vârsta de 2 ani și peste):

Doza recomandată de baricitinib este de 4 mg o dată pe

#### **Evenimente adverse cardiovasculare majore (MACE)**

Există un risc potențial crescut de MACE la pacienții cu anumiți factori de risc care utilizează tratamentul cu inhibitori JAK, inclusiv Olumiant.

**Astfel, Olumiant trebuie utilizat numai dacă nu sunt disponibile alternative de tratament adecvate, la pacienți:**

- cu vârsta de 65 de ani și peste,
- care sunt fumători actuali sau cu un istoric îndelungat de fumători și
- cu alți factori de risc cardiovascular.

#### **Limfom și alte afecțiuni maligne**

Au fost raportate limfom și alte afecțiuni maligne la pacienții cărora li s-a administrat inhibitori JAK, inclusiv Olumiant.

**Astfel, Olumiant trebuie utilizat numai dacă nu sunt disponibile alternative de tratament adecvate, la pacienți:**

- cu vârsta de peste 65 de ani,
- care sunt fumători actuali sau cu un istoric îndelungat de fumători sau
- cu factori de risc pentru afecțiuni maligne (de exemplu, afecțiuni maligne actuale sau antecedente de afecțiuni maligne).

#### **Sarcina**

Olumiant este contraindicat în sarcină, deoarece datele preclinice au arătat o creștere redusă a fătului și malformații.

zi pentru pacienții cu greutatea de 30 kg sau mai mult. Pentru pacienții cu greutatea cuprinsă între 10 kg și mai puțin de 30 kg, doza recomandată este de 2 mg o dată pe zi. O reducere la jumătate a dozei trebuie luată în considerare pentru pacienții care au obținut un control susținut al activității bolii cu doza recomandată și sunt eligibili pentru reducerea dozei. Vezi Rezumatul caracteristicilor produsului Olumiant, pentru recomandări specifice de dozaj pentru pacienții copii și adolescenți.

### Infecții

Medicamentul Olumiant crește riscul de infecții.

Sfătuiți pacienții să solicite imediat asistență medicală în cazul apariției unor simptome care indică o infecție.

### Deoarece vârstnicii și pacienții cu diabet prezintă, în general, o incidență mai mare a infecțiilor:

- Se recomandă **prudență** la tratarea pacienților vârstnici și a celor cu diabet.
- Olumiant trebuie utilizat la pacienții cu vârsta de 65 de ani și peste numai dacă nu sunt disponibile alternative de tratament adecvate.

### Sfătuiți pacienții:

- Să întrerupă temporar administrarea medicamentului Olumiant în cazul infecției cu herpes zoster sau în cazul oricărei alte infecții care nu răspunde la terapia standard și să nu reia tratamentul cu medicamentul Olumiant până la vindecarea infecției.
- Să nu li se administreze vaccinuri vii sau atenuate în timpul sau imediat înaintea tratamentului cu medicamentul Olumiant.

Testați pacienții pentru a elimina posibilitatea existenței tuberculozei (TB) și a hepatitei virale active înaintea inițierii tratamentului cu medicamentul Olumiant.

Înainte de începerea tratamentului, este important ca toți pacienții și, în mod special, copiii și adolescenții, să fi fost integral imunizați conform ghidurilor de imunizare curente.

### Modificări ale parametrilor lipidici

Utilizarea Olumiant este asociată cu hiperlipidemie.

### Prin urmare,

- medicii trebuie să **sfătuiască** femeile aflate la vârsta fertilă să utilizeze contracepție în timpul tratamentului și timp de o săptămână după terminarea acestuia.
- Tratamentul cu Olumiant trebuie oprit dacă se ia în considerare o sarcină planificată.

### Apel la raportarea reacțiilor adverse

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului Olumiant (baricitinib), către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România ([www.anm.ro](http://www.anm.ro)), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1 București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

E-mail:

[adr@anm.ro](mailto:adr@anm.ro)

Raportare online:

<https://adr.anm.ro/>

Website:

[www.anm.ro](http://www.anm.ro)

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

### Eli Lilly România S.R.L

Str. Meneștilor 12, Clădirea D, Et.2, Sector 1

013713 București, România

tel: +4 021 402 30 00

Medicii care prescriu Olumiant trebuie să monitorizeze parametrii lipidici ai pacientului și să gestioneze hiperlipidemia, dacă este detectată.

#### **Tromboembolism venos**

Reacții ca tromboza venoasă profundă (TEV) și embolismul pulmonar (EP) au fost observate la pacienți cărora li s-a administrat Olumiant. Olumiant trebuie administrat cu precauție la pacienții cu factori de risc pentru TEV/EP, alții decât factorii de risc cardiovascular sau factorii de risc pentru afecțiuni maligne.

Pacienții trebuie instruiți să solicite imediat asistență medicală dacă apar semne sau simptome de tromboză venoasă profundă/embolism pulmonar