

Cardul pacientului – Față (când este pliat)

REBLOZYL (luspatercept)

Cardul pacientului

(Pentru femeile aflate la vârsta fertilă)

Cardul pacientului – Interior (când este defășurat)

Informații pentru paciente

Versiune aprobată de ANMDMR în septembrie 2025

Pagina 1 din 4

REBLOZYL (luspatercept) nu trebuie utilizat în timpul sarcinii și timp de 3 luni înainte de a rămâne gravidă. REBLOZYL poate dăuna copilului nenăscut.

Nu utilizați REBLOZYL dacă sunteți gravidă sau alăptați, sau dacă puteți rămâne gravidă și nu utilizați cel puțin o metodă de contracepție extrem de eficace.

- Înainte de a începe tratamentul cu REBLOZYL:
 1. Trebuie să aveți un test de sarcină negativ verificat de către medicul dumneavoastră prescriptor.
 2. Trebuie să discutați cu medicul dumneavoastră referitor la metodele de contracepție eficace și să folosiți cel puțin o metodă de contracepție extrem de eficace în timp ce luați REBLOZYL și timp de cel puțin 3 luni după întreruperea tratamentului cu REBLOZYL.
- Testul de sarcină trebuie repetat la intervale adecvate.
- Spuneți imediat medicului dumneavoastră dacă sunteți gravidă sau credeți că ați putea fi gravidă în timpul tratamentului cu REBLOZYL sau timp de 3 luni după întreruperea tratamentului cu REBLOZYL.

Pentru informațiile de contact ale medicului dumneavoastră prescriptor, vă rugăm să consultați partea din spate a acestui card de atenționare.

Pentru mai multe informații despre efectele și reacțiile adverse ale REBLOZYL, vă rugăm să consultați prospectul medicamentului REBLOZYL.

Cardul pacientului – Spate (când este pliat)

Mi s-a prescris REBLOZYL

Informații importante de contact

Medicul care a prescris REBLOZYL:

Nume: _____

Număr de telefon cabinet: _____

Adresa instituției: _____

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Dacă manifestați orice reacții adverse, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului. Acestea includ orice reacții adverse nemenționate în acest prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare:

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

011478 – București

Fax: +4 0213 163 497

Tel: +4 021 317 11 02

e-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

Departamentul de Informații Medicale al **Bristol Myers Squibb**:

Telefon: +4 021 272 16 19

E-mail: medinfo.romania@bms.com

Acest material de reducere la minimum a riscului îndeplinește condițiile autorizației de punere pe piață și a fost aprobat de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.