

SOLIRIS (eculizumab)– CARDUL PACIENTULUI

Informații importante privind siguranța pentru pacienții tratați cu SOLIRIS (eculizumab)

Medicamentul Soliris poate reduce capacitatea sistemului imunitar de a lupta împotriva infecțiilor, în special împotriva infecțiilor meningococice, care necesită asistență medicală imediată.

În cazul în care prezentați oricare dintre următoarele simptome, trebuie să **contactați imediat medicul curant sau să solicitați asistență medicală imediată, preferabil într-o unitate de primiri urgente majore:**

- dureri de cap cu greață sau vărsături
- dureri de cap cu gât sau spate înțepenit
- febră
- erupție trecătoare pe piele
- confuzie
- dureri musculare severe combinate cu simptome similare gripei (flu-like)
- sensibilitate la lumină

Solicitați de urgență asistență medicală dacă aveți oricare dintre aceste semne și simptome și prezentați acest card.

Păstrați acest card cu dumneavoastră în permanență în timpul tratamentului și timp de 3 luni după ultima doză de SOLIRIS. Riscul de apariție a infecției meningococice se poate menține câteva săptămâni după administrarea ultimei doze de medicament SOLIRIS.

Informații pentru profesioniștii din domeniul sănătății

- Acest pacient este în tratament cu medicamentul SOLIRIS (eculizumab), care crește susceptibilitatea pentru infecții meningococice (*Neisseria meningitidis*) sau pentru alte infecții generale.
- Toți pacienții trebuie să fie vaccinați cu cel puțin 2 săptămâni înainte de a începe tratamentul cu SOLIRIS. Pacienții care inițiază SOLIRIS la mai puțin de 2 săptămâni după ce au primit vaccinul meningococic trebuie să primească antibiotice profilactice adecvate până la 2 săptămâni după vaccinare.
- Pacienții trebuie vaccinați și revaccinați în conformitate cu ghidurile naționale actuale privind vaccinările.
- Infecțiile meningococice pot evolua rapid și pot pune în pericol viața sau pot evolua cu deces dacă nu sunt recunoscute și tratate la timp.
- **Evaluați imediat dacă se suspectează o infecție și administrați tratament adecvat cu antibiotice dacă este necesar.**
- Luați legătura cu medicul curant (datele de contact sunt prezentate mai jos) cât mai curând posibil.

Pentru mai multe informații despre medicamentul Soliris, vă rugăm să consultați Prospectul SOLIRIS sau să trimiteți un e-mail la adresa: medinfo-romania@astrazeneca.com

În cazul în care aveți întrebări privind siguranța medicamentului, vă rugăm să sunați la +4073 011 11 13

Numele pacientului _____

Numele spitalului unde este tratat pacientul _____

Numele medicului curant _____

Numărul de telefon al medicului curant _____

Data vaccinării: _____

Data inițierii tratamentului cu SOLIRIS:

Informații despre vaccinarea meningococică:

Denumirea vaccinului	Serogrupul vaccinului	Numărul de doze	Data	Prima administrare/ Doza de rapel	Profilaxia antibiotică primită dacă Soliris este inițiat la mai puțin de 2 săptămâni după administrarea vaccinului
					☐ Nu se aplică ☐ Da, data de administrare: _____
					☐ Nu se aplică ☐ Da, data de administrare: _____
					☐ Nu se aplică ☐ Da, data de administrare: _____