

Tabel cu programări

Vă rugăm să utilizați acest tabel pentru a înregistra datele programărilor la medic:

Numele medicului:

Număr de telefon:

Note:

Data programării	Contraceptiv utilizat	Rezultatul testului de sarcină	Semnătura medicului
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	
		<input type="checkbox"/> Pozitiv <input type="checkbox"/> Negativ Data:	

Card de reamintire pentru paciente Sotret ▼

▼ Acest medicament face obiectul unei monitorizări suplimentare. Acest lucru va permite identificarea rapidă de noi informații referitoare la siguranță. Adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului dacă manifestați orice reacție adversă asociată cu administrarea medicamentului Sotret, inclusiv reacții adverse nemenționate în prospect. De asemenea, puteți raporta reacțiile adverse direct prin intermediul sistemului național de raportare către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale. Informații despre modul de raportare a reacțiilor adverse sunt disponibile pe site-ul www.anm.ro la Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Versiune aprobată ANMDM – sept. 2018

Medicamentul Sotret nu trebuie administrat în timpul sarcinii.

Medicamentul Sotret poate afecta grav fătul dacă este administrat unei femei gravide.

Dacă rămâneți gravidă sau suspectați că ați rămas gravidă, întrerupeți imediat administrarea medicamentului Sotret și contactați medicul

Citiți cu atenție prospectul înainte de începerea tratamentului.

Dacă aveți întrebări sau îngrijorări cu privire la administrarea medicamentului Sotret, adresați-vă medicului dumneavoastră sau farmacistului.

Ce trebuie să faceți dacă este posibil să rămâneți gravidă:

- ! Trebuie să utilizați cel puțin 1 metodă contraceptivă cu eficacitate ridicată (cum ar fi un dispozitiv intrauterin sau un implant contraceptiv) sau să utilizați corect 2 metode eficiente de contracepție cu acțiune diferită (de exemplu, un contraceptiv oral împreună cu un prezervativ) înaintea, pe durata și timp de 1 lună după întreruperea tratamentului.**

Nu trebuie să rămâneți gravidă în timpul tratamentului cu medicamentul Sotret sau timp de 1 lună după întreruperea tratamentului.

- ! Trebuie să vă prezentați în mod regulat la consultații de urmărire și să efectuați periodic teste de sarcină:**
 - Înainte de a începe tratamentul, trebuie să efectuați un test de sarcină al cărui rezultat trebuie să fie negativ.
 - Pentru a vă asigura că nu ați rămas gravidă în timpul tratamentului, trebuie să efectuați regulat teste de sarcină, ideal în fiecare lună. Trebuie să efectuați, de asemenea, un test de sarcină final la 1 lună

după întreruperea tratamentului

Atenționare pentru pacienții de sex feminin și masculin

Acest medicament a fost prescris numai pentru dumneavoastră; **nu trebuie să îl utilizați în comun cu alte persoane, iar capsulele neutilizate trebuie returnate la farmacie.**

Card de reamintire pentru paciente

Numele medicului:

Număr de telefon:

Notă: