

**LISTĂ DE VERIFICARE pentru prescrierea EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme
(adrenalină)**

Nume / Prenume

Data Nașterii

Data

1. Ați diagnosticat pacientul ca prezentând risc sau istoric de reacții anafilactice?

DA

2. Pacientul știe când să își administreze adrenalina?

DA și utilizează deja EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme

➤ Continuați cu **PASUL 3**

DA, dar nu utilizează EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme

➤ Continuați cu **PASUL 2**

NU

➤ Continuați cu **PASUL 1**

PASUL 1: I-ați explicat pacientului cum să se comporte în cazul în care intră în contact cu alergeni și când să își administreze adrenalina?

DA

➤ Continuați cu **Pasul 2**

PASUL 2: I-ați prezentat pacientului EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme și ați demonstrat etapele precise de utilizare a EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme, utilizând dispozitivul EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme pentru învățare și prezentând videoclipul "Cum să utilizați EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme" ? (Citiți datele de pe verso pentru mai multe informații)

DA

➤ Continuați cu **Pasul 3**

PASUL 3: I-ați cerut pacientului să vă arate cum utilizează dispozitivul EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme, folosind dispozitivul EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme de învățare?

DA

3. I-ați recomandat pacientului să repete cu regularitate auto-instruirea și instruirea tuturor persoanelor apropiate?

DA

4. I-ați recomandat pacientului să dețină în permanență 2 stilouri EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme, pentru cazul în care simptomele nu se îmbunătățesc și este nevoie de o a doua doză?

DA


5. V-ați sfătuit pacientul să-și seteze o atenționare pentru data de expirare a EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme, pentru a-și reînnoi medicamentul la timp?

DA


EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme


Cum să UTILIZAȚI EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme


Scoateți EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme din cutia de transport. Întindeți-vă cu picioarele ușor ridicate, pentru a menține circulația sângelui, sau stați în picioare, dacă respirația este dificilă.


- 

1. Luați **EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme** în mână (cea cu care scrieți) cu degetul mare aproape de capacul albastru, închideți pumnul în jurul stiloului **EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme** și scoateți capacul de siguranță albastru.

Rețineți: “Albastru spre cer, portocaliu spre coapsă”.
- 

2. Țineți **EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme** la o distanță de aproximativ 10cm de partea exterioară a coapsei. Vârful portocaliu trebuie să fie către partea exterioară a coapsei.
- 

3. Înfingeți ferm **EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme** în partea exterioară a coapsei, la un unghi drept (90 de grade). Țineți ferm în coapsă timp de 3 secunde.
- 

4. **EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme** trebuie aruncat și eliminat în condiții de siguranță. Capacul portocaliu al acului se va extinde pentru a acoperi acul.
- 

5. Sunați la 112, chemați ambulanța și anunțați ”șoc anafilactic”.

Fiecare **EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme** poate fi utilizat o singură dată. Dacă simptomele nu se ameliorează, se poate administra un al doilea **EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme** după 5-15 minute.

Cum să PĂSTRAȚI EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme

- A nu se păstra EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme la temperaturi de peste 25 °C. A nu se păstra la frigider. A nu se congela.
- A se păstra în ambalajul original pentru a fi protejat de lumină. Atunci când este expusă la aer sau lumină, adrenalina se degradează rapid și soluția devine roz sau maro.
- Vă rugăm să vă amintiți să verificați periodic conținutul cartușului de sticlă al stiloului injector EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme pentru a vă asigura că lichidul este încă limpede și incolor.
- Înlocuiți stiloul injector EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme la data de expirare sau mai devreme, dacă soluția are culoarea modificată sau conține un precipitat.

Apel la raportarea reacțiilor adverse

Este important să raportați orice reacție adversă suspectată, asociată cu administrarea medicamentului EpiPen 150 micrograme / EpiPen 300 micrograme , către Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, în conformitate cu sistemul național de raportare spontană, utilizând formularele de raportare disponibile pe pagina web a Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România (www.anm.ro), la secțiunea Medicamente de uz uman/Raportează o reacție adversă.

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România

Str. Aviator Sănătescu nr. 48, sector 1

București 011478- RO

Tel: + 4 0757 117 259

Fax: +4 0213 163 497

E-mail: adr@anm.ro

Raportare online: <https://adr.anm.ro/>

Website: www.anm.ro

Totodată, reacțiile adverse suspectate se pot raporta și către reprezentanța locală a deținătorului autorizației de punere pe piață, la următoarele date de contact:

BGP Products SRL

Reprezentanța România

Cladirea Equilibrium 1, Strada Gara Herăstrău nr.2, etaj 3

020334, Sector 2, București,

Telefon: 0372.579.004; Fax: 0371.600.328;

e-mail: pv.romania@viatris.com