

CARDUL PACIENTULUI

Acest card este destinat exclusiv pacienților în tratament cu medicamentul ZypAdhera.

Versiune aprobată de ANMDMR în martie 2024

**ÎN CAZ DE URGENȚĂ,
VĂ RUGĂM CONTACTAȚI:**

Medicul care v-a prescris ZypAdhera
(numele, numele cabinetului/spitalului,
număr de telefon):

Nume: _____

Număr de telefon: _____

Nume: _____

Număr de telefon: _____

INDICAȚIE TERAPEUTICĂ

Tratament de întreținere la pacienții adulți cu schizofrenie care au fost stabilizați suficient în timpul tratamentului fazei acute cu olanzapină administrată oral.

ORI DE CÂTE ORI VIZITAȚI UN MEDIC SAU ALT PROFESIONIST DIN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII (INCLUSIV ÎN CAZ DE ACCIDENT SAU LA CAM ERA DE GARDĂ), REVIZUIȚI ȘI ACTUALIZAȚI ACEASTĂ LISTĂ DE MEDICAMENTE ÎMPREUNĂ CU MEDICUL.

Medicamente prescrise

Data: _____

| Denumirea medicamentului | Doză (mg, unități, pufuri, picături) | Când luați medicamentul? De câte ori pe zi? Dimineața și seara? După mese? | Data Inițiere / Întrerupere | Scop În ce scop luați acest medicament? |
|---------------------------------|---|---|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Ca toate medicamentele, ZypAdhera poate provoca reacții adverse, cu toate că nu apar la toate persoanele.

Reacții adverse frecvente care afectează 1 până la 10 utilizatori din 100:

- ZypAdhera poate uneori pătrunde prea repede în fluxul sanguin și poate determina următoarele simptome: somnolență excesivă, amețeli, confuzie, dezorientare, dificultăți de vorbire, dificultăți de mers, rigiditate sau tremurături musculare, stare de slăbiciune, iritabilitate, agresivitate, anxietate, creșterea tensiunii arteriale sau convulsii și uneori, poate duce la pierderea conștienței
- Mișcări neobișnuite în special la nivelul feței sau limbii
- Somnolență
- Durere la locul injectării.

Reacțiile adverse prezentate mai jos au fost observate la administrarea orală a olanzapinei, dar pot apărea și după administrarea ZypAdhera.

Reacții adverse foarte frecvente: afectează 1 utilizator din 10:

- Creștere în greutate
- Somnolență
- Creșteri ale concentrației prolactinei din sânge. La începutul tratamentului, unele persoane pot simți senzație de amețeală sau leșin (cu răirea băților inimii), în special atunci când se ridică în picioare din poziția șezândă sau culcată. Acest lucru trece, de obicei, de la sine, dar dacă nu dispăre, spuneți-i medicului dumneavoastră.

Reacții adverse frecvente: afectează 1 până la 10 utilizatori din 100:

- Modificări ale numărului unor celule din sânge și ale cantității de grăsimi din circulație, iar la începutul tratamentului creșterea temporară a enzimelor hepatice
- Creșterea concentrației zahărului din sânge și urină
- Creșterea nivelului de acid uric și creatinfosfokinază din sânge
- Senzație mai accentuată de foame
- Amețeli
- Neliniște
- Tremor
- Mișcări neobișnuite (în special la nivelul feței sau limbii)
- Constipație
- Uscăciunea gurii
- Erupții trecătoare pe piele
- Pierderea forței
- Oboseală extremă
- Retenție de apă ce duce la umflarea mâinilor, încheieturilor și picioarelor
- Febră
- Dureri articulare
- Tulburări sexuale, cum ar fi scăderea libidoului la bărbați și femei sau disfuncție erectilă la bărbați

Dacă vreuna dintre reacțiile adverse devine gravă sau dacă observați orice reacție adversă nementionată în prospect, vă rugăm să spuneți medicului dumneavoastră.

Informații complete despre ZypAdhera puteți găsi în prospectul medicamentului.

DATE DE IDENTIFICARE

Nume: _____

Adresă _____

Telefon _____

Informații ale persoanei de contact în caz de
urgență:

ZypAdhera

| Doză (mg) | Cât de des vă faceți injecțiile? | Data ultimei injecții | Ora ultimei injecții |
|-----------|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Pentru informații importante referitoare la siguranță consultați secțiunea următoare și prospectul medicamentului.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU PACIENȚI

ZypAdhera poate uneori pătrunde prea repede în fluxul sanguin, determinând **sindromul post-injectare** care se manifestă prin următoarele **simptome**: somnolență excesivă, amețeli, confuzie, dezorientare, dificultăți de vorbire, dificultăți de mers, rigiditate sau tremurături musculare, stare de slăbiciune, iritabilitate, agresivitate, anxietate, creșterea tensiunii arteriale sau convulsii și poate duce la pierderea conștienței.

Din acest motiv:

- La fiecare administrare a injecției, trebuie să fiți ținut(ă) sub observație timp de **cel puțin 3 ore** în unitatea de asistență medicală pentru a se depista eventuala apariție a simptomelor.

- Medicul sau asistenta medicală trebuie să se asigure că nu prezentați niciunul din aceste simptome înainte de a pleca.
- Deși puțin probabil, ați putea resimți aceste simptome după mai mult de 3 ore de la administrarea injecției. Dacă acest lucru se întâmplă, **luați legătura imediat cu medicul dumneavoastră** sau cu asistenta.
- Din cauza acestui risc, nu conduceți vehicule și nu folosiți utilaje pe parcursul întregii zile după administrarea injecției.

Cât timp sunteți în cabinetul doctorului nu ezitați să anunțați medicul dacă:

- Simțiți somnolență accentuată
- Vă simțiți amețit(ă)

- Vă simțiți confuz(ă) și dezorientat(ă)
- Simțiți iritabilitate sau agresivitate
- Simțiți anxietate
- Aveți dificultăți de vorbire sau de mers
- Vă simțiți slăbit(ă)
- Aveți rigiditate sau tremurături musculare

Personalul medical trebuie să se asigure că sunteți în stare de veghe și fără simptome, înainte de a părăsi cabinetul, și trebuie să vă explice cum să procedați dacă simptomele apar după ce plecați.

Informații suplimentare despre medicamentul ZypAdhera puteți găsi în prospect.