

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	Roche România SRL	Atezolizumab	În asociere cu bevacizumab, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu carcinom hepatocelular avansat sau nerezecabil (HCC) cărora nu le-a fost administrat anterior tratament sistemic	Conditionat	269	28.02.2022
2	Merck Europe B.V. - Olanda	Avelumab	ca monoterapie pentru tratamentul de primă linie al pacienților adulți cu carcinom urotelial (CU) avansat local sau metastatic care nu manifestă progresie după chimioterapia pe bază de platină	Conditionat	261	28.02.2022
3	AstraZeneca AB	Olaparib	indicat în monoterapie la pacienți adulți cu cancer de prostată rezistent la castrare în stadiu metastatic și mutație BRCA1/2 (germinală și/sau somatică), care prezintă progresie după tratamentul anterior care a inclus un agent hormonal nou	Neconditionat	262	28.02.2022
4	Elli Lilly România SRL	Baricitinib	pentru tratamentul dermatitei atopice moderate până la severe la pacienți adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică	Conditionat	165	04.02.2022

5	Novartis Europharm Limited, Irlanda reprezentat de Novartis Pharma Services România SRL	Canakinumabum	Ilaris este indicat pentru tratamentul sindroamelor febrile autoinflamatorii periodice, la adulți, adolescenți și copii cu vârsta de 2 ani și peste această vârstă: Sindrom periodic asociat cu receptorul factorului de necroză tumorală (TRAPS): Ilaris este indicat pentru tratamentul sindromului periodic asociat cu receptorul factorului de necroză tumorală (TNF) (TRAPS). Sindromul hiperimmunoglobulinemiei D (HIDS)/deficitului de mevalonat kinază (MKD): Ilaris este indicat pentru tratamentul sindromului hiperimmunoglobulinemiei D (HIDS)/deficitului de mevalonat kinază (MKD). Febră familială mediteraneană (FMF) Ilaris este indicat pentru tratamentul febrei familiale mediteraneene (FMF): Ilaris trebuie administrat în asociere cu colchicina, dacă este cazul	Neincludere	245	24.02.2022
6	Johnson & Johnson România SRL	Apalutamida	tratamentul cancerului de prostată metastazat sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer) la bărbați adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy	Neconditionat	203	14.02.2022
7	SC. KRKA România SRL	Naproxen	Tratamentul simptomatic al: • poliartritei reumatoide, artrozei (artrită degenerativă), spondilitei anchilozante, artritei idopatice juvenile • tulburărilor musculoscheletice acute (cum sunt entorsele și întinderile musculare, traumatismele directe, durerea lombosacrată, tenosinovita și bursita) • gutei acute • dismenoreei • durerii acute postoperatorii și tumefacțiilor (de exemplu după intervenții chirurgicale, extracții dentare) și pentru	Mutare	250	25.02.2022
8	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Irlanda	Lanadelumab	indicat pentru prevenirea de rutină a episoadelor recurente de angioedem ereditar (AEE) la pacienții cu vârsta de peste 12 ani	Neconditionat	200	11.02.2022

9	CNAS	Cabazitaxel	În asociere cu prednison sau prednisolon, pentru tratamentul pacienților cu cancer de prostată metastazat hormono-rezistent, tratați anterior după o schemă de tratament conținând docetaxel	Necondiționat	163	03.02.2022
---	------	-------------	--	---------------	-----	------------