

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	Eli Lilly Nederland B.V.Olanda	Ramucirumabum	în combinație cu erlotinib este indicat ca primă linie de tratament a pacienților adulți cu cancer pulmonar fără celule mici care prezintă mutații activatoare ale receptorului factorului de creștere epidermal (EGFR)	Neconditionat	154	31.01.2022
2	AstraZeneca AB	Dapagliflozinum	indicat pentru tratamentul pacienților adulți simptomatici cu insuficiență cardiacă cronică cu fracție de ejection redusă, în asociere cu un inhibitor al enzimei de conversie a angiotensinei (IECA) sau un inhibitor al receptorilor angiotensinei și neprilizinei (ARNI) și un betablocaț și/sau un antagonist al receptorilor mineralocorticoizi (MRA)	Neincludere	145	27.01.2022
3	Novartis Europharm LTD, Irlanda reprezentat de Novartis Pharma Romania SRL	Secukinumab	pentru tratamentul psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la copii și adolescenți, începând cu vârstă de 6 ani, care sunt candidați pentru terapie sistemică	Actualizare protocol terapeutic	31	06.01.2022
4	AOP Orphan Pharmaceuticals AG, Austria	Ropeginterferon Alfa-2B	este indicat pentru tratamentul în monoterapie al policitemiei vera fără splenomegalie simptomatică, la adulți	Neconditionat	158	31.01.2022
5	Novartis Europharm LTD, Irlanda reprezentat de Novartis Pharma Romania SRL	Secukinumab	psoriazisului în plăci, moderat până la sever, la adulți care sunt candidați pentru terapie sistemică, în monoterapie sau în combinație cu metotrexat (MTX), este indicat în tratamentul artritei psoriazice active la pacienții adulți atunci când răspunsul la terapia anterioară cu medicamente antireumaticice modificatoare ale bolii (MARMB), a fost inadecvat și în tratamentul spondiloartritei axiale-spondilitei anchilozante active la adulții care nu au răspuns corespunzător la terapia convențională	Actualizare protocol terapeutic	153	31.01.2022

6	Ipsen Pharma România SRL	Cabozantinib	este indicat ca monoterapie pentru carcinomul cu celule renale (CCR) în stadiu avansat ca tratament de primă linie la pacienții adulți nef tratați anterior, cu risc intermediar sau crescut/nefavorabil	Conditionat	65	11.01.2022
7	Amgen Europe BV	Carfilzomib	administrat în asociere cu daratumumab și cu dexametazonă, cu lenalidomidă și cu dexametazonă sau numai cu dexametazonă este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu la care s-a administrat cel puțin o terapie anterioară	Actualizare protocol terapeutic	155	31.01.2022
8	Roche Registration GmbH reprezentat prin Roche Romania SRL	Emicizumab	Tratament profilactic de rutină pentru prevenirea săngerărilor sau reducerea frecvenței episoadeelor de săngerare la pacienții cu hemofilia A severă (deficiență congenitală de factor VIII, FVIII < 1%) care nu prezintă inhibitori de factor VIII	Actualizare protocol terapeutic	125	25.01.2022
9	Bristol-Myers Squibb Marketing Services S.R.L.	Fedratinib	tratamentul splenomegaliei sau al simptomelor asociate bolii la pacienții adulți cu mielofibroză primară, mielofibroză post-policitemie vera sau mielofibroză post-trombocitemie esențială care nu au fost expuși anterior la inhibitori ai familiei Janus kinazelor (JAK) sau care au fost tratați cu ruxolitinib	Conditionat	105	20.01.2022
10	Shire Pharmaceuticals Ireland Limited, Irlanda	Lanadelumab	indicat pentru prevenirea de rutină a episoadeelor recurente de angioedem ereditar (AEE) la pacienții cu vîrstă de peste 12 ani	Neconditionat	899	14.07.2021
11	Astellas Pharma Europe B.V. Olanda	Enzalutamida	indicat pentru tratamentul bărbaților adulți cu CPRC în stadiu metastatic cu simptomatologie absentă sau ușoară, după eșecul terapiei de deprivare androgenică, la care chimioterapia nu este încă indicată din punct de vedere clinic	Neconditionat	72	12.01.2022