

Nr C	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	Novartis Pharma	CERITINIBUM	În monoterapie este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu cancer pulmonar cu celule non-mici, în stadiu avansat (NSCLC), pozitiv pentru kinaza limfomului anaplazic (ALK), tratați anterior cu crizotinib.	NECONDITIONAT	841	7/9/2019
2	Roche Registration GMBH - Germania	OBINUTUZUMABUM	Administrat în asociere cu chimioterapie, urmat de tratament de întreținere cu Gazyvaro la pacienții care obțin un răspuns la tratament, este indicat pentru tratamentul pacienților cu limfom folicular în formă avansată, netratați anterior.	NECONDITIONAT	875	7/17/2019
3	Celgene Europe	POMALIDOMIDUM	În asociere cu dexametazona, pentru tratamentul pacienților adulți cu mielom multiplu recidivat și refractar, cărora li s-au administrat cel puțin două scheme de tratament anterioare, incluzând lenalidomidă și bortezomib, și care au prezentat progresia bolii la ultimul tratament.	NECONDITIONAT	121	7/31/2019
4	Janssen-Cilag International NV, Belgia	IBRUTINIBUM	În asociere cu bendamustină și rituximab (BR) în tratamentul pacienților adulți cu LLC cărora li s-a administrat cel puțin o terapie anterioară.	NECONDITIONAT	104	7/26/2019
5	Roche Registration GMBH	ALECTINIB	CA MONOTERAPIE PENTRU TRATAMENTUL DE PRIMA LINIE AL PACIENȚILOR ADULȚI CU CANCER PULMONAR FĂRĂ CELULE MICI (NSCLC) AVANSAT, CU STATUS POZITIV PENTRU KINAZA DIN LIMFOMUL ANAPLAZIC (ALK)	CONDITIONAT	873	7/17/2019
6	Roche Registration GMBH	ALECTINIB	CA MONOTERAPIE PENTRU TRATAMENTUL PACIENȚILOR ADULȚI CU NSCLC AVANSAT, CU STATUS POZITIV ALK, TRATAȚI ANTERIOR CU CRIZOTINIB	CONDITIONAT	874	7/17/2019
7	Eli Lilly Nederland B.V.	OLARATUMAB	indicat în combinație cu doxorubicină pentru tratamentul pacienților adulți cu sarcom de țesuturi moi în stadii avansate care nu sunt eligibili pentru tratamentul curativ prin intervenție chirurgicală sau radioterapie și care nu au fost tratați anterior cu doxorubicină	EXCLUDERE	123	7/31/2019