

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Decizie	Nr. decizie
1	Novartis Europharm Ltd.	Omalizumabum	tratament adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienți adulți și adolescenți (12 ani și peste această vârstă), cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1	Neincludere	555	5/3/2019
2	Chiesi Farmaceutici SpA	VELMANAZĂ ALFA	TERAPIA DE SUBSTITUȚIE ENZIMATICĂ ÎN TRATAMENTUL MANIFESTĂRILOR NON-NEUROLOGICE LA PACIENȚII CU ALFA-MANOZIDOZĂ UȘOARĂ PÂNĂ LA MODERATĂ	Conditionat	581	09.05.2019
3	IPSEN PHARMA	Cabozantinibum	TRATAMENTUL CARCINOMULUI CELULAR RENAL (CCR) ÎN STADIUL AVANSAT, LA ADULȚI CARE AU URMAT ANTERIOR O TERAPIE ȚINTITĂ ASUPRA FACTORULUI DE CREȘTERE AL ENDOTELIULUI VASCULAR (FCEV)	Conditionat	600	5/15/2019
4	Amgen	Blinatumomab	monoterapie pentru tratamentul pacienților copii și adolescenți cu vârsta de minim 1 an cu LLA cu precursor de celulă B și cromozom Philadelphia negativ, CD19 pozitivă, refractară sau recidivată după administrarea a cel puțin două tratamente anterioare sau recidivată după transplantul alogen de celule stem hematopoietice	Actualizare segment populational	583	5/10/2019
5	NovoNordisk	Insulinum degludec	TRATAMENTUL DIABETULUI ZAHARAT LA ADULȚI, ADOLESCENȚI ȘI COPII DE LA VÂRSTA DE 1 AN	Conditionat	628, 627	23.05.2019
6	Merck Europe B.V.	AVELUMABUM	MONOTERAPIE PENTRU TRATAMENTUL PACIENȚILOR ADULȚI CU CARCINOM METASTATIC CU CELULE MERKEL (CCM)	Neconditionat	623	22.05.2019
7	BRISTOL-MYERS	NIVOLUMABUM	MONOTERAPIE PENTRU TRATAMENTUL CANCERULUI SCUAMOS DE CAP ȘI GAT LA ADULȚI LA CARE BOALA PROGRESEAZĂ ÎN TIMPUL SAU DUPĂ TERAPIE DE BAZA DE SĂRURI DE PLATINĂ	Conditionat	664	31.05.2019
8	NovoNordisk	Turoctocog alfa	TRATAMENTUL ȘI PROFILAXIA SÂNGERĂRILOR LA PACIENȚII CU HEMOFILIE A(DEFICIT CONGENITAL DE FACTOR VIII)	Neconditionat	651	5/29/2019
9	BRISTOL-MYERS	NIVOLUMABUM	În monoterapie este indicat pentru tratamentul adjuvant al melanomului extins la ganglionii limfatici sau metastazat, la adulții la care s-a efectuat rezecție completă	Actualizare segment populational	665	5/31/2019
10	Pfizer Romania SRL	PALBOCICLIBUM	în asociere cu fulvestrant la femeile cărora li s-a administrat tratament endocrin anterior. La femeile în pre-sau perimenopauză, tratamentul endocrin trebuie combinat cu un agonist al hormonului de eliberare al hormonului luteinizant (LHRH).	Actualizare segment populational	666	5/31/2019
11	Novartis Europharm Ltd.	EVEROLIMUS	tratamentul adjuvant al pacienților cu vârsta de 2 ani și peste această vârstă, ale căror convulsii refractare, cu debut parțial, cu sau fără generalizare secundară, sunt asociate cu complexul sclerozei tuberoase(CST)	Actualizare segment populational	667	5/31/2019