

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	Novartis Europharm Limited, Marea Britanie	Omalizumabum	Xolair 150 mg soluție injectabilă este indicat pentru tratamentul adjuvant al urticariei spontane cronice la pacienți adulți și adolescenți (12 ani și peste această vârstă), cu răspuns neadecvat la tratamentul cu antihistaminice H1.	inclusiunea condiționată	470	05.05.2021
2	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austria	Combinatii (Beclometasonum+Formoterolum)	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune	inclusiunea necondiționată	533	20.05.2021
3	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austria	Combinatii (Beclometasonum+Formoterolum)	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune	inclusiunea necondiționată	547	21.05.2021
4	Chiesi Pharmaceuticals GmbH, Austria	Combinatii (Beclometasonum+Formoterolum)	Tratamentul simptomatic al pacienților cu BPOC severă (VEMS < 50 % din valoarea normală prezisă) și antecedente de exacerbări repetate la pacienți care prezintă simptome semnificative în pofida terapiei cu bronhodilatatoare cu durată lungă de acțiune	inclusiunea necondiționată	574	25.05.2021
5	Novartis Europharm Limited, Irlanda	Eltrombopag	Revolade este indicat la pacienții adulți cu anemie aplastică severă dobândită (AAS), care au fost fie refractari la terapie imunosupresoare anterioară, fie tratați anterior în mod excesiv și care nu sunt eligibili pentru transplant de celule stem hematopo-ietice.	inclusiunea condiționată	459	04.05.2021
6	CNAS	Benfotiaminum	Prevenirea și tratamentul deficitului clinic de vitamina B1, care nu se poate remite prin măsuri dietetice. Tratamentul neuropatiilor și a tulburărilor cardiovasculare care sunt induse de carența de B1.	mutare in sublista D	532	20.05.2021
7	Bioprojet Pharma-Franța	Pitolisantum	Wakix este indicat la adulți pentru tratamentul narcolepsiei cu sau fără cataplexie.	inclusiunea condiționată	576	25.05.2021

8	Merck Sharp & Dohme B.V. Olanda	Pembrolizumabum	KEYTRUDA este indicat în monoterapie sau în asociere cu chimioterapia pe bază de săruri de platină și 5-fluorouracil (5-FU) pentru tratamentul de primă linie al carcinomului cu celule scuamoase al capului și gâtului, metastatic sau recurent nerezekabil, la adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 cu un CPS ≥ 1.	inclusiunea condiționată	502	13.05.2021
9	Eli Lilly Nederland B.V. Olanda	Dulaglutidum	Trulicity este indicat pentru tratamentul adulților cu diabet zaharat tip 2 insuficient controlat, ca adjuvant la regimul alimentar și exerciții fizice ca terapie adăugată la alte medicamente hipoglicemice.	actualizare protocol terapeutic	463	04.05.2021
10	Johnson & Johnson România SRL	Abirateronum	ZYTIGA este indicat în asociere cu prednison sau prednisolon în tratamentul neoplasmului de prostată metastazat, sensibil la terapie hormonală (mHSPC, metastatic hormone sensitive prostate cancer), cu risc crescut, diagnosticat recent la bărbații adulți, în asociere cu o terapie de deprivare androgenică (ADT, androgen deprivation therapy).	inclusiunea necondiționată	501	13.05.2021
11	Pfizer Europe MA EEIG – BELGIA	Nonacog alpha	tratamentul și profilaxia hemoragiei la pacienții cu hemofilie tip B (deficit congenital de factor IX)	inclusiunea necondiționată	458	04.05.2021
12	Abbvie Deutschland GMBH & CO.KG- Germania	Upadacitinibum	tratamentul poliartritei reumatoide active, moderate până la severe, la pacienți adulți care au răspuns inadecvat sau prezintă intoleranță la unul sau mai multe medicamente antireumatice modificatoare de boală (MARMB). RINVOQ poate fi utilizat în monoterapie sau în asociere cu metotrexat.	inclusiunea necondiționată	575	25.05.2021
13	Intercept Pharma International Ltd., Irlanda	Acid obeticholicum	Ocaliva este indicat pentru tratamentul colangitei biliare primitive (CBP) (cunoscută și sub denumirea de ciroză biliară primitivă) în combinație cu acidul ursodeoxicolic (UDCA) la adulți cu răspuns inadecvat la UDCA sau ca monoterapie la adulți care nu pot tolera UDCA.	inclusiunea condiționată	557	24.05.2021