

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicație	Rezoluție evaluare	Nr decizie	Data
1	Merck Sharp & Dohme BV (Olanda)	Pembrolizumab	indicat în asocieri cu carboplatină și fie paclitaxel, fie nab-paclitaxel, pentru tratamentul de primă linie al NSCLC metastatic scuamos, la adulți.	Actualizarea protocolului de prescriere	616	11/26/2019
2	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Irlanda	Combi-nații (Netupitantum+Palonosetronum)	indicat la adulți pentru prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen accentuat ce conține cisplatină.	Conditionat	634	29.11.2019.
3	Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd, Irlanda	Combi-nații (Netupitantum+Palonosetronum)	indicat la adulți pentru prevenirea senzației de greață și a vărsăturilor acute și tardive induse de chimioterapia antineoplazică cu efect emetogen moderat.	Neincludere	635	11/29/2019
4	Roche Registration GMBH Germania (reprezentat în România prin Roche Romania)	Pertuzumabum	Cancer mamar incipient - indicat în asocieri cu trastuzumab și chimioterapie	Actualizarea protocolului de prescriere	628	11/28/2019
5	Pfizer Limited	Sirolimus	indicat pentru tratamentul pacienților cu limfangioleiomiomatoză sporadică, cu boală pulmonară moderată sau funcție pulmonară în declin	Neconditionat	629	11/28/2019
6	Boehringer Ingelheim International GmbH, Germania	Empagliflozinum	terapie pentru pacienții diagnosticați cu DZ tip 2 insuficient controlat cu regim alimentar, exercițiu fizic și alte medicamente antidiabetice și care prezintă antecedente de boli cardiovasculare	Neincludere	623	11/27/2019
7	Boehringer Ingelheim International GmbH, Germania	Empagliflozinum	indicat ca terapie pentru pacienții diagnosticați cu DZ tip 2 insuficient controlat cu regim alimentar, exercițiu fizic și alte medicamente antidiabetice și care nu prezintă antecedente de boli cardiovasculare	Conditionat	622	11/27/2019
8	Novartis Europharm Limited IRLANDA	Trametinib si Dabrafenib	Trametinib în asocieri cu dabrafenib este indicat în tratamentul adjuvant al pacienților adulți cu melanom de stadiul III, cu mutație BRAF V600, după rezecție completă.	Actualizarea protocolului de prescriere	585	11/20/2019
9	Les Laboratoires Servier	Irinotecanum Liposomalum	Tratamentul adenocarcinomului pancreatic metastazat, în asocieri cu 5-fluorouracil (5-FU) și leucovorin (LV), la pacienți adulți la care afecțiunea a progresat sub tratament pe bază de gemcitabină.	Conditionat	621	11/27/2019
10	Janssen Biologics BV-Olanda reprezentat prin Merck Sharp & Dohme Romania SRL	Golimumabum	recomandat în tratamentul colitei ulcerative active, aflată în stadii moderate până la severe, la pacienții adulți care au prezentat un răspuns inadecvat la terapia convențională incluzând corticosteroizi și 6-mercaptopurină (6-MP) sau azatioprină (AZA), ori care prezintă intoleranță sau contraindicații pentru astfel de tratament.	Neincludere	632	11/29/2019