

Nr. Crt.	Solicitant	DCI	Indicatie	Rezolutie evaluare	Nr decizie	Data
1	Roche GmbH Germania reprezentat prin Roche Romania SRL	Rituximab	administrat în asociere cu glucocorticoizi, este indicat pentru tratamentul pacienților adulți cu granulomatoză cu poliangeită (Wegener) (GPA) activă, severă și poliangeită microscopică (MPA).	Actualizarea protocolului de prescriere	1252	07.12.2020
2	Sanofi-Aventis Groupe, Franța reprezentat prin Sanofi România SRL	Alirocumabum	indicat la adulți cu boală cardiovasculară aterosclerotică stabilă pentru reducerea riscului cardiovascular prin scăderea valorilor LDL-colesterolului (LDL-C), ca tratament adjuvant la măsurile de corectare a altor factori de risc: în asociere cu statină administrată în doza maximă tolerată, împreună cu sau fără alte terapii hipolipemice sau, singur sau în asociere cu alte terapii hipolipemice la pacienții care nu tolerează statinele sau la care este contraindicată administrarea de statine.	Neincluderea	1262	11.12.2020
3	Takeda Pharmaceuticals SRL	Imunoglobulină umană normală	Terapie de substituție la adulți, adolescenți și copii (0-18 ani) în sindroame de imunodeficiență primară cu producere de anticorpi afectată.	Includerea conditionata	5252	31.03.2020
4	Sanofi-Aventis Groupe, Franța reprezentat prin Sanofi România SRL	Combi-nații (Insuline glargine+Lixisenatidum)	indicat la adulți pentru tratamentul diabetului zaharat de tip 2 insuficient controlat, pentru a îmbunătăți controlul glicemic, ca adjuvant dietei și exercițiului fizic, adăugat la metformină administrată în asociere cu sau fără inhibitori ai co-transportorului 2 de sodiu-glucoză (SGLT-2)	Actualizarea protocolului de prescriere	1261	11.12.2020