

Diclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUIDiclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un gram de gel conține diclofenac sodic 10 mg.

3. LISTA EXCIPIENȚILORRRR- α -tocoferol (Copherol F 1300), carbomer (980 NF), oleat de decil, 2-octildodecanol (Eutanol G), lecitină (Phospholipon 80), soluție de amoniac 10%, edetat disodic, parfum "Vert de Crème - Lilial free", alcool izopropilic, apă purificată.

Vezi prospectul pentru informații suplimentare.

4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTULGel
50 g
100 g**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**Administrare cutanată.
A se citi prospectul înainte de utilizare.**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)

8. DATA DE EXPIRARE

EXP:

9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Hexal AG
Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germania
{Sigla SANDOZ}

12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ

10461/2017/01 –{pentru cutia cu 50 g gel}
10461/2017/02 –{pentru cutia cu 100 g gel}

13. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Indicații terapeutice

Afecțiuni inflamatorii și traumatisme ale tendoanelor, ligamentelor, mușchilor și articulațiilor

Edeme postoperatorii și posttraumatice

Doze și mod de administrare

Dacă nu există alte recomandări din partea medicului, Diclac 10 mg/g gel se administrează extern, în strat subțire, în 2-3 aplicații pe zi la nivelul zonei afectate.

Cum trebuie utilizat Diclac 10 mg/g gel

Pentru a realiza absorbția gelului se efectuează un masaj ușor și prelungit la nivelul zonei dureroase și/sau inflamate.

După fiecare utilizare se spală mâinile.

Diclac 10 mg/g gel poate fi aplicat în asociere cu iontoforeza.

Diclac 10 mg/g gel se aplică la polul negativ (catod).

Antialgic, antiinflamator.

16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE

Diclac 10 mg/g gel

17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL

Nu se aplică.

18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE

Nu se aplică.

Diclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic

MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI

Tub din aluminiu

1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE

Diclac 10 mg/g gel
diclofenac sodic
Administrare cutanată.

2. MODUL DE ADMINISTRARE

A se citi prospectul înainte de utilizare.

3. DATA DE EXPIRARE

EXP:

4. SERIA DE FABRICAȚIE

Serie:

5. CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ

50 g gel
100 g gel

6. ALTE INFORMAȚII

Doze și mod de administrare

Dacă nu există alte recomandări din partea medicului, Diclac 10 mg/g gel se administrează extern, în strat subțire, în 2-3 aplicații pe zi la nivelul zonei afectate.

Cum trebuie utilizat Diclac 10 mg/g gel

Pentru a realiza absorbția gelului se efectuează un masaj ușor și prelungit la nivelul zonei dureroase și/sau inflamate

După fiecare utilizare se spală mâinile.