

**Nicorette Clear 25 mg/16 ore plasture transdermic**  
Nicotină**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR****CUTIE DE CARTON****1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nicorette Clear 25 mg/16 ore plasture transdermic  
Nicotină

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Nicotină 1,75 mg/cm<sup>2</sup>  
Fiecare plasture transdermic conține nicotină 39,37 mg .

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Stratul de nicotină: peliculă de polietilentereftalat (PET), trigliceride cu catenă medie, bază de copolimer butilmetacrilat.  
Strat de acrilat: soluție adeziv acrilic, hidroxid de potasiu, croscarmeloză sodică, acetilacetonat de aluminiu.  
Stratul de eliberare: Polietilentereftalat (PET), o parte de aluminiu, ambele părți siliconate.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Plasture transdermic  
7 plasturi  
14 plasturi  
28 plasturi

**5. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare transdermică.  
A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)**

**8. DATA DE EXPIRARE**

EXP: MM/YYYY

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C. A se ține punga bine închisă pentru a fi protejată de umiditate.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

McNeil AB  
Norrbroplatsen 2, SE-251 09 Helsingborg,  
Suedia

**12. NUMĂRUL(ELE) AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

11015/2018/01 - ambalaj cu 7 plasturi  
11015/2018/02 - ambalaj cu 14 plasturi  
11015/2018/03 - ambalaj cu 28 plasturi

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot:

**14. CLASIFICARE GENERALĂ PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Pentru tratamentul dependenței de tutun la adulți.

Utilizați un plastru pe zi. Aplicați plastrulele imediat după ce vă treziți dimineața și îndepărtați-l înainte de culcare pentru a asigura efectul pe o perioadă de 16 ore.

Pentru instrucțiuni detaliate privind administrarea, a se vedea prospectul inclus.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE INFORMATION IN BRAILLE**

Nicorette Clear 25 mg/16 ore

**17. COD DE IDENTIFICARE UNIC – COD DE BARE 2D**

Nu este cazul.

**18. COD DE IDENTIFICARE UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU OM**

Nu este cazul

**Nicorette Clear 25 mg/16 ore plasture transdermic**  
Nicotină

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL PRIMAR**

**Pungă multistrat**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

Nicorette Clear 25 mg/16 ore plasture transdermic  
Nicotină

**2. MODUL ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare transdermică

**3. DATA DE EXPIRARE**

EXP: MM/YYYY

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**5. CONȚINUT PE MASĂ, VOLUM SAU NUMĂR DE DOZE**

Un plasture transdermic conține nicotină 39,37 mg.

**6. ALTELE**

**McNeil AB**