

**DERMAZIN 10 mg/g cremă**  
Sulfadiazină de argint

**INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJUL SECUNDAR**

Cutie

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI**

DERMAZIN 10 mg/g cremă  
Sulfadiazină de argint

**2. DECLARAREA SUBSTANȚEI(LOR) ACTIVE**

Un gram cremă conține sulfadiazină de argint 10 mg.

**3. LISTA EXCIPIENȚILOR**

Alcool cetilic, ulei de arahide hidrogenat, polisorbat 60 (Tween 60), propilenglicol, p-hidroxibenzoat de metil (E 218), p-hidroxibenzoat de propil (E 216), apă purificată.

**4. FORMA FARMACEUTICĂ ȘI CONȚINUTUL**

Cremă

25 g cremă

50 g cremă

**5. MODUL ȘI CALEA (CĂILE) DE ADMINISTRARE**

Administrare cutanată

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**6. ATENȚIONARE SPECIALĂ PRIVIND FAPTUL CĂ MEDICAMENTUL NU TREBUIE PĂSTRAT LA VEDEREA ȘI ÎNDEMÂNA COPIILOR**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

**7. ALTĂ(E) ATENȚIONARE(ĂRI) SPECIALĂ(E), DACĂ ESTE(SUNT) NECESARĂ(E)****8. DATA DE EXPIRARE**

EXP:

A nu se utiliza după data de expirare înscrisă pe ambalaj

**9. CONDIȚII SPECIALE DE PĂSTRARE**

A se păstra la temperaturi sub 25°C, în ambalajul original.

**10. PRECAUȚII SPECIALE PRIVIND ELIMINAREA MEDICAMENTELOR NEUTILIZATE SAU A MATERIALELOR REZIDUALE PROVENITE DIN ASTFEL DE MEDICAMENTE, DACĂ ESTE CAZUL**

**11. NUMELE ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

Lek Pharmaceuticals d.d.  
Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

{sigla SANDOZ}

**12. NUMĂRUL AUTORIZAȚIEI DE PUNERE PE PIAȚĂ**

11071/2018/01-02

**13. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**14. CLASIFICARE PRIVIND MODUL DE ELIBERARE**

Medicament care nu se eliberează pe bază de prescripție medicală.

**15. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE**

Cum să utilizați Dermazin

Înainte de aplicare, curățați și îndepărtați țesutul mort. Aplicați apoi Dermazin în strat subțire de 2-4 mm grosime; este de preferat să aplicați crema pe o față sterilă, pe care o plasați apoi pe leziune. Crema se aplică o dată pe zi, cu o spatulă sterilă sau cu mănuși de unică folosință. În general, crema trebuie reaplicată la interval de 24 de ore. Înainte de fiecare aplicare a cremei, leziunea se spală sub jet de soluție antiseptică sau apă pentru înlăturarea resturilor de cremă și a exsudatului cu aspect de puroi după culoare, dar aseptice în realitate, care apare din abundență după aplicarea Dermazin. Tuburile de Dermazin sunt destinate aplicării repetate pentru un singur pacient.

Indicat în tratamentul și prevenirea infecțiilor cutanate.  
Arsuri. Leziuni de decubit. Ulcere varicoase. Abraziuni. Incizii.

**16. INFORMAȚII ÎN BRAILLE**

DERMAZIN 10 mg/g

**17. IDENTIFICATOR UNIC - COD DE BARE BIDIMENSIONAL**

Nu este cazul.

**18. IDENTIFICATOR UNIC - DATE LIZIBILE PENTRU PERSOANE**

Nu este cazul.

**DERMAZIN 10 mg/g cremă**  
Sulfadiazină de argint

**MINIMUM DE INFORMAȚII CARE TREBUIE SĂ APARĂ PE AMBALAJELE PRIMARE MICI**

**Tub**

**1. DENUMIREA COMERCIALĂ A MEDICAMENTULUI ȘI CALEA(CĂILE) DE ADMINISTRARE**

DERMAZIN 10 mg/g cremă  
Sulfadiazină de argint  
Uz cutanat.

**2. MODUL DE ADMINISTRARE**

A se citi prospectul înainte de utilizare.

**3. DATA DE EXPIRARE**

Exp:

**4. SERIA DE FABRICAȚIE**

Lot

**CONȚINUTUL PE MASĂ, VOLUM SAU UNITATEA DE DOZĂ**

25 g  
50 g

**6. ALTE INFORMAȚII**

Indicat în tratamentul și prevenirea infecțiilor cutanate, arsuri, leziuni de decubit, ulcere varicoase, abraziuni, incizii.

Deținătorul autorizației de punere pe piață: Lek Pharmaceuticals d.d.

{sigla SANDOZ}